

Mitteilungen der Sammeltselle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Amaurops (Seracamaurops) Frieseni Winkl.

Kopf von der Fühlereinlenkungsstelle bis zur Halseinschnürung kaum länger als breit. Der Seitenrand als kleines Leistchen $+$ -eckig vorspringend, so daß die Rundung der Seiten des Kopfes unterbrochen erscheint und die Seiten dort $+$ -winkelig nach vorne abbiegen. Die Basalfältchen am ersten Abdominaltergit sind einander näher als dem Seitenrand und haben die Form von spitzwinkelig vorstehenden dreieckigen Plättchen. Das mittlere praebasale Grübchen des Hsch. ist klein und rundlich. Lg. 3 mm. Nordwestl. Trebinje. Kol. R. XI, 147.

Amaurops (Seracamaurops) grandis Winkl.

Erstes Fühlerglied bedeutend länger und viel dicker als das zweite. Scheitelgruben innerhalb des mittleren Drittels der dortigen Kopfbreite gelegen. Fld. längs der Naht nicht vertieft. Lg. 3·8 bis 4 mm. Grab (Herzegovina). Kol. R. XI, 148.

Amaurops (Troglomaurops) Ganglbaueri Winkl.

Kopf von der Fühlereinlenkungsstelle bis zur Halseinschnürung deutlich länger als breit, schmaler als der Hsch., ohne Längsfurche zwischen den Scheitelgruben, diese im Drittel der dortigen Kopfbreite gelegen. Achtes Fühlerglied wenig kürzer als das neunte. Hsch. und Fld. ziemlich dicht behaart, letztere gröber punktiert. Lg. 2·2 mm. Südl. Metkovic. Kol. R. XI, 148.

Amaurops (Seracamaurops) Grabowskii Müll.

Rötlichgelb glänzend, fein schräg niederliegend behaart, die Schläfen lang abstehend bewimpert. Lg. 3 mm. Höhle Borja III, Umgebung von Kalinowik in Süd-Bosnien. — Ausführliche Beschreibung siehe Kol. R. XII, 17.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 123](#)