

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

Die Stadt Goslar am Nordwestrand des Harzes hat ein Gebiet von etwa 65 qkm, das sich vom Harzvorlande bis zum Oberharz hinaufzieht und hier eine Höhe von 760 m erreicht. Der nördlichste Teil liegt nur etwa 200 m hoch, die Stadt selbst 260 bis 320 m. Die Haupteinschnitte des Gebirges bilden das Grane-, Gose-, Winter-, Gelmke- und Okertal. Der städtische Forst ist etwa 30 qkm groß und trägt fast nur Nadelholz, hauptsächlich Fichte. Dazu kommen noch etwa 3½ qkm Klosterwald, darunter im niedrigeren Teil auch etwas Laubholzbestand. Feldbau wird im nördlichen, tiefer liegenden Teil des Gebietes betrieben.

Von 1924 an habe ich meine ganze Tätigkeit auf die Erforschung der Käfer des Gebietes gerichtet, und bis heute (Anfang 1931) sind von mir 1811 Arten und 424 benannte Nebenformen festgestellt worden. Dabei wollte ich besonders nachweisen, in welchen Zeiten des Jahres die einzelnen Arten vorkommen. Die Fundmonate sind durch die Zahlen 1. bis 12. angedeutet. Damit ist aber in vielen Fällen, namentlich bei selteneren Arten, nicht gesagt, daß die Tiere nicht auch in anderen Monaten vorhanden sein können. Für die einzelnen Fundorte des großen Gebietes gelten folgende Abkürzungen:

At. = Ammental	Grt. = Granetal	Ot. = Okertal
Bl. = Bleiche	Gst. = Gosetal	Pt. = Piepentel
Boll. = Bollrich	Hb. = Herzberg	Rb. = Rammelsberg
Dt. = Dörpketal	Hk. = Hohekehl	Rk. = Rabenkopf
Düt. = Düsteres Tal	Hko. = Hessenkopf	Rchb. = Riechenberg
Et. = Ententeich	Kb. = Kattenberg	Sb. = Sudmerberg
Gt. = Gelmketal	Nb. = Nordberg	Stb. = Steinberg
Gtch. = Gelmketeich	Nnb. = Nonnenberg	Wb. = Weinberg
Grh. = Grauhof	O. = Okerfluß	Wt. = Wintertal (Bergtal)

Die Reihenfolge der Familien und Gattungen richtet sich nach Reitter, „Fauna Germanica“, nur sind die Familien durchlaufend numeriert. In ganz vereinzelt Fällen deutet ein Fragezeichen an, daß bezüglich der richtigen Erkennung der betreffenden Art noch ein leiser Zweifel übrig blieb.

Verzeichnis der Käfer.

1. Fam. Cicindelidae.

Cicindela campestris L. — Grh. Nb. Gt. 4.—7.

a. *affinis* Fischer.

silvicola Latr. — Grt. 6.

hybrida L. — Grt.

2. Fam. Carabidae.

Calosoma sycophanta L. — Grh. Ot. 6. 7.

inquisitor L. — Grh. 5.

a. *viridimarginatum* Letzn.

Carabus coriaceus L. — Sb. Rk. 9.

catenulatus Scop. — Hko. Gt. Rb. 5.—9.

v. *harcyniae* Strm.

violaceus L. v. *exasperatus* Dft. — Stb. 7.

auronitens F. — Hko. Wb. 7. 8. 9.

convexus F. — Sb. 4.—7.

auratus L. — Grh. Boll. 4. 5. 6.

a. *contortus* Letzn.

granulatus L. — Grh. Gt. 2.—6. 8. 9. 10.

a. *rubripes* Geh.

cancellatus Illig. — Grh.

arvensis Hbst. — Sb. 6.

nemoralis Müll. — Sb. Boll. 4.—9.

silvestris Panz. — Hko. Gt. Rb. 5.—9.

a. *aeruginosus* Letzn. — a. *concolor* Panz.

glabratus Payk. — Gst. 7.

Cychrus rostratus F. — Hko. 8.

Leistus spinibarbis F. — Boll. Bl. 3.—6. 8. 9.

rufomarginatus Dft. — Sb. Stb. Boll. 5. 6. 7. 9.—11.

ferrugineus L. — Boll. Grh. 3.—9.

Nebria brevicollis F. — Grh. Sb. Boll. 4.—9.

Notiophilus aquaticus L. — Gb. Rb. 4.—8.

pusillus Waterh. — Gt. Bl. Rb. 5.—9.

hypocrita Ptz. — Dt. 8.

palustris Dft. — Überall das ganze Jahr.

biguttatus F. — Nb. Boll. Gt. das ganze Jahr.

Elaphrus cupreus Dft. — Grt. Gt. 5.—8.

riparius L. — O. Gtch. 6. 7. 8.

Blethisa multipunctata L. — Grt. Gb. Gst. 5.

- Lorocera pilicornis* F. — Nb. Boll. Grh. 2.—9.
Dyschirius aeneus Dej. — O. 6. 7.
 globosus Hrbst. — Grt. Boll. Grh. 3.—7. (Auch an
 geschälter Fichte.)
Clivina fossor L. — Bl. Grh. O. 4. 5. 8.
Asaphidion flavipes L. — Kb. 4.
Bembidion lampros Hbst. — Nb. Boll. Sb. 3.—6. 8. 9. 10.
 v. *properans* Steph.
 obtusum Strm. — Boll. Grt. 3. 4.
 adustum Schaum. — Gt. 6.
 obliquum Strm. — O. Gb. 6.—9.
 decorum Pnz. — Gb. O. Grt. 4.—9.
 a. *Munganasti* Reitt.
 Stephensi Crotsch. v. *Marthae* Reitt. — Grt.
 nitidulum Mrsh. — Grh. Gst. 5.—10. (Auch auf Ge-
 büsch.)
 a. *alpinum* Dej.
 monticola Strm. — Grt. 4.
 tibiale Dft. — Gb. Grt. 4.—10.
 atrocoeruleum Steph. — O. Gb. 4.—9.
 fasciolatum Dft. — Sb. 7.
 ripicola Dft.
 v. *testaceum* Dft. — O. 6.
 modestum F. — O. 6.
 Andreae F. — O. 6.
 a. *Bualei* Duv. — v. *femoratum* Strm. — O. Gtch.
 7.—10.
 rupestre L. — Grt. O. Gb. 5.—8.
 ustulatum L. — O. Gb. 5.—10.
 quadriguttatum F. — Gt. Grt. Gst. 5. 6. 7.
 quadripustulatum Serv. — Gtch. 6. 7.
 quadrimaculatum L. — Gb. O. 6. 7. 8.
 humerale Strm. — Gtch. 6. 7.
 articulatum Gyll. — Grh. Grt. Gb. 5. 6. 7.
 octomaculatum Goeze. — O. 5. 6.
 assimile Gyll. — Gb. Grt. Pt. 4. 5. 6.
 Mannerheimi Sahlb. — Grh. Grt. Boll. 3. 4. 5. 9. 10.
 Neresheimi Müll. — Grh. 5. 6.
 guttula F. — Boll. Grh. 5. 6. 9. 10.
 lunulatum Geoffr. Fourc. — Gtch. 6.
 dentellum Thunb. — Gb. 5.

- Bembidion biguttatum* F. — Et. 6.
punctulatum Drap. — O. 7.
Millerianum Heyd. — O. 8.
- Tachys bistriatus* Dft. — O. 7. 8.
- Thalassophilus longicornis* Strm. — Gt. (Uferstein) 5.
- Trechus quadristriatus* Schrnk. — Grh. Boll. Rb. Das ganze Jahr.
obtusus Er. — Boll. Gt. Das ganze Jahr.
- Epaphius secalis* Payk. — Grh. 9. 10. (Feucht. Laub.)
- Calathus fuscipes* Goeze. — Boll. Sb. Grh. 4.—7. 10. 11.
 a. *flavipes* Payk.
erratus Sahlb. — Boll. Rb. 3. 7. 8.
ambiguus Payk. — Boll. 8.
micropterus Dft. — Boll. Sb. Hko. Das ganze Jahr.
melanocephalus L. — Sb. Boll. 3.—10.
- Synuchus nivalis* Panz. — Gt. Sb. Boll. 7. 8. 9.
- Olisthopus rotundatus* Payk. — Boll. Rb. 7. 8. 9.
- Agonum sexpunctatum* L. — Grh. Boll. 3.—10.
marginatum L. — O. Gt. 6. 7. 8.
Mülleri Hbst. — O. Boll. 3.—10. (Auch mit 5 Punkten.)
 a. *coerulescens* Letzn.
viduum Panz. — Grh. Gtch. 5. 6. 7.
 a. *emarginatum* Gyll. — a. *moestum* Dft. — Grt.
 Boll. 4. 5.
impressum Panz. — Gtch. 6. 7.
- Europhilus gracilis* Gyll. — Grh. Grt. 3.—6. 9. 10.
piceus L. — Boll. 11.
- Platynus assimilis* Payk. — Grh. Gt. Gt. 4.—12.
ruficornis Goeze. — Gt. O. 5.—10.
- Idiochroma dorsalis* Pontopp. — Boll. 3.—6. 9. 10.
- Stomis pumicatus* Panz. — Boll. 5.
- Poecilus cupreus* L. — Sb. Boll. Grh. 4.—9.
 a. *affinis* Strm.
coerulescens L. — Bl. Sb. 4.—9.
lepidus Leske. — Sb. Boll. 4.—8.
 a. *ferreus* Letzn. — a. *cyaneus* Letzn. — a. *niger* Letzn.
- Pterostichus oblongopunctatus* F. — Nb. Rb. Grh. 4.—12.
angustatus Dft. — Grh. Rb. 2. 5.—10. (Zahlreich unter
 Fangrinden.)
vernalis Panz. — Gtch. 6. 7.
macer Mrsh. — Boll. 5.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 157-160](#)