

## Mitteilungen der Sammeltelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

### *Neuraphes imitator* Blattny.

Tief schwarz, wenig konvex, glänzend, glatt. Fühler und Beine rötlichgelb, Behaarung gelbgrau, die der Fld. kräftiger und länger als die des Hsch. und Kopfes. Die Hsch.-Seiten bes. vorne lang und dichter gekraust behaart. Der Kopf fast sechseckig, stark quer, fast zweimal so breit als lang. Der zwischen den Schläfen und den Hsch.-Seiten eingeschlossene Winkel schärfer als bei *elongatulus*. Die Stirn kaum konkav. Fühlertuberkel hoch erhoben, Augen groß, stark hervorragend. Jedeiseits seitwärts der Augennischen eine ziemlich große und tiefe Grube, Fühler dünn, Keule wenig abgesetzt, fünfgliedrig, die vorletzten drei Glieder deutlich quer, letztes Glied kurz eiförmig. Hsch. an der Basis etwas, an der breitesten Stelle beträchtlich breiter als der Kopf, nach vorne und rückwärts gerade verengt. Fld. oval, deutlich breiter als der Hsch. Beine dünn, einfach, Schenkel etwas dicker. Lg. 1·3 mm. Prater (Wien). Kol. R. VII, 20.

### *Bathyscia (Bathysciola) Noesskei* Apfb.

*Kauti* Apfb. ♀ zunächst stehend, von dieser durch kürzeren gleichmäßiger ovalen Körperumriß, namentlich wesentlich kürzerer, nach hinten sehr wenig verengte, breiter verrundete, etwas feiner querrissige Fld., feinere und kürzere Behaarung derselben, etwas kürzere Fühler, kürzeres drittes, stark queres achttes und stärker queres zehntes Glied derselben und geringerer Größe differierend. Lg. 1·8—1·9 mm. Vordertarsen sehr stark erweitert, Fühler schlanker, die einzelnen Glieder wie bei *Kauti* ♀ geformt. Višegrad, Bosnien. Kol. R. VIII, 93.

### *Bathyscia (Speonesiotes) latitarsis* Apfb.

*narentina* Reitt. sehr nahestehend, von dieser durch den kürzeren, fast elliptischen Körperumriß, namentlich wesentlich kürzere, viel gleichmäßiger gerundete, nach hinten sehr schwach verengte, an der Spitze viel breiter verrundete Fld. und die verbreiterten Vordertarsen des ♂ leicht zu unterscheiden. Viel gedrungenener und wesentlich kleiner als *narentina*. Höchstens die Größe mittelgroßer Exemplare der letzteren erreichend. Lg. 2·6 bis 2·8 mm. ♂ erstes Glied der Vordertarsen länglich herzförmig, etwa ein Drittel länger als breit. Ragusa, Dalmatien. Kol. R. VIII, 93.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 163](#)