

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

- Pterostichus niger* Schall. — Gt. Nb. Boll. 3.—8.
nigrita F. — Grt. Boll. Gt. 3.—10.
minor Gyll. — Grh. 4.
vulgaris L. — Sb. Boll. 4.—9.
diligens Strm. — Grt. Gt. Grh. 3. 4. 5. 9.—12.
aethiops Panz. — Gt. Grt. 4. 8. 9.
metallicus F. — Boll. 8.
anthracinus Illig. — Hko. 9.
- Abax ater* Villers. — Grh. Boll. Stb. 3.—9.
parallelus Dft. — Grt. Grh. 5. 6. 8.
- Molops elatus* F. — Sb. Boll. 4. 5.
piceus Panz. — Ot. 10.
- Amara plebeja* Gyll. — O. Grh. Boll. 2.—9.
similata Gyll. — Bl. Gt. 4. 5. 9. 10.
ovata F. — Grh. 5. 6. 7.
montivaga Strm. — Bl. 5.
communis Panz. — Boll. Sb. 3.—6. 10.
convexior Steph. — Boll. 4. 5. 10.
lunicollis Schioedte. — Rb. Boll. 4.—9.
aenea Degeer. — Nb. Boll. 4.—9.
familiaris Dft. — Grh. Rb. Sb. 3.—7. 10.—12.
equestris Dft. — Sb. 7.
fusca Dej. — Boll. 4.
cursitans Zimmerm. — Gst. 7.
consularis Dft. — Sb. 7.
apricaria Payk. — Sb. Boll. 3.—8.
aulica Dft. — Rk. Sb. Boll. 4.—10. (Auch auf Disteln.)
lucida Dft. — Bl. 4.
erratica Dft. — Rb. 6. 7.
bifrons Gyll. — Rk. Rb. 7. (Abends gekätschert.)
curta Dej. — Grt. 5.
nitida Strm. — Grt. 4.
- Ophonus rufibarbis* F. — Grh. Boll. 4. 9.
punctatulus Dft. — Bl. 5.

- Pseudophonus pubescens* Müll. — Boll. Sb. 3.—10. (24. Septemb. gravid. ♀)
griseus Panz. — Boll. Sb. 4.—9.
- Anisodactylus binotatus* F. — Grh. Boll. 6. 7. 8.
- Harpalus aeneus* F. — Boll. Grh. 3.—9. — a. *coerulescens* Schils.
v. *semipunctatus* Dej. — v. *confusus* Dej.
laevicollis Dft. — Gt. Grh. 3.—8.
latus L. — Grh. Sb. 4. 5. 9. 10.
marginellus Dej. — Sb. 4.
rübripes Dft. — Boll. Sb. 4.—8.
a. *sobrinus* Dej.
honestus Dft. — Sb. Gt. 5. 6.
rufitarsis Dft. — Bl. Hb. 4.—7. (Auch auf Stauden.)
tardus Panz. — Boll. Sb. 3. 4.
serripes Quens. — Gt. 5. 6.
quadripunctatus Dej. — Hk. 7.
distinguendus Dft. — Grt.
- Dichirotrichus cognatus* Gyll. — Grt. 6. (Gekätschert.)
- Bradycellus verbasci* Dft. — 4.
collaris Payk. — Grh. Boll. 4.—10.
similis Dej. — Grh. Rb. 3. 6.—9.
harpalinus Serv. — Boll. Hb. Grh. 2.—9. (8. in Menge auf Carex.)
- Acupalpus meridianus* L. — Grh. Gt. Rk. 5. 6. 7. (Abends oft auf niederen Pflanzen.)
suturalis Dej. — Boll. Grh. 3. 4. 9.
dorsalis F., v. *notatus* Muls. — Düt. Gtch. 5. 6.
- Badister bipustulatus* F. — Grh. Kb. 4.—7.
- Chlaenius nigricornis* F. — Gtch. 6. 7.
v. *melanocornis* Dej.
- Panagaeus crux major* L. — Bl. Sb. 4. 5. 7. 8.
a. *Schaumi* Ganglb.
- Lebia chlorocephala* Hoffm. — Boll. Sb. 4. 5. 8.
- Metabletus truncatellus* L. — Stb. Sb. das ganze Jahr.
foveatus Geoffr.-Fourcr. — Boll. Rb. 4.—10.
- Microlestes minutulus* Goeze. — 5.
- Dromius agilis* F. — Rb. Bl. 3. 6. 7.
quadrimaculatus L. — Grh. 2. 3. 6. 9.
quadrinotatus Panz. — Grh. Bl. 2. 3.
nigriventris Thoms. — Grh. 4.
- Demetrias atricapillus* L. — Grt. Grh. 4.

Cymindis humeralis Geoffr.-Fourcr. — Boll. Sb. 4.—8.

Brachynus crepitans L. — Grh.

3. Fam. Haliplidae.

Haliphus amoenus Oliv. — Grt. 7.

fluviatilis Aubé. — Judenteich, Grt. 4.—7.

ruficollis Deg. v. *Heydeni* Wehnke. — Grh. 5.

v. *multipunctatus* Wehnke. — Grh. 5.

lineatocollis Mrsh. — Grh. 10.

4. Fam. Hygrobiidae.

(Noch nicht vertreten.)

5. Fam. Dytiscidae.

Hygrotus impressopunctatus Schall. — Gt. 5.

v. *lineellus* Gyll. — Kb. Wachtelpforte 5.

Bidessus geminus F. — O. 6.

Hydroporus Sanmarki Sahlb. — Gt. 4. 5.

bilineatus Ström.

lineatus F. — 4.

marginatus Dft. — Gt. Boll. 5. 6. 10.

palustris L. — Grh. 6.

tristis Payk. — Gt. 5.

planus F. — Grh. 2. (gesiebt) 3. 4. 5.

discretus Fairm. — Sb. Grh. Gt. 4. 5. 6.

nigrita F.

memnonius Nic. — Et. 6.

v. ♀ *castaneus* Aubé. — Et. 6.

ferrugineus Steph. — Kb. 6.

Agabus bipustulatus L. — Grh. 4. 5. 6.

nebulosus Forst. — Grh. 5.

nitidus F. — Grh. Sb. Bl. 4.—9.

guttatus Payk. — Grt. Bl. 4.—10.

chalconotus Panz. — Grh. 4.—7.

uliginosus L. — Sb. 6.

paludosus F. — Et. 5. 6.

Platambus maculatus L. — Grt. 6. 7.

a. *inaequalis* Panz.

Ilybius obscurus Mrsh. — Gt. 5.

ater Deg. — Gtch. 3. 6.

subaeneus Er. — Gst. 7.

Copelatus ruficollis Schall. — 4.

Rhantus Grapei Gyll. — 4.

punctatus Geoffr.-Fourcr. — Grh. Gt. 4. 5.

notatus F. — Et. 5.

adpersus F. — Et. 5.

exoletus Forst. — Gt. 4. 5.

a. *insolatus* Aubé.

Colymbetes fuscus L. — Grh.

Dytiscus punctulatus F. — Grh.

marginalis L. — Grh. Gt. 4. 5. 6.

6. Fam. Gyrinidae.

Gyrinus colymbus Er. — Wt. 7.

natator L. — Grh. 5.

7. Fam. Rhyssodidae und 8. Fam. Platypsyllidae. (Nicht vertreten.)

9. Fam. Staphylinidae.

Ocalea badia Er. — Grh. 2. 3. 10.

rivularis Mill. — Nb. Grt. 2. 3.

picata Steph. — Grh. 10. 11.

Amarochara umbrosa Er. — Rb. 7.

Calodera aethiops Grav. — Grh. Grt. 3. 4. 9. 10.

Chilopora longitarsis Er. — Grh. Gt. 4.—7.

Phloeopora testacea Mnh. — Sb. Grh. Hko. 4.—7. 10. 11.

corticalis Grav. — Grh. 6.

Aleochara curtula Goeze. — Grh. Stb. 3. 6.—10.

intricata Mnh. — Rk. Grh. 5.—8.

morion Grav. — Rb. 7. 8.

brevipennis Grav.

laevigata Gyll. — Grh. Boll. Stb. 3.—6.

crassicornis Lac. — Grh. 2.

sparsa Heer. — Sb. Boll. 5. 7. 11. 12. (Maulwurfsnest.)

villosa Mnh. — Grh. Stb. 8. 11.

diversa J. Sahlb.

lanuginosa Grav. — Nb. Grh. 2.—9.

fumata Grav. — Gt. 7.

bilineata Gyll. — Grh. Sb. Boll. 6.—9.

bipustulata L. — Grh. Nb. Boll. 1.—4. 8. 9. 10.

verna Say. — Sb. 7.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 177-180](#)