

Verzeichnis der Wanzen Schlesiens.

Von M. F. R. Scholtz, Liegnitz.

(Fortsetzung)

184. *D. tricornis* Schrk. (*crassicornis* Fall., *pilicornis* H. Sch.). Assman führt diese Art als drei vorstehende Arten auf! In der Ebene und im Gebirge an trockenen Stellen im Grase, unter Artemisia, auf Laubholz. Bei Breslau, Lissa, Glogau, Warmbrunn, Charlottenbrunn, auf Birken, Scholtz, Grafschaft Glatz (Saalwiesen, VIII./22).
185. *Derephysia foliacea* Fall. In der Ebene und den Vorbergen. Bei Breslau (Pöpelwitz-Hedwig), Salzgrund, an Grashalmen, Liegnitz (Möttig, VII./29), Lüben, (Kaltwasser, VII./21), Rotstein (bei Reichenbach O. L., VIII./28).
186. *D. cristata* Panz. In der Ebene häufiger als im Gebirge, unter Laub. Breslau, Glogau, Warmbrunn.
187. *Galeatus sinuatus* H. Sch. In hügeligen Gegenden, sehr selten. Lissa (Kirschberg, ein Stück im Sande, Nohr), Wartenberg (Mittel-Langendorf, zwei Stück, Dr. Scholtz).
188. *G. spinifrons* Fall. In der Ebene und im Gebirg, besonders an sandigen Orten unter Artemisia und dürrem Moos, auf Gräsern. Um Breslau, Glogau, Warmbrunn, Kynast, auf Sträuchern und Wiesen, Ohlau (Rodeland), Öls (Kl. Mühlatschütz).
189. *G. maculatus* H. Sch. Wie voriger, besonders auf Gräsern. Um Trebnitz (Heidewilxen—Nohr), Warmbrunn (Dr. Luchs).
190. *Lasiacantha capucina* Germ. In der Ebene und im Gebirge an sonnigen Grabenrändern unter Pflanzen. Um Breslau (Osswitz—Hedwig), Glogau, Grafschaft Glatz (Seitenberg, Saalwiesen—Hedwig), Wartenberg, Liegnitz (Vorderheide VI./26), Goldberg (Riemberg, VI./24).
191. *Tingis reticulata* H. Sch. (*costata* Schill., *ciliata* Fieb.). In der Ebene und im Gebirge. Glogau, Trebnitzer Hügel, Salzbrunn (Konradstal—Dr. Scholtz), Stonsdorf im Riesengebirge, Ratibor, Eulengebirge (Rudolfswaldau—M. Tischler).
192. *T. ampliata* H. Sch. In der Ebene. Öls (Kl. Mühlatschütz, Th. Tischler). Ein Stück in meiner Sammlung.
193. *T. cardui* L. In der Ebene und im Gebirge auf Disteln. Überall häufig.
194. *T. angustata* H. Sch. Im Vorgebirge auf sonnigen Hügeln unter niederen Pflanzen. Bei Salzbrunn (Dr. Scholtz).

195. *T. grisea* **Germ.** Nach Assmann: Bisher nur ein Stück in Schlesien aufgefunden (Letzner).
196. *T. maculata* **H. Sch.** (*stachydus* Fieb.). In der Ebene in hügeligen Gegenden. Obernigk (Schummel).
197. *Catoplatus Fabricii* **Stal** (*costatus* Fall.). In hügeligen Gegenden und im Gebirge. Glogau, Salzbrunn, Stonsdorf im Riesengebirge, im Grase unter Gesträuch, Liegnitz (Bruch—Gerhardt).
198. *C. cartusianus* **Goeze.** (*eryngii* Latr.) Bisher nur im Gebirge, an sonnigen Wiesenrändern im Grase. Warmbrunn (Dr. Luchs).
199. *Physatochila dumetorum* **H. Sch.** Nach Assmann: Bisher nur bei Glogau von Prof. Zeller in zwei Stücken gefunden. — Im Odertal. Kohlhaus a. O. drei Stück unter Rinde alter, liegender Kiefern, IV./27. Scholz.
200. *Ph. quadrimaculata* **Wolff.** In der Ebene und im Gebirge, auf Erlen und unter Laub an Erlenstöcken. Lissa (Hedwig), Stonsdorf im Riesengeb. (Dr. Luchs), Liegnitz (Weißerode, III./21, Peist, X./23) nicht selten.
201. *Oncochila simplex* **H. Sch.** In der Ebene an niederen Pflanzen. Liegnitz (Dohnau, VII./24). Maltzsch o. O. VI./19.
202. *O. scapularis* **Fieb.** Bisher nur in der Ebene. Bei Breslau (Dr. Scholtz), Glogau (Prof. Zeller).
203. *Monanthia symphyti* **Vallot** (*vesiculifera* Fieb.). In der Ebene und im Gebirge auf Symphytum. Breslau (Botanischer Garten, A. Nohr), Freiburg, Glogau, Liegnitz (Pansdorfer See, III./20, im Angeschwemmten, Bienowitzer Großteich, II./25, III./27).
204. *M. humuli* **F.** In der Ebene und im Gebirge an feuchten Orten auf Myosotis. Um Breslau (Riemberg, Krumpach-Hedwig), Glogau, Warmbrunn, Liegnitz (Bruch, VIII./25, Bienowitz, II./25), Lüben (Krummlinde, V./25).
205. *M. lupuli* **H. Sch.** In der Ebene und den Vorbergen auf Myosotis. Breslau (Morgenau, Hundsfeld-Nohr), Charlottenbrunn (Letzner), Liegnitz (Weißerode, III./23), Jauer (Raubschloß bei Siebenhuben, VII./27).
206. *M. echii* **Schrk.** In der Ebene und im Gebirge auf Echium, Anchusa, oft gesellig. Bei Breslau, Lissa, Nimkau, Wartha, Warmbrunn, Liegnitz (Panten, VIII./25, Vorderheide, VI./26), Lüben (Kl. Reichen, V./24, auf Echium sehr häufig), Jauer (Haasel, VI./25) usw.
207. *Serenthia ruficornis* **Germ.** Bisher nur in hügeligen Gegenden.

Trebnitzer Hügel, zwischen Obernigk und Riemberg, auf Gräsern (Nohr).

208. *S. laeta* Fall. In der Ebene auf trockenen, grasigen Hügeln, sehr selten. Bisher nur bei Glogau (Prof. Zeller).

Aradoideae.

209. *Aradus versicolor* H. Sch. In der Ebene. Jauer (Brechelshof—Gerhardt). Ein Stück in meiner Sammlung.
210. *A. cinnamomeus* Panz. (*albopunctatus* Scholtz). In der Ebene und in hügeligen Gegenden, meist unter Nadelholzrinde. Um Breslau (Osswitz, Schwedenschanze—Hedwig).
211. *A. depressus* F. In der Ebene und im Gebirge, besonders unter Eichenrinde, nicht selten. Um Breslau, bei Lissa, Glogau, Schmiedeberg, Warmbrunn, Liegnitz (Dohnau, V./26, O.bf. Panten, VII./27, Peist, IV.25, Kohlhaus a. O., IV./27), Jauer (Haasel, V./23, Heßberge X./21), Lüben (Kaltwasser, V./18).
- 211a. *A. erosus* Fall. Beuten O. Schl., Stadtwald, V./30, Nowotny.
212. *A. lugubris* Fall. In der Ebene, Ohlau. (Rodeland — Th. Tischler). Ein Stück in meiner Sammlung.
- 212a. *A. crassicomis* Boh. ? Beuthen O. Schl. Stadtwald, VII./30, Nowotny.
213. *A. betulinus* Fall. Im Vorgebirge und Gebirge. Jauer (Heßberge), Waldenburg a. Altvater, V./28, je ein Stück in meiner Sammlung. Beuten O. Schl., Stadtwald, V./30, Nowotny.
214. *A. corticalis* L. (*complanatus* Burm.). Assmann führt diese als zwei Arten an. In der Ebene und im Gebirge unter Rinde, an Pfählen und Zäunen. Um Breslau, Lissa (Hedwig), Salzbrunn, Charlottenbrunn, Stonsdorf im Riesengebirge.
215. *A. crenatus* Say (*dilatatus* Duf.). In den Vorbergen und im Gebirge. Jauer Haasel, VII./26), Landeck, VI./18, V./21.
- 215a. *A. brevicollis* Fall. Emanuelssegen O. Schl., VI./30, Nowotny.
216. *A. betulae* L. In der Ebene und im Vorgebirge, unter Birkenrinde ziemlich selten. Altwasser (Schummel), Glogau (Prof. Zeller), Beuthen O. Schl., Stadtwald. IV./30, Nowotny.
217. *Aneurus laevis* F. In der Ebene und im Gebirge, unter Rinde von Laub- und Nadelholz. Überall nicht selten.

Reduvioideae.

218. *Phymata crassipes* F. Bisher nur in den Vorbergen, an trockenen, sonnigen Lehnen, selten. Striegau (Breiter-Berg—Letzner), Zobten (Silsterwitz-Schummel).

219. *Ploiariola vagabunda* L. In der Ebene und im Gebirge, auf allerlei Gesträuch. Um Breslau, Lissa, Warmbrunn, Ohlau (Rodeland-Th. Tischler).
220. *P. culiciformis* De Geer. In der Ebene und im Gebirge an altem Gemäuer, in Häusern an Dachfenstern. Um Breslau, Warmbrunn.
221. *P. Baerensprungi* Dohrn. Bisher nur ein Stück in Schlesien gefunden, dürfte über ganz Mitteleuropa verbreitet sein, aber wegen ihrer geringen Größe, außerordentlichen Zartheit und vielleicht auch Mückenähnlichkeit meist übersehen werden! Liegnitz (Tivoli, 15. VIII. 29, an einem Gartenfenster). Scholz.
222. *Pygolampus bidentata* Goeze. Bei Breslau (Letzner, Schilling).
223. *Reduvius personatus* L. In Häusern, geht nachts auf Raub aus. Breslau, eine Fliege (Musca) aussaugend, Ohlau (Nohr), Glogau (Prof. Zeller), Warmbrunn (Dr. Luchs), Grafschaft Glatz (Seitenberg-Hedwig). Oberglogau O. Schl. (Seidel).
224. *Rhinocoris (Harpactor Fieb.) annulatus* L. In der Ebene und in den Vorbergen auf allerlei Gesträuch, fliegt lebhaft im Sonnenschein. Um Breslau, Lissa, Glogau, Salzbrunn, Liegnitz (Peist), Jauer (Haasel, V./23) usw.
225. *Rh. iracundus* Poda. Wie vorige. Breslau, Glogau, Liegnitz (Vorderheide, sog auf Pappeltrieben die Larven von *Melasoma populi* L. (Col.) aus! Scholz, Lüben (Kl. Reichen, VII./26), Ohlau (Rodeland-Th. Tischler) usw.
226. *Coranus subapterus* De Geer. In der Ebene und in hügeligen Gegenden auf sandigem Boden unter Steinen, Artemisia. Um Breslau (Oswitz), Lissa (Kirschberg), Glogau, Liegnitz, Ohlau (Rodeland-Uhuberg) usw.
227. *Prostemma aeneicolle* Stein. In der Ebene bei Liegnitz (Vorderheide) im Grase einzeln und selten. Scholz.
228. *Nabis apterus* F. In der Ebene und den Vorbergen auf allerlei Gesträuch häufig. Bei Breslau, Glogau, Striegauer Berge usw.
229. *N. lativentris* Boh. Wie voriger und an gleichen Orten. Liegnitz, Jauer, Goldberg usw.
230. *N. flavomarginatus* Scholtz. Wie vorige und an gleichen Orten, ziemlich häufig.
231. *N. fesus* L. In der Ebene und im Gebirge auf Wiesen, überall häufig.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Scholz M. F. Richard

Artikel/Article: [Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. 181-184](#)