

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

- Gyrophæna minima* Er. — Grh. 9.
 strictula Er. — Grh. 2.—6. 9. 10.
 laevicollis Kr. — Grt. 7.
- Oligota flavicornis* Boisd. — Grh. Boll. Rb. 3. 4. 5. 8. 9.
- Myllaena intermedia* Er. — Grh. Grt. Düt. 3,—10.
 Kraatzi Sharp. — Grh. Grt. Gst. Das ganze Jahr.
 gracilis Matth. — Grt. 4.
 minuta Grav. — Grt. 3. 4.
 brevicornis Matth. — Grh. Düt. Pt. Das ganze Jahr.
- Gymnusa brevicollis* Payk. — Grh. 6. 7.
 variegata Kiesw. — Pt. 6. (Bachmoos)
- Trichophya pilicornis* Gyll. — Grh. 9. (Laub)
- Phloeocharis subtilissima* Mnnh. — Grh. Boll. 2.—11. (Auch unter Laubhölzrinde)
- Hypocyrtus discoideus* Er. — Nb. 4.
 longicornis Payk. — Sb. Boll. Grh. Das ganze Jahr.
 (Auf Fichte)
- Conosoma littoreum* L. — Grh. Grt. Boll. 3.—12.
 pubescens Grav. — Boll. Sb. Grh. 3.—12.
 immaculatum Steph. — Grh. 2,—10.
 pedicularium Grav. — Stb. Boll. 11. 12. (Stein)
- Lamprinodes saginatus* Grav. — Boll. 4. 5. (Bei *Myrmica laevinodis*)
- Tachyporus obtusus* L. — Überall das ganze Jahr.
 a. *immaculatus* W. Jac.
 abdominalis F. — 4. 7.
 solutus Er. — Überall das ganze Jahr.
 a. *caucasicus* Kol. — Mit der Stammform. (1926 von mir als für Deutschland neu nachgewiesen.)
 chrysomelinus L. — Überall das ganze Jahr.
 ruficollis Grav. — Boll. Wt. 4. 5. 8. 9. 10.
 atriceps Steph. — Grh. Grt. Boll. 4.—11.
 a. *signifer* Pand.
 transversalis Grav. — Grt. 3.
 hypnorum F. — Überall das ganze Jahr.
 a. *armeniacus* Kol. — At. 11.

- Tachyporus pusillus* Grav. — Grh. Boll. Sb. 1.—4. 7.—10.
macropterus Steph. — Boll. Rk. 7.—9.
nitidulus F. — Überall das ganze Jahr.
- Tachinus flavipes* F. — Grh. Boll. Sb. 5.—10.
humeralis Grav. — Gt. 8. 9.
marginatus Gyll. — Gt. 9.
pallipes Grav. — Gt. 4.—9.
rufipes Deg. — Überall das ganze Jahr.
subterraneus L. — Grh. Gt. 3.—6. (An Baumsaft)
 a. *bicolor* Grav. — Boll.
laticollis Grav. — Grh. Sb. Nb. Das ganze Jahr.
 ? *marginellus* F. — Sb. 7.
collaris. — Boll. Sb. 3.—9.
- Leucoparyphus silphoides* L. — 9.
- Habrocercus capillaricornis* Grav. — Grh. 1.—4. 9.—12. (Unt. Laub)
- Mycetoporus splendidus* Grav. — Grh. Nb. Boll. 2.—6. 9.—12.
brunneus Marsh. — Grt. Sb. Nb. Das ganze Jahr.
 a. *bimaculatus* Boisd.
longulus Mnnh. --- Grh. Nb. Wt. Das ganze Jahr.
punctus Gyll. — Grh. Boll. 6.—9.
 v. *plagiellus* Reitt.
Brucki Pand. — Grh. Boll. 3. 11.
rufescens Steph. — Grh. Grt. Wt. 2. 3. 4. 9.—12. (Eine abweichende Form dieser Art hat hinter den Vorder-
 randpunkten des Halsschildes je einen Diskalpunkt.)
Mulsanti Ganglb. — Grh. 9. 10.
Baudueri Rey. — Boll. 6. 10.
splendens Marsh. — 8.
clavicornis Steph. — Boll. 4. 10.
Reichei v. *subpronus* Reitt. — Grh. Wt. 11. 12.
- Bryoporus rufus* Er. — Boll. Wt. 6. (Fichte) 11. 12.
- Bryocharis cingulatus* Mnnh. — Grh. 3. 4. 9. 10. 11.
analisis Payk. — Boll. Sb. Ot. 3. 4. 5. 10.
inclinans Grav. — Grh. 4.
formosus Grav. --- Grh. Hko. 4. 9. 10.
- Bolitobius lunulatus* L. — Grh. Boll. Das ganze Jahr.
trinotatus Er. — Grh. Boll. Hko. 3. 4. 5. 8. 9. 10.
 a. *discophorus* Rey.
exoletus Er. — Grh. Hko. 6.—11.
pygmaeus F. — Grh. Grt. Rb. 3. 8.—12.

- Heterothops quadripunctula* Grav. — Grh. Grt. Hb. 4. 5. 12.
praevia Er. v. *nigra* Kr. — Boll. Stb. 11. 12. (Maulwurfsnest)
- Quedius lateralis* Grav. — Grh. Boll. 8. 9. (Baumpilz)
mesomelinus Marsh. — Grh. Grt. Gst. 3.—10.
 v. *Jänneri* Hubenth.
maurus Sahlb. — Grh. 10.
ochripennis Mén. — Grh. Sb. 6.—9. (Auch auf Dolden)
 v. *nigrocoeruleus* Fauv.
fulgidus F. — Im Keller. 3. 9.
cinctus Payk. — Grh. Boll. Rb. 3. 7.—12.
laevigatus Gyll. — Gt. Hko. Rb. 5. 6. 7.
 a. *resplendens* Thoms.
fuliginosus Grav. — At. Sb. Boll. 3.—12.
tristis Grav. — Boll. Sb. 4. 5. 6. 9. 10.
molochinus Grav. — Boll. Hko. 4.—11.
fumatus Steph. — Grh. Wt. 1.—5. 9.—12.
umbrinus Er. — Wt. Pt. 6. 7. 12.
nigriceps Kr. — Grh. Wt. 1.—4. 10.—12.
maurorufus Grav. — Boll. Ot. Wt. 3.—10.
humeralis Steph. — Grh. Nnb. Rb. 1. 2. 3. 9.—12.
limbatus Heer. — Grh. Grt. 4. 10.
lucidulus Er. — Wt. Gt. Boll. 6.—12.
auricomus Kiesw. — Wt. 5.—10. (Unter Bachmoos nicht selten.)
picipennis Heer. — Gt. Gst. Grh. Das ganze Jahr.
scribae Ganglb. — Grh. Wt. 9. 12.
boops Grav. — Boll. Hko. Wt. 6.—12.
- Creophilus maxillosus* L. — Boll. 7.
- Ontholestes tessellatus* Geoffr. — Grh. Boll. 5. 6. 9.
murinus L. — Rb. 5. 6. 7.
- Staphylinus pubescens* Deg. — Sb. Boll. 5.—8.
fossor Scop. — Boll. Ot. 4. 5.
stercorarius Oliv. — Sb. 7. (Kopula)
flavopunctatus Latr. — Boll. 7. 8.
latebricola Grav. — Boll. 5.
chalcocephalus F. — Sb. 6.
caesareus Cederh. — Sb. 5. 6. 7.
erythropterus L. — Grt. 4. 5. 6.
fuscatus Grav. — Boll. Sb. 3.—10.
picipennis F. — Sb. 7.

- Staphylinus aeneocephalus* Deg. — Grh. Boll. Sb. 3.—8.
ophthalmicus Scop. — Sb. 7.
olens Müll. — Boll. 6. 7. 8.
similis F. — Boll. Rk. 4. 5. 8. 9. 10.
globulifer Geoffr. — Grh. 4. 8.
ater Grav. — Grh. 6.
- Actobius cinerascens* Grav. — Pt. 5. 6. 7. (Bachmoos)
- Neobisnius procerulus* Grav. — O. 6. 7.
prolixus Er. — O. 4.—8.
- Philonthus splendens* F. — Sb. Ot. Boll. 5.—9.
intermedius Boisd. — Boll. Gt. 5.—9.
laminatus Creutz. — Sb. 5.
chalceus Steph. — Sb. Grh. 5. 6. 7.
aeneus Rossi. — Boll. Nb. 4.—7.
atratus Grav. — O. Et. Gt. 5. 6. 7.
 a. *coerulescens* Boisd. — Gtch.
carbonarius Gyll. — Rb. Gst. Gt. 4. 5. 8. 9.
temporalis Rey. — Grt. Boll. 5.—9.
rotundicollis Mén. — Grh. Gt. 2.—10.
umbratilis Grav. — Gt. 6.
cephalotes Grav. — Grt. 6.
sordidus Grav.
fimetarius Grav. — Nb. Boll. Grh. 2.—9.
decorus Grav. — Grh. Gst. 4. 5.
marginatus Stroem. — Bl. 5. 9. 10.
fuscipennis Mnnh. — Grh. Nb. Rb. 2.—5. 8.—12.
Mannerheimi Fauv. — 7.
varius Gyll. — Grh. Sb. Das ganze Jahr.
lepidus Grav. — O. 6.
albipes Grav. — Grh. Sb. Rb. 3. 4. 7. 8. 9.
 a. *alpinus* Epph. — Gt.
immundus Gyll. — Grh. Grt. Boll. 2.—5. 8. 9. 10.
debilis Grav. — Bl. Sb. 4.—7.
sanguinolentus Grav. — Sb. Bl. 5. 6. 7.
 a. *contaminatus* Grav.
ebenus Grav. — Grh. 5.
concinus Grav. — Boll. Sb. Gtch. 3.—10.
 a. *ochropus* Grav.
ventralis Grav. — Hb. 7.
quisquiliarius Gyll. — Grt. Ot. Gt. 2.—8.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 239-242](#)