

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. J a c o b s.

(Fortsetzung)

- Philonthus cruentatus* Gmel. — Rk. Boll. 5.
varians Payk. — Grt. Bl. Nb. 2.—9.
 a. *unicolor* Steph.
agilis Grav. — Bl. 4. 7.
micans Grav. — Grh. Nb. 2. 5. 6. 10. 11.
fulvipes F. — Gt. Gst. O. 5. 6.
puella Nordm. — Boll. 5. (Kuhmist)
splendidulus Grav. — Grh. Sb. 2.—10.
astutus Er. — Sb. Grt. 5. 6. (Unter Steinen)
nigritulus Grav. — Überall das ganze Jahr.
trossulus Nordm. — Grh. Grt. 2.—4.
- Othius punctulatus* Goeze. — Grh. Rb. Wt. 1.—6. 9.—12.
melanocephalus Grav. — Boll. 5. 8.—12.
myrmecophilus Kiesw. — Grh. Nb. Boll. Das ganze
 Jahr. (11. frisch entwickelt.)
- Baptolinus affinis* Payk. — Grh. Nb. 4.—9.
- Leptacinus parumpunctatus* Gyll. — O. 8.
formicetorum Märkel. — Grt. 4. 5. (Bei *Formica rufa*)
- Xantholinus lentus* Grav. — Nb. Rb. 5. 6. 7.
punctulatus Payk. — Grh. Boll. 4.—10.
angustatus Steph. — Grh. Boll. 3.—10.
 v. *nitidicollis* Reitt. — Grt.
glabratus Grav. — Rb. 7.
linearis Oliv. — Nb. Boll. Gt. Das ganze Jahr.
 v. *longiventris* Heer.
distans Rey. — Grh. 9.
tricolor F. — Grh. Boll. Rb. 2.—9.
 a. *laeticeps* Reitt.
- Cryptobium fracticorne* Payk. — Grh. Boll. Hko. 2.—7. 11. 12.
 v. *brevipenne* Rey. — Grt. Wt.
- Lathrobium multipunctatum* Grav. — Boll. Grt. Gt. 3. 4. 5. 6. 10.
quadratum Payk. — Gtch. 6. 7.
terminatum Grav. — Grh. Gtch. 4.—8.
fulvipenne Grav. — Grh. Boll. Hko. 3.—6. 9.—12.
laevipenne Heer. — Grh. 4.

- Lathrobium elongatum* L. — Grt. 5.
geminum Kr. — Grt. Gt. 5. 6.
brunnipes F. — Grh. Boll. Rb. 2. 3. 4. 8.—12.
filiforme Grav. — Grh. 4.
longulum Grav. — Grh. Nb. Rb. Das ganze Jahr.
 v. *longipenne* Fairm. — (Auch mit roter Naht,
 entsprechend der v. *suturale* Wenck. bei
L. filiforme.)
- Domene scabricollis* Er. — Wt. 9. (Moos)
- Medon brunneus* Er. — Ot. 11. 12.
melanocephalus F. — Boll. Sb. 3.—6. 10.—12.
- Lithocharis ochracea* Grav. — Boll. 4. 5. (Unter Steinen)
- Scopaeus cognatus* Rey. — Rb. 7. (Komposthaufen)
sulcicollis v. *intermedius* Rey. — Boll. Sb. 4. 5. 6. 9.
 (Auch bei *Formica rufa*)
- Stilicus subtilis* Er. — Boll. Ot. Rb. 3. 4. 8.
rufipes Germ. — Grh. Boll. Rb. Das ganze Jahr.
similis Er. — Grt. Boll. 3.—6.
orbiculatus Payk. — Stb. Sb. 3. 4. 7.
Erichsoni Fauv. — Grt. 3.—6. 10.
- Astenus angustatus* Payk. — Boll. Rk. Stb. 4.—12.
- Paederus litoralis* Grav. — Sb. 3. 4.
sanguinicollis Steph. — O. 6.
- Euaesthetus bipunctatus* Ljungh. — Grt. Boll. 3.—6.
- Dianous coerulescens* Gyll. — O. Pt. 6. 7.
- Stenus biguttatus* L. — O. Boll. Gt. 3.—10.
bipunctatus Er. — O. Boll. 5.—10.
bimaculatus Gyll. — Grh. Grt. 2.—5.
fossulatus Er. — Wt. 12. (Moos)
Juno F. — Boll. Gt. 3. 4. 5. 8.
longitarsis Thoms. — Gtch. 6.
lustrator Er. — Grh. Grt. 3.—6.
clavicornis Scop. — Grh. Grt. Sb. Das ganze Jahr.
Rogeri Kr. — Gt. 5. 6. 7.
providus Er. — Grh. Grt. Gt. 2.—9.
scrutator Er. — 3.
silvester Er. — Grh. 6.
pusillus E. — Grh. Grt. 5. 6. 7. 10.
nanus Steph. — Boll. 3.
carbonarius Gyll. — Grt. Gt. 5. 6. (Auf Wasserpflanzen)
humilis Er. — Grh. Gt. 2. 3. 4. 7.—10.
incrassatus Er. — Nb. 6.

- Stenus buphthalmus* Grav. — Grt. Gtch. Rk. 3.—8.
melanarius Steph. — 2.
nitens Steph. — Et. 6.
canaliculatus Gyll. — Gtch. Et. 4.—9.
morio Grav. — Gtch. 8.
fuscipes Grav. — 8.
pubescens Steph. — Grt. 3.—6. (Auf Wasserpflanzen)
binotatus Ljung. — Grt. Et. 4. 5. 6.
pallitarsis Steph. — Grh. 6.
bifoveolatus Gyll. — Grt. 3.—6.
nitidiusculus Steph. — Grt. Gt. Grh. 3.—8.
picipes Steph. — Grh. Sb. 2. 3. 6.—10.
flavipes Steph. — Grh. Grt. Gt. 3.—9.
impressus Germ. — Grt. Sb. Gt. 4.—12.
Erichsoni Rey. — Grh. Grt. *Rk. 3. 4. 7.—12.
crassus Steph. — Hb. 7.
nigritulus Gyll. — Grt. Gt. 4. 5. 6.
brunnipes Steph. — Grh. Grt. Boll. 3.—12.
latifrons Er. — Gt. 4.—7.
fulvicornis Steph. — Grh. Grt. Hko. 3.—9.
tarsalis Ljung. — Grh. Sb. 7. 8.
similis Hrbst. — Grh. Grt. 5.—9.
cicindeloides Schall. — Grt. Gt. 5.—9.
fuscicornis Er. — Stb. 11. 12.
ater Mnnh. — Gtch. 6.
- Oxyporus rufus* L. — Grh. Sb. 6. 7.
- Platystethus arenarius* Geoffr. — Boll. Sb. Gst. 4.—9.
cornutus Grav. — O. Gt. 6. 7. 8. 12.
alutaceus Thoms. — Grt. 5.
nitens Sahlb. — Boll. 6.
- Haploderus caelatus* Grav. — Überall das ganze Jahr.
- Oxytelus rugosus* F. — Überall das ganze Jahr.
a. *pulcher* Grav.
insecatus Grav. — Grh. Gt. Sb. 4.—7.
laqueatus Mrsh. — Boll. Gt. 5.—9.
piceus L. — Gt. 5. 6. 7.
inustus Grav. — Grh. Boll. Sb. 5.—9.
sculpturatus Grav. — Sb. Gt. 4.—9.
nitidulus Grav. — Boll. Grh. Das ganze Jahr.
tetracarinatus Block. — Überall das ganze Jahr.
Fairmairei Pand. — Sb. 7. (Im Dünger)

- Oxytelus Saulcyi* Pand. — Boll. 11. 12.
Trogophloeus rivularis Motsch. — Grt. Gt. 4.—7.
 bilineatus Steph. — Grh. Grt. Boll. 4. 5. 6.
 nitidus Baudi. — Düt. 5. 6.
 elongatulus Er. — Grh. 1.—4. 9.—12.
 corticinus Boisd. — Grh. Grt. Gt. Das ganze Jahr.
Coprophilus striatulus F. — Boll. Sb. Kb. 3.—7.
Siagonium quadricorne Kirby. — Grh. 4.
Deleaster dichrous Grav. — Gt. Grt. 5. 6.
Syntomium aeneum Müll. — Grh. Rb. 3. 4. 9. 10.
Coryphium angusticolle Steph. — Grh. Ot. Wt. 1.—7. 10.—12.
 (Auch auf Fichte)
Anthophagus bicornis Block. — Boll. Nb. 5. 6. 7.
 a. *nivalis* Rey.
 abbreviatus F. — Grh. Grt. 5.—8.
 a. *fascifer* Reitt.
 caraboides L. — Nnb. Wt. Rb. 5.—8.
 praeustus Müll. — Nb. 6.
Geodromicus plagiatus, a. *nigrita* Müll. — Gst. Gt. 6.—8.
Lesteva pubescens Mnnh. — Boll. Gt. Wt. 5.—10.
 monticola Kiesw. — Gt.
 longelytrata Goeze. — Grh. Boll. Gt. 5.—10. (Auch
 auf Gebüsch)
Acidota cruentata Mnn. — Grh. Rb. Hko. 10.—12. (Moos)
Olophrum piceum Gyll. — Grh. Grt. Nb. 2.—4.
Lathrimaeum atrocephalum Gyll. — Grh. Nnb. Rb. 1.—5. 9.—12.
 unicolor Mrsh. — Grt. Ot. Nnb. 3.—5. 10. 11.
Phyllodrepoidea crenata Grav. — Grh. 9. (Sehr selten)
Xylodromus testaceus Er. — Grh. 6. 9.—11.
 depressus Grav. — Grh. 8.
 concinus Mrsh. — Grh. 2. 5. 6. 9. 10.
Phloeostiba lapponica Zettst. — Grh. 2.
Phloeonomus monilicornis Gyll. — Grh. Rk. Rb. 3.—5. (Fichten-
 rinde) 10. 11.
 pusillus Grav. — Grh. Rk. Gt. 3.—8.
 minimus Er. — Bl. 8.
Omalius rivulare Payk. — Grh. Stb. Hko. 3.—10.
 caesum Grav. — Grh. Boll. Stb. 2.—6. 8.—10.
 a. *apicicorne* Solski.
Phyllodrepa floralis Payk. — Grh. Boll. 5.—9.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 257-260](#)