download unter www.biologiezentrum.at

Verzeichnis der Wanzen Schlesiens.

Von M. F. R. Scholz, Liegnitz. (Fortsetzung)

377. ***Haplomachus Thunbergi* Fall.** In der Ebene und im Gebirge auf Kleebrachen. Lissa, Charlottenbrunn, Glatzer Schneeberg (Hedwig), Öls (Kl. Mühlatschütz, VI., Tischler, det. Dr. Singer).
378. ***Tinicephalus hortulanus* Mey.** In der Ebene und im Vorgebirge auf Helianthemum vulgare, ziemlich selten. Scarsyne (Letzner), Charlottenbrunn (Dr. Scholtz), Glogau (Prof. Zeller).
379. ***Megalocoleus pilosus* Schrk.** (*tanaceti* **Fall.**) In der Ebene und im Gebirge, im Sommer häufig auf Tanacetum. Bei Breslau, Lissa, Warmbrunn, Rotstein bei Reichenbach O. L., VIII./28.
380. ***M. molliculus* Fall.** Wie voriger. Um Breslau, Lissa, Striegauer Berge, Warmbrunn, Liegnitz (Dohnau, VII./24), Goldberg (Riemberg, VII./24), Jauer (Bremberg, VIII./28), Lüben (Koslitz, IX./28), Grünberg, VII./28.
381. ***Amblytylus nasutus* Kbm.** Von Pflanzen gestreift. Liegnitz (Dohnau, VII./28), gewiß weit verbreitet.
382. ***A. albidus* Hahn.** Wie vorige. Liegnitz (Rehberg, VII./28), Lüben (Kl. Reichen, VII./26), Ohlau (Rodeland-Uhuberg, VII.).
383. ***Macrotylus solitarius* Mey.** In den Vorbergen auf Stachys. Salzbrunn, Charlottenbrunn, Goldberg (Riemberg, VII./24), Jauer (Moisdorf, VII./28, Raubschloß bei Siebenhuben, VII./24), det. Dr. Singer.
384. ***M. Paykulli* Fall.** In der Ebene im Spätsommer auf Chenopodium und Atriplex. Bei Breslau, Drachenbrunn (Nohr).
385. ***Harpocera thoracica* Fall.** In der Ebene und im Gebirge im Grase an schattigen Stellen, selten. Warmbrunn, Stonsdorfer Park, Lüben (Kaltwasser, V./23), Ohlau (Rodeland, V., Th. Tischler).
386. ***Byrsoptera rufifrons* Fall.** In den Vorbergen, im Sommer auf hohem Waldgrase an schattigen Abhängen, sehr selten. Zwischen Salzbrunn und Altwasser, Jauer (Haasel, VIII./25), Rotstein bei Reichenbach O. L., VIII./28.
387. ***Brachyarthrum limitatum* Fieb.** In den Vorbergen. Jauer (Haasel, VII./22).
388. ***Phylus melanocephalus* L.** In der Ebene und im Gebirge auf Eiche und Hasel im Sommer, selten. Schoßnitz (Dr. Scholtz), Glogau (Prof. Zeller), Warmbrunn, Stonsdorfer Park, Liegnitz (Dohnau, VII./29), Goldberg (Hohendorf, VII./29), Öls (Kl. Mühlatschütz, VI., Tischler), det. G. Müller.

download unter www.biologiezentrum.at

389. ***Ph. coryli*** **L.** Wie voriger, nicht selten. Um Breslau, Striegauer Berge, Glogau, Charlottenbrunn, Warmbrunn, Kynast, Jauer (Haasel, VI./20), Liegnitz (Dohnau, VII./29), Ohlau (Rodeland, VI., Tischler).
390. ***Psallus ambiguus*** **Fall.** In der Ebene und im Gebirge auf Weiden, Eichen usw., im Sommer nicht häufig. Bei Breslau, Glogau, Charlottenbrunn, Warmbrunn.
391. ***P. betuleti*** **Fall.** Wie voriger, angeblich auf Nadelholz. Breslau, Warmbrunn, Kohlfurt, VIII./28, Goldberg (Riemberg, VI./24), Grafschaft Glatz (Mutiusgrund, VII./19), Ohlau (Rodeland, VI., Th. Tischler).
392. ***P. variabilis*** **Fall.** In der Ebene und in den Vorbergen, auf Eichengebüsch, im Grase, ziemlich selten. Um Breslau (Oswitz-Hedwig, Pöpelwitz, Morgenau), Schoßnitz (Dr. Scholtz), Maltsch a. O., VI./29, Goldberg (Hohendorf, VI./29).
393. ***P. quercus*** **Kbm.** In den Vorbergen. Jauer (Haasel, VI./22).
394. ***P. Falleni*** **Reut.** In der Ebene an sonnigen Hügeln, auf Artemisia. Bei Breslau (Dr. Scholtz, Letzner, Nohr).
395. ***P. varians*** **H. Sch.** Assmann: In Schlesien bisher nur in einigen Stücken von Dr. Schneider gefunden. Liegnitz (Dohnau, IX./25, Vorderheide, VI./26), Jauer (Haasel, VII/23), Öls (Kl. Mühlatschütz, VI., Tischler).
396. ***P. roseus*** **F.** In der Ebene und im Gebirge, auf Salix, nicht selten. Breslau, Salzbrunn, Giersdorf im Riesengebirge, Warmbrunn, Goldberg (Wolfsberg, VIII./30).
397. ***P. vittelinus*** **Scholtz.** Assmann: Bisher nur von Dr. Scholtz im Botanischen Garten in Breslau im Juli auf Nadelholz gefunden.
398. ***P. salicellus*** **Mey.** In der Ebene und im Gebirge, im Sommer sehr selten. Breslau (im Botanischen Garten auf Weide, ein Stück), Warmbrunn (auf Haselgesträuch), Liegnitz (Rehberg, VII./28), Ohlau (Rodeland, VII., Tischler).
399. ***Atractotomus mali*** **Mey.** Assmann: Bisher nur in der Ebene, im Frühjahr auf Obstbäumen (Birne, Apfel), Dr. Scholtz, Ohlau (Rodeland, VI., Tischler).
400. ***A. magnicornis*** **Fall.** In der Ebene und im Gebirge auf Nadelholz. Bei Breslau (Paschkerwitz-Assmann), Warmbrunn, Liegnitz (Tivoli, VII./29), Ohlau (Rodeland, VII., Tischler).
401. ***Criocoris crassicornis*** **Hahn.** In der Ebene und im Gebirge auf niederen Pflanzen und Himbeersträuchern, im Sommer, nicht selten. Bei Breslau, Salzbrunn, Charlottenbrunn, Schlesier-

download unter www.biologiezentrum.at

tal, Warmbrunn, Stonsdorf im Riesengebirge, Liegnitz (Peist, VIII./24), Jauer (Haasel, VIII./23, Raubschloß bei Siebenhuben, VII./24), Öls (Kl. Mühlatschütz, Tischler).

402. ***Plagiognathus chrysanthemi* Wolff.** In der Ebene und im Gebirge, im Frühjahr und Sommer in allerlei Blüten, sehr häufig. Überall.

403. ***P. fulvipennis* Kbm.** Von niederen Pflanzen gestrichen. Grünberg, VII./28.

404. ***P. arbustorum* F.** In der Ebene und im Gebirge im Sommer auf allerlei Gesträuch und im Grase. Überall nicht selten.

405. ***P. a. v. brunnipennis* Mey.** Bei Breslau (Dr. Scholtz), Warmbrunn (Dr. Luchs), Jauer (Rathsberg, 320 m, VII./28).

406. ***P. a. v. hortensis* Mey.** Mit der Stammform ziemlich selten.

407. ***P. albipennis* Fall.** In der Ebene und den Vorbergen, im Sommer an grasigen Orten, ziemlich häufig. Um Breslau (Morgenau), Nimkau (Letzner).

408. ***Chlamydatus pulicarius* Fall.** In der Ebene und im Gebirge, auf Grasplätzen häufig. Um Breslau, Neuhaus, Ratibor, Warmbrunn, Liegnitz (Dohnau, VII./24), Jauer (Haasel, VI./25), Goldberg (Riemberg, VI./24), Maltsch a. O., VI./21, Ohlau (Rodeland, VI., Tischler).

409. ***Ch. pullus* Reut.** Von niederen Pflanzen gestreift. Liegnitz (Rehberg, IX./28), Lüben (Koslitz, IX./28).

410. ***Ch. saltitans* Fall.** Assmann: Bisher nur bei Breslau (Pöpelwitz) auf dürren, nur mit dürftigem Graswuchse bedeckten Weideplätzen (Dr. Scholtz, Nohr).

411. ***Microsynamma Bohemani* Fall.** Bisher nur in der Ebene auf Weiden an Flußufern, nicht selten. Um Breslau (Oswitz, Scheitnig), Schoßnitz (Letzner), Kohlhaus a. O., VI./25.

412. ***Campylomma verbasci* Mey.** In der Ebene und in den Vorbergen auf Verbascum und Carduus-Arten, häufig Lissa, Liegnitz (Friedhof, VII./24, Dohnau, VIII./24), Jauer (Raubschloß bei Siebenhuben, VII./24).

413. ***Sthenarus modestus* Mey.** Assmann: Bisher nur bei Breslau an grasigen Orten im Frühjahr, sehr selten. Bei Breslau (Dr. Scholtz), 1833 an der alten Oder drei Stück (Nohr).

414. ***S. Roseri* H. Sch.** Assmann: Bisher nur im Botanischen Garten in Breslau im Juni an Weiden sehr selten gefangen (Dr. Scholtz) — Maltsch a. O., VI./21.

415. ***S. Rotermundi* Scholtz.** Bei Breslau (Klein Kletschkau, VII., Dr. Scholtz) auf Alnus glutinosa.

download unter www.biologiezentrum.at

416. *Isometopus intrusus* **H. Sch.** Bisher nur bei Liegnitz (Dohnau, VIII./23) in einem Obstgarten an Baumstämmen, det. G. Müller et Dr. Singer.

8. Dipsocoroideae.

417. *Ceratocombus coleoptratus* **Zett.** In trockenen Waldungen unter Moos, in Ameisennestern. Jauer (Haasel, X./25).
Dipsocoris alienus **H. Sch.** Dürfte in Schlesien nicht fehlen.

9. Gerroideae.

A. *Hydrometriformes.*

418. *Hydrometra stagnorum* **L.** In der Ebene und im Gebirge, im Sommer am Ufer stehender oder langsam fließender Gewässer auf Lemna usw. Überall nicht selten.
419. *H. gracilenta* **Horv.** An denselben Orten wie voriger. Liegnitz (Bienowitzer Großteich, III./27). Gewiß weit verbreitet.

B. *Gerriformes.*

420. *Gerris rufoscutellatus* **Latr.** In der Ebene und im Gebirge auf stehenden oder langsam fließenden Gewässern durchs ganze Jahr häufig.
421. *G. paludum* **F.** Wie voriger im Frühjahr und Herbst, häufig.
422. *G. najas* **De Geer.** In der Ebene und häufiger im Gebirge. Um Breslau, Landeck, Warmbrunn, Stonsdorf im Riesengebirge.
423. *G. lateralis* **Schumm.** Assmann: In Schlesien selten. In Schummels Sammlung ein Paar vorhanden gewesen, auch von Letzner aufgefunden.
424. *G. thoracicus* **Schumm.** In der Ebene und im Gebirge. Um Breslau, Salzbrunn, Charlottenbrunn, Warmbrunn, Lüben (Kaltwasser, IV./20).
425. *G. gibbifer* **Schumm.** Im Gebirge häufiger als in der Ebene. Glogau, Hochwald, Charlottenbrunn, Schmiedeberg, Stonsdorf im Riesengebirge, Rohrlach im Riesengebirge, VII./24.
426. *G. lacustris* **L.** In der Ebene und im Gebirge, überall häufig.
427. *G. odontogaster* **Zett.** In der Ebene und im Gebirge, nicht selten. Um Breslau (Oswitz), Lissa, Nimkau, Glogau, Warmbrunn, Stonsdorf im Riesengebirge, Liegnitz (Rinnständer, IV./20, Seifersdorf, X./24), Lüben (Kaltwasser, IV./20).
428. *G. argentatus* **Schumm.** In der Ebene und im Gebirge, häufig. Bresleu, Lissa, Warmbrunn, Stonsdorf im Riesegebirge.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Scholz M. F. Richard

Artikel/Article: Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. 333-336