

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. JACOBS.

(Fortsetzung)

- Brachypterus glaber* Steph. — Boll. Et. 5.—9.
urticae F. — Boll. Sb. Rb. 4.—8.
 a. *affinis* Heer.
fulvipes Er. — Boll. 9.
- Heterostomus pulcarius* L. — Grh. Boll. Rb. 6.—11.
villiger Reitt. — Boll. Sb. Gt. 6.—9.
- Carpophilus hemipterus* L. — 8. (An Feigen)
- Meligethes solidus* Strm. — Grt. 6.
hebes Er. — Grh. 8. 9. (Auf Disteln)
aeneus F. — Überall das ganze Jahr.
 a. *coeruleus* Mrsh. — a. *australis* Küst. —
 a. *semiaeneus* Ganglb.
viridescens F. — Sb. Gt. 4.—10.
 ? *coeruleovirens* Först. — Grt.
lumbaris Strm. — Grh. Sb. 5. 6. 9.
coracinus Strm. — Überall das ganze Jahr.
 v. *pumilus* Er.
subaeneus Strm. — Grh. Sb. Hb. 6.—10.
subrugosus Gyll. — 6. 7.
bidens Bris. — Grh. Nb. 6. 9.
fuliginosus Er.
brachialis Er. — Grh. 6.
picipes Strm. — Grh. Nnb. 5.—9.
ochropus Strm. — Grh. Boll. 5.—9.
brunnicornis Strm. — Grh. 5. 6. 7. 10. (Gesiebt)
difficilis Heer. — Grh. Sb. 4.—10.
morosus Er. — Hb. Bl. 5.—8.
viduatus Strm. — Grh. Boll. 5.—9.
 a. *aestimabilis* Reitt.
pedicularius Gyll. — Grh. 6.
sulcatus Bris. — Bl. Gt. 8. 9.
assimilis Strm. — Rb. 7. 8.
distinctus Strm. — Sb. 7.
tristis Strm. — Sb. O. 6. 7.
planusculus Heer. — Sb. 6.
erythropus Gyll. — Boll. Grt. Sb. 5.—9.

- Soronia grisea* L. — Grh. Gt. 5.—7.
Omosita discoidea F. — Grt. Grh. 5. 6.
 colon L. — Wachtelpforte. 6.
Epuraea melanocephala Mrsh. — Grh. 5.—10.
 deleta Er. — Grh. Hko. 9. 10.
 depressa Gyll. — Grh. Sb. 5. 6. 9. 10.
 a. *bisignata* Strm.
 variegata Hbst. — Grh. 9. 10.
 abietina J. Sahlb. — Rb. 7. 8.
 florea Er. — Grh. 4. 5. 9.
 rufomarginata Steph. — Grh. Wt. 6. 11. 12. (Unter Moos)
 melina Er. — Grh. Nb. 5.—9.
 terminalis Mnnh. — Rk. Gt. Rb. 3.—7.
 a. *Seidlitzii* Schils.
 obsoleta F. — Grh. Grt. Gt. 5.—12.
 longula Er. — Grh. Boll. Gt. 5.—8.
 a. *Erichsoni* Reitt.
 pusilla Illig. — Grh. Bt. Stb. 9.—12.
 pygmaea Gyll. — Grh. Rb. 5. (Unter Fichtenrinde)
Nitidula rufipes L. — Sb. 7.
Cychramus luteus F. — Grh. 7. 8. 9.
Pocadius ferrugineus F. — Grh. Boll. 8. 9. 10.
Librodor Olivieri Bedel. — Grh. 5.—9.
 quadriguttatus Oliv. — Gst. Rk. 3.—5.
Glischrochilus quadripustulatus L. — Grh. Rk. Rb. 3.—5. 9.
Pityophagus ferrugineus L. — 5. (In der Stadt)
Rhizophagus ferrugineus L. — Grt.
 depressus F. — Grt. Bl. 4. 5.
 dispar Payk. — Grh. Nb. Rk. 3.—12.
 bipustulatus F. — Grh. 4. 5.

27. Fam. Cucujidae.

- Monotoma picipes* Hbst. — 6. (In der Stadt)
Oryzaephilus surinamensis L. — 1. (In der Wohnung)

28. Fam. Cryptophagidae.

- Telmatophilus caricis* Oliv. — Et. 6.—8.
 brevicollis Aubé. — Et. 8.
Antherophagus nigricornis F. — Grh. Rk. Rb. 7. 8. (Unreif)
 pallens Oliv. — Grh. Grt. Wt. 5.—8.

- Paramecosoma melanocephalum* Hbst. — Gst. 5.
Cryptophagus vini Pnz. — Boll. Ot. Bl. 4. 6.—12.
 v. *villosus* Heer.
abietis Payk. — Wt. Ot. 10. 11. (Unter Moos)
acutangulus Strm. — 3.—5. (Im Keller)
distinguendus Strm. — 5. (Keller) 7. 8.
scutellatus Newn. — 5.—7. (Keller)
dentatus Hbst. — Grh. 7. 8. (An Pilz)
saginitus Strm. — 3.—7. 10. (Keller)
subfumatus Kr. — 3.—8. (Keller)
Thomsoni Reitt. — Grh. Grt. 5. 8.
scanicus L. — Rb. 7. 8.
 a. *patruelis* Strm.
subdepressus Gyll. — Grh. Boll. 6.—9.
pubescens Strm. — Grh. Nb. Boll. 3. 6.—9.
lycoepardi Hbst. — Bl. 4. 8.
pilosus Gyll. — 3.—5. 8. (Keller)
punctipennis Bris. — 4. 5. (Keller)
Schmidti Strm. — 7. (In der Küche an jungen Erbsen)
affinis Strm. — Grh. Gst. Sb. 3.—9.
cellaris Scop. — 10.
croaticus Reitt. — Wt. 12.
setulosus Strm. — Grh. 11. (Unter Laub)
Atomaria umbrina Gyll. — Grh. Boll. Sb. 5.—10.
nigriventris Steph. — Grh. Boll. 6.—11.
linearis Steph. — Grh. Sb. Rb. 5.—10.
fuscicollis Mrsh. — Grt. 3.
 ? *gutta* Steph. — Bl. 5.
nitidula Er. — Boll. 3.
fuscata Schönh. — Grh. Nb. Wt. 1.—5. 8.—12.
atricapilla Steph. — Grh. Boll. Rb. 3.—5. 10.
peltata Kr. — Grh. Boll. 3. 7.
fuscipes Gyll. — Sb. 7.
pusilla Schönh. — Grh. Nb. 1.—6. 9.—12.
ornata Heer. — Rb. 4. (Fichte)
apicalis Er. — Boll. 8.
ruficornis Mrsh. — Grh. Sb. Bl. 4.—9.
analisis Er. — Grh. Bl. Sb. Das ganze Jahr.
cognata Er. — Grh. 9.
Ephistemus globulus Payk. — Bl. 8. 9. (Baumpilz)

29. Fam. Erotylidae.

Tritoma bipustulata F., a. *binotata* Reitt. — Grh. Grt. 5. 6.

30. Fam. Phalacridae.

Phalacrus fimetarius F. — Boll. Nb. Sb. 5.—8.

Olibrus aeneus F. — Grh. Gt. Bl. 2.—9.

corticalis Pnz. — Sb. 5. 8. 9.

bicolor F. — Rk. 7.

Stilbus testaceus Pnz. — Grh. Grt. Boll. 3.—5. 8.—12.

a. *unicolor* Flach.

atomarius L. — Grh. 1. 4. 8.

31. Fam. Lathridiidae.

Dasycerus sulcatus Brongn. — Grh. Grt. 3. 4. 8. 9. 10.

Lathridius lardarius Deg. — Grh. Grt. Das ganze Jahr.

angusticollis Gyll. — Rb. 6. 7. (Gartenhecke)

rugicollis Oliv. — Gt. 4. 7. 8. 9.

nodifer Westw. — Grh. Boll. Hko. 2. 3. 6.—12. (Auch im Keller)

Bergrothi Reitt. — 3.—10. (Im Keller in großer Zahl)

Enicmus minutus L. — Das ganze Jahr. (Im Keller, auch auf Fichten)

v. *anthracinus* Mnnh.

transversus Oliv. — Grh. Wt. Boll. 1.—4. 6.—12.

a. *alutaceus* Reitt.

Cartodere elongata Curt. — Grh. 8. 9. (Im Keller, das ganze Jahr)

filiformis Gyll. 5. (Im Keller)

Corticaria pubescens Gyll. — 7.

fulva Comoll. — Grh. 4.—10. (Auch im Keller)

umbilicata Beck. — Grh. Boll. Rk. 3. 8.—12.

linearis Payk.

serrata Payk. — Grh. 1.

saginata Mnnh. — Grh. 8.

elongata Gyll. — Grh. Nb. 3.—5. 8.—12.

impressa Oliv. — Boll. Rb. 3. 4. 11. 12.

Corticarina gibbosa Hbst. — Grh. Gt. Rb. Das ganze Jahr.

fuscula Gyll. — Boll. Wt. Stb. 3.—5. 8.—12.

a. *trifoveolata* Redt. — Grt., a. *latipennis* J. Sahlb. — Sb.

32. Fam. Mycetophagidae.

Mycetophagus atomarius F. — Grh.

Typhaea stercoraria L. — Bl. 7.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 354-357](#)