

Verzeichnis der Wanzen Schlesiens.

Von M. F. R. Scholtz, Liegnitz.

(Fortsetzung)

429. *Microvelia pygmaea* Duf. In der Ebene auf stehenden Gewässern. Liegnitz (Bienowitzer Großteich, III./27).
430. *M. Schneideri* Scholtz. Wie voriger, in der Ebene und im Gebirge, ziemlich häufig. Um Breslau, Warmbrunn, Stonsdorf im Riesengebirge.
- Velia rivulorum* F. Dürfte in Schlesien nicht fehlen; nach Assmann bei Freiwaldau unfern der Grenze (Letzner).
431. *V. currens* F. In der Ebene und besonders im Gebirge auf klaren Bächen, weit verbreitet.

10. Acanthioideae.

432. *Salda littoralis* L. In der Ebene und im Gebirge an Fluß- und Teichufern, sehr selten. Bei Breslau u. Charlottenbrunn (Letzner).
433. *S. Muelleri* Gmel. In der Ebene. Laband O. Schl., VII./24, Nowotny.
- Acanthia scotica* Curt. Wurde bei Karlstal an der großen Iser gefunden, könnte an größeren Gebirgsflüssen in Schlesien vorkommen.
434. *A. saltatoria* L. In der Ebene und im Gebirge (Kl. Teich, VI./30) an allen Gewässern häufig durchs ganze Jahr.
435. *A. pallipes* F. In der Ebene und im Gebirge, einzeln. Breslau, Charlottenbrunn, Schmiedeberg.
436. *A. arenicola* Scholtz. Assmann: Bisher nur von Dr. Scholtz aufgefunden. Sie soll nur an kahlen, sandigen Stellen vorkommen. Ein spezieller Fundort ist nicht aufgeführt, doch könnte sie nur an den Ufern der alten Oder vorkommen. — Kohlhaus a. O., IX./22, im Sande am Oderufer.
437. *A. pellucens* F. (*riparia* Fall.). Nur an steinigten Ufern klarer Gebirgsbäche. Salzgrund, Schlesiertal, Krummhübel im Riesengebirge.
438. *Chartoscirta cincta* H. Sch. Bisher nur in der Ebene, sehr selten. Breslau (Botan. Garten, Dr. Scholtz), Rosenthal bei Breslau (Letzner), Glogau (Prof. Zeller).
439. *Ch. elegantula* Fall. Nur in der Ebene an feuchten Orten, meist einzeln. Um Breslau (Morgenau, Ransern, Karlowitz auf Salix).
440. *Ch. e. v. Flori* Dohrn. Wie voriger. Liegnitz (Verlorenes Wasser bei Panten, X./25, Bienowitzer Großteich, IV./24, X./28, Pansdorfer See, III./20).

441. *Ch. Cocksii* Curt. Öls (Kl. Mühlatschütz, VII., Th. Tischler).

11. Notonectoideae.

442. *Aphelochirus aestivalis* F. Ellguth b. Ottmachau O. Schl. Nowotny 10. VI. 28.
- 442 a. *Naucoris cimicoides* L. In der Ebene und im Gebirge in stehenden Gewässern, überall nicht selten. Wie wohl fast alle folgenden schädlich für die Fischzucht.
443. *Nepa cinerea* L. In stehenden Gewässern, überall häufig.
444. *Ranatra linearis* L. In der Ebene und im Gebirge in stehenden Gewässern, besonders in Fischteichen, nicht selten.
445. *Plea minutissima* Füssl. In der Ebene häufig, im Gebirge selten in stehenden Gewässern, überall.
446. *Notonecta glauca* L. (v. *marmorea* F., v. *furcata* F., v. *maculata* F.). In der Ebene und im Gebirge in stehenden Gewässern häufig.
447. *N. lutea* Müll. Soll in Oberschlesien vorkommen, doch konnte ich noch keine Belegstücke erhalten. Fehlt sicher bei uns nicht.

12. Corixoideae.

448. *Corixa Geoffroyi* Leach. In stehenden Gewässern in der Ebene und im Gebirge häufig durchs ganze Jahr.
- C. dentipes* Thoms. Dürfte auch in Schlesien vorkommen, da sie bereits für die Oberlausitz nachgewiesen ist (Dr. Jordan-Bautzen).
449. *C. affinis* Leach. Assmann: Von dieser südlichen Art wurde ein Stück von Dr. Schneider in Schlesien aufgefunden.
450. *Arctocorisa hieroglyphica* Duf. Assmann: Bisher nur bei Breslau von Dr. Scholtz gefunden.
451. *A. Hellensi* C. Sahlb. Assmann: Bisher nur ein Stück bei Warmbrunn gefunden (Dr. Luchs). — Öls (Kl. Mühlatschütz, VII., Tischler), det. Dr. Jordan.
452. *A. Sahlbergi* Fieb. In der Ebene und im Gebirge in stehenden Gewässern, ziemlich häufig. Um Breslau, Charlottenbrunn, Warmbrunn, Tatischau O. Schl., VIII./24, Nowotny).
453. *A. Linnei* Fieb. Wie vorige, nicht häufig. Bei Breslau und Warmbrunn, Lüben (Kl. Reichen, X./25).
454. *A. limitata* Fieb. Bisher nur in der Ebene. Bei Breslau (Assmann), Lüben (Kl. Reichen, X./25).

455. *A. semistriata* Fieb. In der Ebene und im Gebirge, selten. Breslau, Warmbrunn, Liegnitz (Pansdorfer See, IX./25).
456. *A. striata* L. In der Ebene häufiger als im Gebirge. Um Breslau, Warmbrunn.
457. *A. Falleni* Fieb. In der Ebene und in Gebirge in stehenden Gewässern häufig. Um Breslau, Warmbrunn, Öls (Kl. Mühlatschütz, VII., Tischler), det. Dr. Jordan.
458. *A. distincta* Fieb. Nur einige Stücke bei Breslau gefunden (Dr. Scholtz), Liegnitz (Rinnständer, Bienowitzer Großteich, L., Grünstr. 5, einige Stücke an die Lampe geflogen, IX./28), det. Dr. Jordan.
459. *A. moesta* Fieb. Um Breslau (Morgenu, Scheitnig-Letzner) selten, Laband O. Schl., VII./24, Nowotny.
460. *A. fossarum* Leach. In der Ebene und im Gebirge in stehenden Gewässern, häufig. Um Breslau (Schweidnitzer Tor-Assmann), Warmbrunn, Gotschdorf, Stonsdorf im Riesengebirge (Dr. Luchs).
461. *A. Fabricii* Fieb. Bisher nur im Gebirge, selten, Warmbrunn.
462. *A. F. v. nigrolineata* Fieb. Bei Breslau (Letzner, Dr. Scholtz), Jauer (Hessberge, X./19), det. Dr. Jordan.
463. *Callicorixa praeusta* Fieb. In der Ebene und im Gebirge in stehenden Gewässern, selten. Breslau. Warmbrunn.
464. *C. concinna* Fieb. Bisher nur in einzelnen Stücken bei Breslau (Dr. Scholtz).
465. *Cymatia Bonsdorffi* C. Sahlb. Ein Stück bei Warmbrunn (Dr. Luchs). Wie alle Arten der *Corixoideae* gewiß weit verbreitet, aber noch zu wenig erforscht!
466. *C. coleoptrata* F. In der Ebene in stehenden Gewässern, nicht selten. Breslau (Oswitz, Pöpelwitz, Scheitnig), Lissa.
467. *Micronecta Scholtzi* Fieb. Assmann: Nach Dr. Scholtz häufig in Lachen an der Rosenthaler Straße und im Kratzbusch (wohl längst bebautes Gelände).
- M. minutissima* L. Wird in Schlesien nicht fehlen.

* * *

Systematisches Verzeichnis der Gattungen und Arten.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pentatomoideae. | Brachypelta aterrima Forst. |
| Thyreocoris scarabaeoides L. | Gnathoconus albomarginatus |
| Cydnus nigrita F. | Goeze. |
| — flavicornis F. | — picipes Fall. |

- Sehirus luctuosus* M. R.
 — *morio* L.
 — *bicolor* L.
 — *dubius* Scop.
 — *biguttatus* L.
 — *b. v. concolor* Nickerl.
Ochetostethus nanus H. Sch.
Coptosoma scutellatum Geoffr.
Odontoscelis fuliginosa L.
 — *dorsalis* F.
Phimodera galgulina H. Sch.
Eurygaster austriacus Schrk.
 — *au. v. Frischii* Goeze.
 — *maurus* L.
 — *m. v. pictus* F.
Graphosoma italicum Muell.
Podops inuncta F.
Menaccarus arenicola Scholtz.
Sciocoris macrocephalus Fieb.
 — *microphthalmus* Flor.
 — *umbrinus* Wolff.
 — *Rotermundi* Schum.
 — *cursitans* F.
 — *homalonotus* Fieb.
Aelia acuminata L.
 — *Klugi* Hahn.
 — *rostrata* Boh.
Neotiglossa pusilla Gmel.
Stagonomus pusillus H. Sch.
Eusarcus aeneus Scop.
 — *melanocephalus* F.
Rubiconia intermedia Wolff.
Peribalus vernalis Wolff.
 — *sphacelatus* F.
Palomena viridissima Poda.
 — *v. v. simulans* Put.
 — *prasina* L.
 — *p. v. subrubescens* Grsk.
Chlorochroa juniperina L.
 — *pinicola* Muls.
- Carpocoris fuscispinus* Boh.
 — *purpureipennis* D. G.
 — *lunulatus* Goeze.
Dolycoris baccarum L.
Eurydema festivum L.
 — *f. v. decoratum* H. Sch.
 — *dominulus* Scop.
 — *oleraceum* L.
Piezodorus lituratus F.
 — *l. v. alliaceus* Germ.
Rhaphigaster nebulosa Poda.
Pentatoma rufipes L.
Aconthosoma haemorrhoidale L.
Elasmotethus interstinctus L.
Elasmucha ferrugata F.
 — *piceicolor* Westw.
 — *grisea* L.
Cyphostethus tristriatus F.
Pinthaeus sanguinipes F.
Picromerus bidens L.
Arma custos F.
Troilus luridus F.
Rhacognathus punctatus L.
Jalla dumosa L.
Zicrona coerulea L.
2. Coreoideae.
- Gonocerus acuteangulatus* Goeze.
Verlusia rhombea L.
Coreus scapha F.
Syromastes marginatus L.
Spathocera laticornis Schill.
 — *Dalmanni* Schill.
Pseudophloeus Falleni Schill.
Bathysolen nubilus Fall.
Arenocoris spinipes Fall.
Ceraleptus lividus Stein.
Coriomeris denticulatus Scop.
Stenocephalus agilis Scop.
Alydus calcaratus L.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Scholz M. F. Richard

Artikel/Article: [Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. 373-376](#)