

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

33. Fam. Sphingidae.

Aspidiphorus orbiculatus Gyll. — Grh. 6.—10.

34. Fam. Lyctidae.

Lyctus linearis Goeze. — 7. (In der Wohnung)

35. Fam. Cisidae.

Cis nitidus Hbst. — Bl. 5.—10.

boleti Scop. — Grh. Grt. Kb. 3. 4. 5. 8. 9. 10.

hispidus Gyll. — Grh. 3. 6. 9. 10. 11.

Ennearthron affine Gyll. — Grh. 3. 6. 9. 10. 11.

Octotemnus glabriculus Gyll. — Grh. Boll. Rk. 2.—10.

36. Fam. Colydiidae.

Ditoma crenata F. — Grh. Sb. Kb. 5.—9.

a. *rufipennis* F.

Cerylon histeroides F. — Grh. Grt. 5.—11.

37. Fam. Endomychidae.

Mycetaea hirta Mrsh. — 2.—10. (Zahlreich im Keller)

38. Fam. Coccinellidae.

Subcoccinella 24-punctata L. — Boll. 3.—9. (Zahlreich an Fichten)

a. *limbata* Moll. — a. *quadrinotata* F. — a. *haemorrhoidalis* F. (und zahlreiche Übergänge)

Cyenetis impunctata L. — Grt. Boll. 4. 5. 6. 9.

a. *palustris* Redt.

Coccidula rufa Hbst. — Grh. Grt. 6.—10.

scutellata Hbst. — Grh. Ohlhof 6.—10.

Scymnus impexus Muls. — Bl. 6.

testaceus a. *scutellaris* Muls. — Grt. 5. (Auf Weide)

haemorrhoidalis Hbst. — Grh. Bl. 6. 9. 10.

nigrinus Kugel. — Grt. Gt. Rb. 5.—9.

auritus Thunb. — Grt. Hko. Sb. 3.—12. (10. Kopula)

rubromaculatus Goeze. — Sb. 5. 7. 8.

- Scymnus abietis* Payk. — Boll. At. Wt. 4.—12.
? silesiacus Wse. — Grh. 9.
rufipes F. — Boll. 6.
bipunctatus Kugel. — Rb. 8. 9. (Gartenhecke)
suturalis Thunb. — Grt. Boll. 4.—9.
 a. *limbatus* Steph.
subvillosus Goeze. — Boll. 9.
Apetzi Muls. — Grh. 5.
frontalis F. — Boll. 5. (Unter Steinen). 6. 9. 10.
punctillum Wse. — Grh. Rb. 3. 4. 5. 8. 9.
Redtenbacheri Muls. — Boll.
- Hyperaspis reppensis* Hbst. — Grt.
campestris Hbst. — Grh. 6. 7.
- Chilocorus renipustulatus* Scriba. — Grh. Grt. Rb. 2.—10.
bipustulatus L. — Grh. Grt. Boll. 2.—5. 8. 9. (Kiefer)
- Exochomus flavipes* Thunb. — Grt. 6.—9. (Kiefer)
 v. *collaris* Küst.
quadripustulatus L. — 8. 9.
- Hippodamia tredecimpunctata* L. — Grt. Boll. Et. 6.—9.
 a. *spissa* Wse.
septemmaculata Deg. — Grt. 3. 6.—9.
 a. *aestiva* Wse. — a. *baltica* Wse.
- Adonia variegata* Goeze. — Grt. Boll. Sb. 4.—9.
 a. *neglecta* Wse. — a. *inhonesta* Wse. — a. *cor-*
sica Reiche. — a. *carpini* Fourcr. — a. *5-macu-*
lata F. — a. *constellata* Laich. — a. *observe-*
punctata Schrnk.
- Aphidecta oblitterata* L. — Grt. Boll. Gt. 3.—9.
 a. *livida* Deg. — a. *sexnotata* Thunb. — a. *Illigeri*
 Wse. — a. *fenestrata* Wse. — a. *sublineata* Wse.
- Anisosticta 19-punctata* L. — Et. Grh. 5.—10.
- Coccinella septempunctata* L. — Überall. 3.—9. (Auch im Winter)
 a. *externepunctata* Wse. — a. *zapluta* Wse. —
 a. *Weisei* Gradl. — a. *maculosa* Wse.
distincta Fald. a. *magnifica* Redt. — Grh. 5.
 a. *Sedakovi* Muls. — Et. 6.
5-punctata L. — Grh. Boll. Sb. 6.—9.
 a. *simulatrix* Wse.
11-punctata L. — Grt. 6. 7. 8.
 a. *longula* Wse. — a. *variegata* Wse.

- Coccinella hieroglyphica* L. — Grh. Boll. Grt. 4.—9.
 Hierzu 8 benannte Aberrationen.
14-pustulata L. — Sb. 7. 8.
 a. *cingulata* Wse.
bipunctata L. — Überall. 3.—10.
 Hierzu 12 benannte Aberrationen.
decempunctata L. — Überall. 3.—10.
 Hierzu 20 benannte Aberrationen.
quadripunctata Pontopp. — Grt. Boll. 4.—8.
 a. *nebulosa* Wse. — a. *abieticola* Wse. — a. *16-punctata* F. — a. *sordida* Wse.
- Anatis ocellata* L. — Überall auf Nadelholz. 5.—11.
 a. *Boeberi* Cederj. — a. *subfasciata* Wse. —
 a. *bicolor* Wse. — a. *biocellata* Wse.
- Paramysia oblongoguttata* L. — Überall auf Nadelholz. 3.—12.
 a. *obscuroguttata* W. Jac.
- Halysia 12-guttata* Poda.
22-punctata L. — Grh. Boll. Sb. 6.—9.
14-guttata L. — Grh. Grt. Nnb. 3.—9.
18-guttata L. — Grh. Nnb. Grt. 3.—9.
 a. *silvicola* Wse.
14-punctata L. — Überall. 5.—10.
 Hierzu 7 Aberrationen.
39. Fam. Dermestidae.
- Dermestes lardarius* L. — 4.—7. (In der Wohnung)
bicolor F. — Grh. 6.
- Attagenus Schäfferi* Hbst. — Grt.
pellio L. — Grh. 3.—6. (Auch oft in der Wohnung)
- Megatoma undata* L. — Grh. 5.
- Globicornis marginata* Payk. — Boll. 6.
corticalis Eichh. — Grt.
- Anthrenus scrophulariae* L. — Boll. 2. 6. 7.
verbasci L. — Grh. 7.—11. (Auch in der Wohnung)
museorum L. — Boll. Sb. 6.—8.
fuscus Oliv. — Ot. 6. 7.

40. Fam. Nosodendridae.

(Nicht vertreten)

41. Fam. Byrrhidae.

Simplocaria semistriata F. — Boll. Nb. Stb. 3.—6. 8.—12. (Unter Moos)

Cytilus sericeus Forst. — Grh. Boll. Nb. 2. 5. 6. 9. 10.

Byrrhus fasciatus Forst. — Grt. Boll. 4.—8.

pilula L. — Überall.

arietinus Steff. — Gt. 5. (Uferstein)

pustulatus Forst.

glabratus Heer. — 7.

42. Fam. Georyssidae.

(Nicht vertreten)

43. Fam. Dryopidae.

Dryops Ernesti Gozise — Grt. 4.

auriculatus Geoffr. — Gt. 4.—9.

Esolus angustatus Müll. — Grt. Et. 4.—8.

parallelepipedus Müll. — Grt. 4.

Latelmis Germari Er. — Gt. Pt. 5.—9.

44. Fam. Heteroceridae.

(Nicht vertreten)

45. Fam. Buprestidae.

Anthaxia quadripunctata L. — Sb. Stb. 6. 7.

Agrilus biguttatus F. — Grh.

Trachys minuta L. — Grh. Nb. 5.—9.

46. Fam. Trixagidae.

Trixagus dermestoides L. — Boll. Sb. 4.—7.

carinifrons Bonv. — Grh. Gt. 3.—8.

elateroides Heer. — Grh. Nb. 4.—11.

47. Fam. Eucnemidae.

(Nicht vertreten)

48. Fam. Cerophytidae.

(Nicht vertreten)

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 417-420](#)