

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

49. Fam. Elateridae.

Brachylacon murinus L. — Grh. Boll. 5.—7.

a. *Kokeili* Küst.

Corymbites virens Schrnk. — Nb. Wt. 5. 6. 11. 12. (Unter Moos)

Heyeri Saxes. — Grt. 5.

pectinicornis L. — Grh. Hb. Rb. 5.—7.

cupreus F. — Boll. Gt. Brautst. 5. 6.

a. *aeruginosus* F. — Eine andere abweichende Form ist wie *aeruginosus*, aber 3.—5. Zwischenraum der Fld. hinter der Basis bis zur Mitte der Länge gelb.

tessellatus L. — Grh. Grt. 5. 6.

a. *assimilis* Gyll. — a. *virgulatus* Schwz.

purpureus Podā. — Grh. Nb. Rb. 4.—7.

castaneus L. — Grh. Grt. 4. 5. (Weide, Espe, Kiefer)

Selatosomus incanus Gyll. — Grt. Gt. Wt. 5.—7.

a. *ochropterus* Steph.

impressus F. — Grh. Gt. Nb. 4.—7.

a. *rufipes* Schils.

latus F. — Gt. 8.

aeneus L. — Boll. Sb. Grh. 4.—7.

a. *germanus* L. — a. *coeruleus* Schils. — a. *cyaneus* Mrsh. — a. *subpuberulus* Reitt.

Prosternon holosericeus Oliv. — Grh. 4.—8.

Hypogonus cinctus Payk. — Hainholz 6.

Sericus brunneus L. — Grh. Grt. 4.—7. (Auf Kiefer)

Dolopius marginatus L. — Grh. Nb. Boll. Das ganze Jahr.

Agriotus aterrimus L. — Grh. 5.—7. (Auf Eiche)

pilosus Pnz. — Grh. Sb. 4.—7.

ustulatus Schall. — Grh. 6. 7.

sputator L. — Boll. 3.—6.

a. *rufulus* Lac.

lineatus L. — Grh. 7.

obscurus L. — Grh. Boll. Sb. 3.—7.

a. *badius* Müll. — a. *cinnamomeus* Buyss.

- Agriotes acuminatus* Steph. — Grh. Boll. 4. 5.
gallicus Lac. — Grh. Sb. Boll. 6.—8.
pallidulus Illig. — Nb. Gt. 5.—8.
- Synaptus filiformis* F. — Grh. 5.—8.
- Adrastus axillaris* Er. — Boll. Sb. 6. 7.
pallens F. — Rb. 7.
rachifer Geoffr. — Sb. Gt. 6.—8.
- Limonius pilosus* Leske. — Boll. Sb. 5.—7.
aeruginosus Oliv.
minutus L. — Grh. Rb. Sb. 4.—8.
parvulus Pnz. — Grh. Boll. Sb. 4.—7.
- Pheletes aeneoniger* Deg. — Grt. Nb. Wt. 3.—7.
lythroides Germ.
a. *nigricollis* Schils.
- Athous hirtus* Hbst. — Grh. Boll. Gt. 6.—8.
niger L. — Grh. 6. 7.
a. *scrutator* Hbst.
vittatus F. — Grh. Gt. 5.—7.
Hierzu 6 benannte Aberr.
haemorrhoidalis F. — Grh. Boll. 5.—8.
a. *ruficaudis* Gyll. — a. *faeculentus* Buys. —
a. *leucophaeus* Lac.
subfuscus Müll. — Überall 5.—10.
a. *polonicus* Reitt. — a. *Kafkanus* Reitt.
longicollis Oliv. — Grh. Gt. 6.—8.
- Melanotus rufipes* Hbst. — 5. 6.
a. *bicolor* F.
crassicollis Er. — Grh. Nnb. 4.—6.
punctolineatus Peler. — Gtch. 6. 7.
- Hypnoidus dermestoides* a. *tetragraphus* Germ. — Grt. O. 4. 7.
- Cryptohypnus riparius* F. — Grt. Gt. 3.—7.
- Elater cinnabarinus* Eschsch. — Grh. 6.
sanguineus L. — Rb. Sb. Düt. 5.—7.
pomonae Steph. — Grh. 5. 6.
ferrugatus Lac. — Grh. 3. 9. 10.
a. *nigriventris* Reitt. — a. *adumbratus* Buys.
elongatulus F.
a. *balteatulus* Reitt. — Grh. Nb. Gt. 5.—7.
balteatus L. — Nb. Sb. 5. 6.
aethiops Lac. — Grt. 5.

Denticollis linearis L. — Grh. Grt. 6.

a. *variabilis* Deg. — a. *erythrocephalus* W. Jac.
rubens Piller. — Grh. 6.

50. Fam. Helodidae.

Helodes minuta L. — Grh. Grt. 5.—7.

a. *laeta* Pnz.

marginata F. — Gst. Wt. 5. 6.

a. *nigricans* Schils.

Microcara testacea L. — Grh. 9.

Cyphon variabilis Thunb. — Grh. 4. 5. 6. 9.

a. *nigriceps* Kiesw.

padi L. — Grh. Grt. 5. 6.

a. *discolor* Pnz. — a. *gratiosus* Kolen.

coarctatus Payk. — Grt. 6. 7.

a. *palustris* Thoms.

Paykulli Guer. — Grt. Grh. Boll. 5.—7.

a. *alpinus* Bourg.

Eubria palustris Germ. — Grt. 7.

51. Fam. Cantharidae.

Dictyopterus minutus F. — Grt. Boll. 8.—10.

affinis Payk. — Grt. Hko. Gt. 7.

Aurora Hbst. — At. 5. (Unter Fichtenrinde)

Podabrus alpinus Payk. — Grh. Boll. Hb. 5.—7.

a. *Mocquerysi* Rche. — a. *lateralis* Er. — a. *annulatus* Fisch.

Cantharis violacea Payk. — Nb. Rb. Grh. 5.—7.

a. *tigurina* Dietr.

fusca L. — Grh. Boll. 5. 6.

a. *conjuncta* Schils.

rustisa Fall. — Boll. 5.—7.

pellucida F. — Grh. 5. 8.

a. *Rauterbergi* Reitt.

fulvicollis F. — Grh. Sb. 5.—7.

paludosa Fall. — Grt. Gt. 5.—7.

obscura L. — Überall. 5.—7.

albomarginata Märk. — Grt. Gst. Hb. 5.—7.

lateralis L. — Grh. 6.—8.

a. *nigronotata* Pic.

- Cantharis nigricans* Müll. — Grh. Boll. Sb. 5.—7.
 a. *immaculata* Schils. — a. *picipes* W. Jac.
Erichsoni Bach. — Grh. 7.
sudetica Letzn. — Boll. 6. 7.
quadripunctata Müll. — 6.
rufa L. — Grh. Sb. 5.—8.
 a. *liturata* Fall.
livida L. — Boll. Grh. 6. 7.
 v. *rufipes* Hbst. — a. *eremita* Rosenh. —
 a. *luteiceps* Schils. — a. *scapularis* Redt.
figurata Mnnh. — Grt. Sb. Wt. 6. 7.
 a. *luteata* Schils.
pallida Goeze. — Grh. Boll. Gt. 5.—7.
discoidea Ahr. — Grh. Boll. Rb. 6. 7. (Kopula)
 a. *liturata* Redt.
haemorrhoidalis F. — Boll. 5. 6. (Auf Fichte)
- Absidia pilosa* Payk. — Grh. 6.
- Rhagonycha translucida* Kryn. — Grt. Sb. 6. 7.
lutea Müll. — Hko. Rk. Rb. 6.—8.
 a. *Märkeli* Kiesw.
fulva Scop. — Boll. Rb. Sb. 7.
testacea L. — Grh. Grt. 5.—7.
limbata Thoms. — Grh. Boll. Sb. 5. 6.
lignosa Müll. — Grh. Boll. Hb. 5. 6.
 a. *pallipes* F.
elongata Fall. — Grh. 6. 7.
atra L. — Grt. Boll. Gt. 6. 7.
- Malthinus flaveolus* Payk. — Grh. Boll. 4.—7.
 a. *immunis* Mrsh.
biguttulus Payk. — Gt. Rk. 6. 7.
- Malthodes marginatus* Latr. — Grh. 5. 6.
mysticus Kiesw. — Nb. 6. 7.
 a. *obscuriusculus* Dietr.
minimus L. — 7.
fuscus Waltl. — Grt. Boll. Rk. 6. 7.
flavoguttatus Kiesw. — Gst. 6. 7.
dispar Germ. — Grh. Grt. Gst. 6. 7.
maurus Casteln. — Hb. Rk. Pt. 5.—7.
 a. *misellus* Kiesw.
brevicollis Payk. — Grh. Grt. Boll. 6. 7.
spathifer Kiesw. — Grh. 5. 6. (Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 439-442](#)