

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

- Malthodes hexacanthus* Kiesw. — Boll. Nb. Rb. 6. 7.
 a. *tetracanthus* Kiesw. (Spitze später verdunkelt)
fibulatus Kiesw. — Grh. 5. 6.
- Charopus pallipes* Oliv. — Grh. Sb. 6. 7. 8.
flavipes Payk. — Grh. Boll. 5.—8.
- Anthocomus rufus* Hbst. — Grh. Boll. Nb. 8. 9.
bipunctatus Harrer. — Boll. Sb. 4. 5. 6.
fasciatus L. — Grh. Grt. 5. 6.
- Axinotarsus pulicarius* F. — Boll. Sb. 6. 7. 8.
marginalis Lap. — Rb. 6. 7.
- Malachius bipustulatus* L. — Grh. Gst. 5. 6. 7.
 a. *immaculatus* Rey. — (1 ♀ bronzefarbig)
marginellus Oliv. — Sb. 4.
- Dasytes niger* L. — Grh. Sb. 5. 6. 7.
obscurus[^] Gyll. — Grh. Sb. 6. 7.
coeruleus F. — Grh. Boll. 5. 6.
aerosus Kiesw. — Grh. Grt. 5. 6.
 a. *variicornis* Schils.
plumbeus Müll. — Überall. 5.—8.
 a. *nigrofemorialis* Schils.
flavipes Oliv. — Grh. Sb. 6. 7. 8.
fuscus Illig. — 6. 7. 8.
- Haplocnemus pini* Redt. — Boll. 6. 7.
nigricornis F. — Boll. Rb. 4.—9. (Auf Fichte)

52. Fam. Dascillidae.

- Dascillus cervinus* L. — Grt. Hb. Rb. 6. 7.

53. Fam. Cleridae.

- Opilo domesticus* Strm. — 8. (Im Haus)
Thanasimus formicarius L. — Grh. Nb. Rb. 3.—7. (Auf Kiefern)
Corynetes coeruleus Deg. — 4.—7. (Im Haus)
 a. *ruficornis* Strm.

54. Fam. Derodontidae.

- Laricobius Erichsoni* Rosenh. — Grh. Grt. Sb. 4. 5. (Auch auf Pinus)

55. Fam. Lymexylonidae.

Hylecoetus dermestoides L. — Grh. 5. 6.a. *morio* F.

56. Fam. Psoidae.

(Nicht vertreten)

57. Fam. Bostrychidae.

(Nicht vertreten)

58. Fam. Anobiidae.

Hedobia imperialis L. — Bl. 5. 6.*Dryophilus rugicollis* Muls. — Rb. 7.*longicollis* Muls. — Rb. Boll. 5. 6.*pusillus* Gyll. — Boll. Rb. 5.*Ernobius nigrinus* Strm. — Grt. 5. 6.a. *politus* Redt.*densicornis* Muls. — Sb. 6.*tabidus* Kiesw. — Boll.*parvicollis* Muls. — Boll. 6. 7.*angusticollis* Ratzeb. — Boll. 6. 7.*lucidus* Muls. — Gt. 7. 8.*pini* Strm. — Boll. 5.*mollis* L. — Grh. Boll. 6.—9. (Kopula 9.)*Xestobium plumbeum* Illig. — Grh. 5.*Anobium pertinax* L. — (Im Haus) 3. 4.*emarginatum* Dft. — Sb. 7.*striatum* Oliv.*nitidum* Hbst. — (Im Haus) 7.*fulvicorne* Strm. — Rb. 4.—8. (Zaun)*Sitodrepa panicea* L. — (In der Wohnung) 7. 8.*Ptilinus pectinicornis* L. — Grt.*Ochina ptinoides* Mrsh. — 6.

59. Fam. Ptinidae.

Niptus hololeucus Fald. — (Im Keller) 7.*Ptinus rufipes* Oliv. — Rb. 6. 7.*fur* L. — (Im Keller) 7.—11.*brunneus* Dft. — Grt. 3. (Im Haus)*raptor* Str. — (Kasern.—Vorräte) 8.

60. Fam. Tenebrionidae.

- Blaps lethifera* Mrsh. —
 mortisaga L. — (Im Keller)
Opatrum sabulosum L. — Grt.
Tenebrio molitor L. — 7.

61. Fam. Alleculidae.

- Isomira murina* L. — Sb. 6, 7.
 a. *evonymi* F. — a. *thoracica* F.

62. Melandryidae.

- Orchesia minor* Walker — Rb. 7.—9.
Melandrya caraboides L. — Grh. 6.

63. Fam. Mordellidae.

- Mordella maculosa* Naezen. — Hko. 8.
 aculeata L. — Grh. Sb. 6.—8.
 a. *leucaspis* Küst.
Mordellistena humeralis L. — Grh. Rb. 7.—8.
 lateralis Oliv. — Grh. 7.
 brevicauda Bohem. — Grt. 7.
 pumila Gyll. — Boll. Sb. O. 5.—7.
Cyrtanaspis phalerata Germ. — Sb. 7.
Anaspis pulicaria Costa — Grh. Grt. Nb. 5.—7. 10. 11.
 frontalis L. — Boll. Sb. Nb. 4.—8.
 a. *lateralis* F.
 thoracica L. — Grh. Rb. 5.—8.
 a. *fuscescens* Steph. — a. *Gerhardti* Schils.
 latipalpis Schils. — Grh. Boll. Sb. 6.—9.
 arctica Zettst. — Grh. Rb. 6.—8.
 flava L. — Grh. 7.
 Costae Emery — 7.
 melanostoma Costa — Sb. 6.
 rufilabris Gyll. — Gt. Rb. Sb. 4.—7. 11. 12.
 a. *obscuripes* Schils.

64. Fam. Rhipiphoridae.

(Nicht vertreten)

65. Fam. Pyrochroidae.

- Pyrochroa coccinea* L. — Gst. 5.
pectinicornis L. — Grh. Grt 5. 6.

66. Fam. Meloidae.

- Meloë proscarabaeus* L.
violaceus Mrsh. — Boll. 4. 5.

67. Fam. Anthicidae.

- Anthicus floralis* L. — Boll. Sb. Gt. 7.—9. 10. (Kopula) 11. 12.
formicarius Goeze. — Grh. 6. 9.—12.
antherinus L. — Grt. 5.

68. Fam. Oedemeridae.

- Chrysanthia viridissima* L. — Stb. 6.
viridis Schmidt. — Grh. Sb. 7. 8.
 a. *geniculata* Heyd. — a. *cupreomicans* Westh.
Oedemera virescens L. — Grh. Grt. Sb. 5. 6.
 a. *cupreomicans* Reitt.
lurida Mrsh. — Sb. Stb. 6. 7.

69. Fam. Lagriidae.

- Lagria hirta* L. — Grh. Sb. Rb. 7.—9.

70. Fam. Pythidae.

- Sphaeriestes castaneus* Pnz. — Grt. Boll. Sb. 3.—9.
foveolatus Ljung. — Grt.
Rhinosimus planirostris F. — Grh. Hko. Rb. 1.—10.
ruficollis L. — Grt.

71. Fam. Cerambycidae.

- Prionus coriarius* L. — Grh.
Ergates faber L.
Hargium sycophanta Schrnk. — Grh.
mordax Deg. — Grh. 5.
 a. *bimaculatum* W. Jac. — Grh.
inquisitor L. — Hko. Hb. Rb. 5. 8. (unreif) 9. (Larve)
 10. 11. 12. (frisch)
Rhagium bifasciatum F. — Grh. Wt. Rb. 5. 6. 10.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 455-458](#)