

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

- Phyllodecta vitellinae* L. — Bl. 5. 6.
 a. *brevicollis* Motsch.
 atrovirens Corn. — Nb. 4.—8.
- Hydrothassa marginella* L. — Boll. Grt. Sb. 3.—6.
 hannoverana F. — Grt.
 aucta F. — Boll. Grt. Sb. 3.—8.
- Prasocuris phellandrii* L. — Grt. Boll. 4. 5.
 junci Brahm. — Grt. Gb. 5.—7.
- Phaedon cochleariae* F. — Grh. Grt. Boll. 3.—9.
 a. *neglectus* Sahlb.
 v. *obtusus* Wse.
 armoraciae L. — Grt. Boll. Sb. 6.—9.
 a. *concinus* Steph.
- Galeruca tanacetii* L. — Grh. Boll. Sb. 6.—9. (♀ gravid.)
 pomona Scop. — Grt. 8. 9.
- Lochmaea capreae* L. — Grh. Grt. Nb. 4.—9.
 a. *scutellata* Chevrl. — a. *luctuosa* Wse.
 suturalis Thoms. — Gt. Hb. 4. 5. 8. 9. (an Calluna).
 a. *nigrita* Wse.
 crataegi Forst. — Grh. Sb. 4.—8.
 a. *binotata* Dft.
- Sermylassa halensis* L. — Grh. Sb. Rb. 7.—9.
 a. *cuprina* Wse.
- Galerucella yiburni* Payk.
 lineola F. — Grh. Grt. 4.—10.
 calmariensis L. — Grh. Et. 5. 6.
- Agelastica alni* L. — Grt. 6.
- Luperus pinicola* Dft. — Sb. 7.
 a. *silvestris* Wse.
 longicornis F. — Grh. Nb. Sb. 6.
 niger Goeze — Boll. Sb. Grh. 5.—7.
 flavipes L.
 viridipennis Germ. — Sb. 6. 7.
- Derocrepis rufipes* L. — Grh. Boll. 4.—9.
- Crepidodera transversa* Mrsh. — Grh. 6.—8. (Kopula).

- Crepidodera ferruginea* Scop. — Grh. O. 6.—8.
 interpunctata Motsch. — Grh. 6.
 femorata Gyll. — Gt. 8.
- Ochrosis ventralis* Illig. — Grh. 5. 6.
- Lythraria salicariae* Payk. — 5.—8.
- Glyptina rubi* Payk. — Rb. 5.—9.
- Hippuriphila Modeeri* L. — Grh. Grt. 3.—6. 9. 10.
 a. *bimaculata* Wse.
- Chalcoides fulvicornis* F. — Grh. 5.
 a. *pivicornis* Wse.
 aurea Geoffr. — Grh. Nb. 5.—8.
 a. *laeta* Wse.
 lamina Bedel. — a. *cuprea* Wse. — Nb. 5.
 Plutus Latr. — Sb. 5.
 aurata Mrsh. — Grh. Nb. 5.—8.
 nitidula L. — Grh. Nb. 3.—8.
- Mantura chrysanthemi* Koch. — Boll. Hb. Hko. 3. 7. 8. 10. 11.
 rustica L. — Boll. 3. 6. 7.
- Chaetocnema concinna* Mrsh. — Grh. Boll. D. g. Jahr.
 aridella Payk. — Grh. Grt. 6.—9.
- Haltica oleracea* L. — Grh. Nb. Sb. 2. 3. 5.—10.
 a. *nobilis* Wse. — a. *lugubris* Wse.
- Phyllotreta exclamationis* Thunb. — Grt. Sb. 3. 6. 7.—10.
 a. *vibex* Wse.
 flexuosa Illig. — Grh. 5.
 tetrastigma Com. — Grh. Grt. Gt. 3.—6. 9. 10.
 a. *dilatata* Thoms.
 vittata F. — Nb. 6.
 nemorum L. — Überall d. g. Jahr.
 undulata Kutsch. — Grh. Boll. d. g. Jahr
 vittula Redt. — Grh. Boll. Sb. 4.—10.
 cruciferae Goeze — Überall 6.
 atra F. — Überall d. g. Jahr.
 nigripes F. — Überall d. g. Jahr.
 nodicornis Mrsh. — Sb. 6. 7.
- Aphthona cyparissiae* Koch. — Sb. 6. 7.
 cyanella Redt. — Sb. 6. 7.
 pygmaea Kutsch. — Grh. Sb. 2.—5. 7. 10.—12.
 euphorbiae Schrnk. — Grh. 5.—8.
 venustula Kutsch. — Sb. 4.—9.
- Longitarsus rubiginosus* Foudr. — Boll. 9.

- Longitarsus succineus* Foudr. — Sb. 7.
pellucidus Foudr.
 a. *nigriventris* Wse. — Sb. 7.
exoletus L. — Sb. 6. 7.
atricillus L. — Boll. Sb. 5.—8.
 a. *declivis* Wse.
Ganglbaueri Hktgr.
suturellus Dft. — Nb. Gt. 3. 8.—10.
melanocephalus Deg. — Überall d. g. Jahr.
 v. *Kutscherae* Rye. — Grt. 5.
lycopi Foudr. — Sb. 8.
curtus All. — Grh. Boll. 4.—9.
nasturtii F. — Boll. 8. 9.
luridus Scop. — Grt. Sb. Boll. 6.—9.
 a. *quadrisignatus* Dft.
apicalis Beck. — Boll. 8. 9.
Sphaeroderma testaceum F. — Grh. Hko. Sb. 7.—9.
rubidum Graëlls — Stb. Sb. 7.
Apteropeda orbiculata Mrsh. — Grh. 5. 6. (Auf *Mercurialis* perennis).
globosa Illig. — Grh. 6.—8. (Auf *Mercurialis* perennis).
Psylliodes chrysocephala L. — Grh. Grt. Boll. 6.—9.
napi F. — Grh. Grt. Boll. 3. 6.—8.
affinis Payk. — Überall 4. 6.—9.
picina Mrsh. — Rb. 6.
chalcomera Illig. — Grh. Sb. Et. 5.—7. (Auf *Disteln*).
Hispella atra L. — Grh. 6. 7.
Cassida viridis L. — Grh. Grt. Sb. 3.—9.
flaveola Thunb. — Überall das ganze Jahr.
nebulosa L. — Grh. Grt. Boll. 3.—9.
rubiginosa Müll. — Grh. Boll. Sb. 3.—9.
vibex L. — Boll. Grt. 6.—9.
 a. *discoidea* Wse.
sanguinosa Sffr. — Grh. O. Sb. 6. 7.
 a. *viridissima* Reitt.
vittata Villers. — Sb. 6.
nobilis L. — Grh. Boll. Nb. 3.—9.
 a. *rosea* Ill. — a. *obscura* Wse.

73. Fam. Lariidae.

Spermophagus cisti F.

- Laria rufimana* Bohem. — Boll. 6.
atomaria L. — Boll. Nb. Sb. 5.—7.
lentis Fröhlich. — 5.
 ? *Bruchidius perparvulus* Bohem. — 5.
cisti Payk. — Sb. 10. 11. (Besenginster)

74. Fam. Anthribidae.

- Urodon rufipes* Oliv. — Sb. 7.
Platystomus albinus L. — Grh. 5. 6.
Anthribus nebulosus Forst. — Rb. Nb. Gt. 5.—9. (Fichte).
 v. *Küsteri* Reitt.

75. Fam. Curculionidae.

- Otiorrhynchus niger* F. — Überall auf Nadelholz. 5.—9.
 a. *villosopunctatus* Gyll. — a. *montanus* Bohem.
fuscipes Oliv. — Brautst. Boll. 5.—8.
morio F.
laevigatus F. — Hb. Sb. Boll. 4.—7.
hirticornis Hrbst. — Brautst. Grt. Gt. 5.—8. (Fichte)
raucus F. — Sb. 5.
scaber L. — Grt. Boll. Gt. 4.—10.
singularis L. — Boll. Nb. Hb. 4.—7. 10.—12.
 v. *Marquardtii* Fld.
sulcatus F. — Rb. 6.—7.
salicis Ström. — Boll. Gt. 4.—8.
ovatus L. — Boll. Sb. 6.—9. (Steine, Fichte)
ligustici L. — Sb. 4.—7.
Phyllobius calcaratus F. — Grh. Nb. Boll. 4.—7.
 a. *atrovirens* Gyll. — a. *densatus* Schills.
urticae Deg. — Grh. Boll. Sb. 5. 6.
 a. *caesius* Steph.
arboreator Hbst. — 5.
maculicornis Germ. — Grh. 5. 6.
piri L. — Sb. — 4.—6.
 a. *vespertinus* Gyll. — a. *mali* Gyll.
betulae F. — Grh. 5. 6.
 a. *etruscus* Desbr.
argentatus L. — Grh. Sb. 5. 6.
 a. *viridans* Boh.
oblongus L. — Grh. Nb. 5. 6.
 a. *floricola* Hbst.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 8-11](#)