

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

- Phyllobius virideaeris* Laich. — Boll. 6. 7.
 a. *cinereipennis* Gyll.
 parvulus Oliv. — Hb. Boll. 5.—7.
 a. *cinereus* Schils.
 viridicollis F. — Boll. Nb. Sb. 5.—7.
- Eusomus ovulum* Germ. — Boll. Hb. Grh. 7.
 a. *griseus* Hochh.
- Sciaphilus asperatus* BOND. — Grh. Boll. Stb. 3.—12.
- Brachysomus echinatus* BOND. — Grh. Boll. 4.—6.
- Foucartia squamulata* Hbst. — Sb. 6.
- Barypithes pellucidus* Boh. — Boll. 5.
 trichopterus Gaut. — Rk. 7. 8.
 mollicomus Ahrens. — 5.—7.
- Polydrosus impar* Gozis. — Boll. Rb. Gt. 6. 7.
 atomarius Oliv. — Grt. Boll. Hb. 5.—8.
 a. *pallidus* Gyll. — a. *melanopus* Schils.
 mollis Ström. — Boll. Rb. Grh. 5.
 a. *chlorophanus* Westh.
 amoenus Germ. — Hko. Hb. 4.—7.
 a. *Hopffgarteni* Strl.
 sericeus Schall. — Grh. Sb. 4.—9.
 cervinus L. — Überall. 4.—6.
 a. *maculosus* Hbst. — a. *melanotus* Steph.
 pilosus Gredl. — Boll. 5. 6.
 ruficornis BOND. — Grh. 5.
 tereticollis Deg. — Grh. Boll. 5.—7.
 a. *uniformis* Strl. — a. *niveopictus* Reich. — a.
 undatus F.
 impresifrons Gyll. — Sb. 7.
 pterygomalis Sch. — Hb. 5.
- Liophloeus tessulatus* Müll. — Grh. Nb. 4.—7.
 Schmidti Boh.
- Strophosomus melanogrammus* Först. — Grh. Nb. Boll. 2.—10.
 rufipes Steph. — Grh. 1. 4.—9.
 a. *capitatus* Deg.

- Barynotus obscurus* F. — Boll. Stb. Sb. 5.—6.
alternans Boh. — Grh. 6. 8. 9. (Auf Mercur. perennis)
- Sitona cambricus* Steph. — Grt.
tibialis Hbst. — 7.
lineatus L. — Grh. Boll. Sb. 2.—9.
 v. *stricticollis* Desbr. — v. *oculatus* Desbr.
saturalis Steph. — Hb. 6. 7.
 v. *lateralis* Gyll.
sulcifrons Thunb. — Grh. Boll. 7.—10.
 a. *campestris* Oliv. — v. *rasisis* Hoch.
flavescens Mrsh. — Grh. Boll. Sb. 4.—9.
puncticollis Steph. — Grh. Boll. Sb. 7.—9.
crinitus Hbst. — Grh. Sb. 4.—9.
 a. *albescens* Steph.
hispidulus F. — Grh. Boll. 1. 6.—9.
cylindricollis F. — Gt. 6.—9.
humeralis Steph. — Grh. Boll. Sb. 5.—9.
 v. *atritus* Gyll. — a. *maculatus* Motsch. .
- Trachyphloeus bifoveolatus* Beck. — Boll. Sb. 4.—8.
- Tropiphorus carinatus* Müll. — Grh. 4.—7. (Auf Mercur. perennis)
- Chlorophanus viridis* L. — Grh. 7.
- Cleonus piger* Scop. — Sb. 6.
- Larinus jaceae* F. — Grt. 7.
planus F. — Boll. Sb. 7.—9.
- Rhinocyllus conicus* Fröhlich. — Grh. Boll. 5. 6.
- Gronops lunatus* F. — 4.
- Hypera tessellata* Hbst. — Boll. 4. (Unter Steinen)
 ? *crinita* Schönh. — Boll. 5.
- Phytonomus fasciculatus* Hbst. — Grh. Sb. 5.—7.
punctatus F. — Boll. Sb. Gt. 7.—10.
rumicis L. — Grh. Boll. Nb. 3.—10.
adpersus F.
plantaginis Deg. — Sb. Gt. 6. 7.
contaminatus Hbst. — Grh. 6. 7.
meles F. — Grt. 6.
arator L. — Boll. Grt. 3. 6.—9.
pedestris Payk. — Grh. Sb. 6. 7.
variabilis Hbst. — Grh. Boll. Grt. 5.—10.
nigrirostris F. — Grh. Boll. Nb. 7.—10.
 a. *Stierlini* Cap.
trilineatus Mrsh. — 6.—8.

- Hylobius abietis* L. — Boll. Rb. Gt. 4.—9.
Liparus germanus L. — Grh. 6.
 coronatus Goeze. — Sb. 6. 7.
Epipolaeus caliginosus F. — 4. 5.
Pissodes piceae Illig. — Hko.
 notatus F. — Sb.
 pini L. — Grt. Bl. 5.—9.
 scabricollis Mill. — Boll. 4. 5.
 harcyniae Hbst. — Nb.
Magdalis ruficornis L. — Sb. 5.—7.
 barbicornis Latr. — Boll. 6.
 cerasi L. — Grh. 5. 6.
 carbonaria L. — Grh. 6.
 frontalis Gyll. — Grt. 5. 6.
 duplicata Germ. — 5. 6.
 memnonia Gyll. — Sb. 6. 7.
 linearis Gyll. — Grh. Gt. 6. 7.
 nitida Gyll. — Grh. Hko. Boll. 6.—9.
 ? *Weisei* Schrein. — Grt. 6.
 phlegmatica Hbst.
Anoplus plantaris Naezen. — Grh. Grt. Boll. 5.—8.
 roboris Sffr. — Grh. Grt. 4.—6.
Cossonus linearis F. — Grt. Boll. 5.—8.
Trachodes hispidus L. — Grh. 2.—6.
Cryptorrhynchus lapathi L. — Grh. Grt. 5.—7.
Micrelus ericae Gyll. — Rb. Rk. 6. 7.
Coeliodes erythroleucus Gmel. — Grh. Grt. 3.—7.
 ruber Mrsh. — Grh. Sb. Grt. 5.—7.
 dryados Gmel. — Grh. Sb. 3.—6. 10. 11.
 rubicundus Hbst. — Grh. Boll. Gt. 4.—8.
Stenocarus fuliginosus Mrsh. — Sb. 5. 8.
Craponius epilobii Payk. — Grh. Sb. 6.—8.
Cidnorrhinus 4-maculatus L. — Überall auf Nesseln. 3.—9.
 a. *rimulosus* Germ. — a. *nigrotibialis* Schultze.
Coeliastes lamii F. — Rb. 5.—9.
Sirocalus quercicola Payk. — 6. 9.
 nigrinus Mrsh. — Grh. Boll. Sb. 3.—10.
 floralis Payk. — Grh. Boll. Nb. 1.—5. 8.—12.
 pulvinatus Gyll. — 5.
Ceutorrhynchidius troglodytes F. — Boll. Sb. 5.—7.

- Ceutorrhynchus geographicus* Goeze. — Sb. 7.
angulosus Boh. — Boll. 9.
borraginis F.
litura F. — Boll. Sb. 6.—9.
rugulosus Hbst. — Grh. Boll. 5. 6.
pollinarius Forst. — Boll. 8.
marginatus Payk. — Boll. 6.
querceti Gyll. — a. *erythropterus* Strl. — Boll. 3.
napi Gyll. — Boll. Hko. 6. 7.
assimilis Payk. — Boll. Sb. Grh. 3.—10.
pleurostigma Mrsh. — Grh. Boll. 1. 2. 5.—12.
? *carinatus* Gyll.
cochleariae Gyll. — Grt. 5.—10.
quadridens Pnz. — Grh. Nb. Das ganze Jahr.
pictarsis Gyll. — Grh. Sb. 6. 10.
erysimi F. — Grt. Boll. 3.—12.
a. *chloropterus* Steph. — a. *cyaneus* Wse.
contractus Mrsh. — Grh. Sb. Das ganze Jahr.
- Rhinoncus bruchoides* Hbst. — a. *rufescens* Steph. — 7.
pericarpus L. — Grt. Sb. 5.—8.
perpendicularis Reich. — Grh. Boll. 5.—8.
- Phytobius 4-tuberculatus* F. — Grh. 3.—5. 8. 9.
- Baris lepidii* Germ. — 9.
- Limnobaris pilistriata* Steph. — St. Et. 6.
- Calandra granaria* L.
- ? *Balaninus pellitus* Boh. — Grh. 5.
venosus Grvh. — Grh. Grt. Sb. 5. 8. 9.
villosus F. — Sb. 5.
nucum L. — Grh. Rb. 5.—8.
glandium Mrsh. — Grh. Sb. 6.—9.
cerasorum Hbst. — Hko. 9.
- Balanobius crux* F. — Grt. Boll. Nb. 4.—8.
salicivorus Payk. — Grh. Nb. 4.—9.
a. *pedemontanus* Fuchs.
pyrrhoceras Mrsh. — Grh. Sb. 5.—8.
v. *uniseriatus* Reitt.
- Anthonomus varians* Payk. — Grt. 4.—8.
a. *perforator* Hbst.
rubi Hbst. — Grh. Wt. 5.—10.
pedicularius L. — Boll. Pt. 4.—7.
v. *conspersus* Desbr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 24-27](#)