

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Schluß)

Furcipes rectirostris L. — Kb. Rb. 5.—7.

Brachonyx pineti Payk. — Grt. Sb. 4.—9.

Dorytomus longimanus Forst. — Bl. 3. 6.

 a. *macropus* Redt. — a. *meridionalis* Desbr.

tremulae Payk. — Grh. Nb. 5.—7.

tortrix L. — Grh. Nb. 5. 6.

flavipes Panz.

Schönherrii Faust. — Nb. 7.

Dejeani Faust. — Gr. 5. 6.

taeniatus G. — Grh. 5.—6.

melanophthalmus Payk. — Grh. Grt. 5.—10.

 a. *clitellarius* Boh.

rufulus Bédel. — Grh. Nb. 5.—9.

affinis Payk. — Ost. Nb. Stb. 4.—8. 12.

Noṭaris acridulus L. — Gb. 5. 6.

 v. *montanus* Tourn.

scirpi F. — Et. 5. 6.

Grypidius equiseti F. — Grt. 3. 6.

Erirrhinus Nereis Payk. — Grt. Et. 6.—8.

Elleschus bipunctatus L. — Nb. 5.

Tychius 5-punctatus L. — Hb. 7.

 a. *connexus* Reitt.

meliloti Steph. — Boll. 5. 6.

tomentosus Hbst. — Grh. Boll. 5. 6.

pumilus Bris. — Gt. 6.

venustus F.

Miccotrogus picrostris F. — Grh. Sb. 6. 7.

Rhynchaenus quercus L. — Grh. Sb. 6. 7.

 a. *depressus* Mrsh.

rufus Schrnk. — Rb. 5.—9.

 a. *haematinus* Grm.

avellanae Donov. — Grh. 6.

rusci Hbst. — Grt. Sb. 4.—6.

pratensis Grm.

fagi L. — Gr. 3.—6. 9.—10.

salicis L. — Grh. Nb. 5.—9.

stigma Germ. — Grh. 5.—8.

- Rhynchaenus populi* F. — Sb. O. 5.—8.
Rhamphus pulicarius Hbst. — Grh. Nb. Gt. 5.—8.
Gymnetron labile Hbst. — Sb. 5.—8.
 antirrhini Payk. — Grh. Boll. Sb. 5.—8.
Miarus campanulae L. — Boll. Sb.ePt. 6.—9.
Cionus tuberculosus Scop. — Grh. Grt. 5.—9.
 scrophulariae L. — Grh. Nb. 5.—8.
 hortulanus Geoffr. — Grh. Nb. 5.—7.
 thapsi Gyll. — Grh. Nb. 6.—9.
 alauda Hbst. — Nb. 5.—6.
Stereonychus fraxini Deg. — Grh. Grt. Boll. 5.—7.
 a. *flavoguttatus* Strl.
Oxystoma ochropus Germ. — Grh. Grt. Bl. 4.—9.
 pomonae F. — Nb. Bl. 4.—9.
 craccae L. — Grh. Boll. 4.—9.
 cerdo Gerst. — Boll. 4. 5.
 opeticum Bach. — Grt. Rb. 5.—8.
 subulatum Kirby. — Gr. Nb. Bl. 3.—8.
Apion sulcifrons Hbst. — Sb. 7.
 carduorum Kirby. — Grh. Boll. Sb. 6.—9.
 onopordi Kirby. — Grh. Sb. 5.—9.
 penetrans Germ. — Bl. 7.
 fuscirostre F. — Sb. 6. 10.
 compactum Desbr. — Taubenstieg 8.
 Hookeri Kirby. — Grh. Boll. 4.—12.
 pallipes Kirby. — Grh. (*Mercur. perennis*) 4.—9.
 pubescens Kirby — Hko. Rk. 8. 9.
 vicinum Kirby — Grh. 9.
 seniculus Kirby — Grt. Boll. Sb. 4.—9.
 rubens Steph. — Boll. Sb. Gt. 7.—9.
 miniatum Germ. — Boll. Nb. 7.—9.
 frumentarium Payk. — Boll. 7.—9.
 v. *cruentatum* Walton.
 nigritarse Kirby. — Überall. 8.—12.
 flavipes Payk. — Hko. Nb. Sb. 3.—12.
 dissimile Germ. — Grh. 6.
 apricans Hbst. — Stb. Boll. 3.—9.
 aestivum Germ. — Sb. Bl. Boll. 3.—9.
 v. *ruficrus* Germ.
 assimile Kirby — Sb. Bl. 3.—9.
 varipes Germ. — Sb. 7.

- Apion curtirostre* Germ. — Hb. Boll. 3.—9.
brevirostre Hbst. — Grh. Boll. 7.—9. (*Hyperic.*)
affine Kirby. — Hko. Rk. Sb. 6. 7.
marchicum Hbst. — Bl. 8.
violaceum Kirby. — Grh. Boll. 3.—9.
 a. *virescens* Schills.
striatum Kirby
columbinum Germ. — Grh. Bl. Nb. 3. 4. 8. 9.
Spencei Kirby. — Boll. Sb. 5.—9.
 a. *nigrum* Gerh.
meliloti Kirby. — Sb. 6.
reflexum Gyll. — Grh. Boll. Sb. 1.—9.
virens Hbst. — Grh. Boll. Sb. 5.—9.
 a. *coeleste* Schils.
Gyllenhali Kirby. — Boll. Sb. 6.—8.
ononis Kirby. — Boll. Rk. Sb. 6.—9.
platalea Germ. — Grh. Sb. Bl. 6.—9.
intermedium Epph.
tenue Kirby — Grh. Boll. 6.—9.
minimum Hbst. — Boll. Nb. 5.—9.
loti Kirby. — Grh. 6.—8.
viciae Payk. — Grh. Boll. Nb. 4.—9.
pavidum Germ. — Boll. Nb. 2.—9.
simile Kirby.
ervi Kirby. — Grh. 5.—9.
melancholicum Wenck. — Grh. Sb. 6.
vorax Hbst. — Grh. Grt. Pt. 3.—9. (Hasel)
pisi F. — Grh. Boll. Sb. 3. 6.—9.
aestimatum Fst. — Sb. 5.—7.
aethiops Hbst. — Gt. 7.
 a. *obscurum* Gabr.
elegantulum Germ. — Boll. Sb. 5.—9.
astragali Payk. — Grh. 8. 9.
alcyoneum Germ. — Grh. 8.
Rhinomacer attelaboides F. — Grh. 6.
Deporaus tristis F. — Grh. Grt. 5. 6.
betulae L. — Grh. 4.—7.
Mannerheimi Hummel. — Grh. 7. 8.
Rhinchites nanus Payk. — Grh. 6. 7.
tomentosus Gyll. — Grh. Rb. 5.—8.
olivaceus Gyll. — Nb. 5. 6.

- Rhinchites cavifrons* Gyll. — Grh. 5. 6.
sericeus Hbst. — Grh. 6. 7.
germanicus Hbst. — Grh. Nb. Sb. 4.—8.
aeneovirens Mrsh. — Grh. 4.—6.
aequatus L. — Grh. Sb. 5. 6.
 a. *Paykulli* Schils.
cupreus L. — Grh. Bl. 3.—8.
Byctiscus betulae L. — Grh. Grt. 6. 7.
 a. *violaceus* Scop. — a. *cuprinus* Schils.
populi L. — Grh. 5.—8.
 a. *tataricus* Fst. — a. *cuprifer* Schils.
Attelabus nitens Scop. — Grh. 5.—8.
 a. *pulvinicollis* Jekel. — a. *suturalis* W. Jac.
Apoderus coryli L. — Grh. Bl. 5.—8.
 a. *denigratus* Gmel. — a. *collaris* Scop.

76. Fam. Ipidae.

Scolytus mali Bechst., a. *strigilatus* Reitt. — Kb. 5.
carpini Ratzeb.

Leperisinus fraxini Pnz. — Grh. 5. 6. 9. (Im Haus)

Dendroctonus micans Kugel.

Blastophagus piniperda L. — Grh. 7. 8.
 minor Hartig. — Sb. 7.

Hylurgops palliatus Gyll. — Grh. Nb. Rb. 4. 5.

Hylastes ater Payk.

brunneus Er. — Rb. 6.
cunicularius Er. — Grh. 5. 6.
angustatus Hbst. — 6.

Cryphalus abietis Ratzeb. — Grt. Boll. 3. 6.

Xyloteras lineatus Oliv. — Nb. Gt. 2.—4. 8.—9.

Dryoecotes autographus Ratzeb. — Gt. 4.—9.

Lymantor coryli Perris. — Gt. 7.

Pityogenes chalcographus L. — Grh. Grt. Gt. 3. 5.—7.
 bedentatus Hbst.

Ips typographus L. — Gt. 5. 7. (tot)
suturalis Gyll. — Rb. 5.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 49-52](#)