

Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes.

Von Jan Roubal.

(Fortsetzung)

Danacaea serbica, Ger., *marginata* f. *graeca*, Kn., *iners*, Sli., *nigritarsis*, Sli. — *Enoplium serraricorne*, Var. — *Hypocopus lathridioides*, aus E. R. Transcasp. bekannt, S.: Vitoša, VII. 08. — *Loberogasmus fasciatus*, Ger., *Cryptophagus scutellaris*, Sli., häufig. — *Merophysia oblonga*, Bur. — *Sphaerosoma globosum*, Ri., Čam., *carpathicum*, Čam., von hier zitiert Apfelbeck, Ann. Mus. Nat. Hung., XIV (1916), p. 487; S. Sturanyi und S. *carpathicum* nur von Sli.; S. *Reitteri*, Ger. — *Coccinella divaricata* et f., Ri. — *Ptinus nitidus*, Sejmen (Marica), neu für Balc. — *Mycterus articulatus*, Sli., 27. IV. 08, neu für die Balkanhalbinsel, da bis jetzt nur aus Ca., Arm. bekannt. — *Scraptia bifoveolata*, Sli.; die von hier als *forticornis* Roub. beschriebene soll nach Winkl. Cat. Col. Roubali Winkl., n. nov. heißen. — *Mecynotarsus Fausti*, Sl., Tundže, VI. 08, *Anthicus Debroschersi*, Burg., *antherinus* v. *sophiae*, Straldčan, *nectarinus* v. *Reveli*, Sli.

Jugoslavja: Ochrid.

Leg. Dr. C. Purkyně jun.-Prag, VI. 1930.

Helophorus aquaticus, in Menge. — *Ceuthophyes Karamani* (determiniert erhalten). *Catops fuscus*, 1 Ex. — *Trichodes 4-guttatus*. — *Cryptophagus scutellaris*. — *Lagria hirta*. — *Akis opaca*, häufig. *Dendarus messenicus*. *Pedinus helopoides*. *Crypticus quisquilius*. *Helops dermestoides*. — *Haplidia transversa*. — *Galleruca tanaceti*. *Euluperus xanthopus*. *Hypocassida ferruginea*.

Jugoslavja: Macedonia: Jablanica.

Leg. Dr. C. Purkyně jun. et Doc. Dr. Jaroslav Štorkán-Prag, VI. 1930.

Nebria Kratteri. *Bembidion dalmatinum*. — *Quedius lateralis*. — *Trichodes favarius* v. *senilis*, nicht selten. — *Endomychus coccinneus* (Rujana). — *Cteniopus neapolitanus* v. *triformis*, bis jetzt nur aus Italien bekannt, 1 Ex.

Jugoslavja: Kajmakčalan an der macedonisch-albanischen Grenze.

Leg. Dr. Cyril Purkyne.

Megasternum boletophagum, häufig. — *Nargus Wilkini*, viele Ex., von denen einige längere, mit dem letzten Glied die Halschildbasis übertroffene Fühler, feiner und etwas sparsamer punk-

tierten Halsschild haben. — *Amphicyllis globus*, auch sehr robuste Ex. *Agathidium dentatum*, *rotundatum*. — *Phyllodrepa floralis*. *Proteinus macropterus*. — *Simplocaria carpathica*, sehr zahlreich. — *Meligethes viridescens*, *atratus* Ol. — *Rhizophagus dispar*, zahlreich. — *Lathridius angusticollis*. — *Sphaerosoma Sturanyi*, 2 Ex., nach Winklers Cat. Col. I. c. nur Bos. Bulg. — *Cis boleti*.

Hypophloeus unicolor Piller v. **Purkyněi** n. Durchschnittlich kleiner als *H. unicolor* Pill., hellgelb, mit einer entschieden anderen Flügeldeckenpunktierung: letztere ist so gestaltet, daß die Punkte der Reihen und jene der Interstitien gleich stark oder kaum verschieden und ziemlich gröber sind, die Räume zwischen den Punktreihen sind schmaler als diese Punktreihen, auch sind sie im Grunde mikroskopisch chagriniert und daher weniger glänzend. Die Punktreihen an der Spitze der Decken weniger verworren. Das Pygidium ist feiner und nicht so dicht wie bei *f. nom.* punktiert. Einige Ex. — *Mniophila muscorum* v. *seriatopunctata*. — *Otiorrhynchus* (unsystematisch angeführt), *lavandus*, *sorbivorus*, *plagiator*, *Krüperi*, *pierinus* (alle det. Purkyne). *Ceuthorrhynchus contractus*.

Jugoslavija: Slavonia: Mitrovica.

Leg. Čerych, 1908.

Alles aus einem exploatierten Quercetum und aus seiner Umgebung. *Carabus Ulrichi* v. *papukensis*; selbstredend eine selbständige, von der *v. parvus* Géh. gut trennbare Varietät, die als solche lange anerkannt wurde, die von den größten Autoritäten, wie Sokolář und Born (der letztere z. B. sagt, Entom. Rundsch., XXVI (1909), p. 46: „*Papukensis* ist, wie Sokolář richtig bemerkt, gute geographische Rasse, die fast ganz Slavonien . . . bewohnt. Ich habe ebenfalls reiches Material davon.“) ohne weiteres als solche bestätigt ist etc., dagegen figuriert *papukensis* in Junk-Schenkling, Col. Cat., Csiki, pars 91 (1927), p. 220 als Synonym von *v. parvus* Géh. *Calosoma sycophanta*. *Bembidion minimum*. *Chlaenius Dejeani*; *spoliatus*, sehr häufig. *Harpalus hospes*, *aeneus*, *distinguendus*, *cupreus*; *Roubali* Schaub. v. *pseudodimidiatus* Schaub., *Cotypen*, *anxius*. *Stenolophus teutonius*, *discophorus*, *f. flaviuscula*. *Acupalpus meridianus*, *luteatus*, *exiguus*. *Zabrus tenebrioides*. *Stomis pumicatus*. *Pterostichus cupreus*, *f. affinis*, *striatopunctatus*, *vernalis* v. *cursor*, *interstinctus*, *cylindricus*, *melas*, dieser sehr zahlreich. *Agonum viridicupreum*, blos in der *f. austriaca*, häufig, *viduum*, *moestum*. *Platynus assimilis*. *Europhilus micans*.

(Fortsetzung folgt)