

Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes.

Von Jan Roubal.

(Fortsetzung)

Cybister lateralimarginalis. — Hydrobius fuscipes. Hydrous piceus. Berosus signaticollis. — Ablattaria laevigata. — Scaphosoma boleti. — Hister quadrinotatus, corvinus. — Dasytes coeruleus, plumbeus. — Pseudoclerops mutillarius. Trichodes apiarius. — Drasterius bimaculatus. Elater sanguineus, elongatus, praeustus, f. semirubra. Corymbites impressus, bipustulatus. Agriotes brevis. — Lampra rutilans. Anthaxia manca. Agrilus biguttatus, f. aenesens, derasofasciatus. — Dermestes laniarius, Attagenus piceus v. dalmatinus. — Byrrhus pilula. — Byturus tomentosus. — Meligethes aeneus. — Coccinella quinquepunctata, f. Rossii. — Bostrychus capucinus. — Oedemera virescens. — Pyrochroa serraticornis. — Melandrya caraboides. — Mycetochara humeralis. Omophlus Proteus. — Opatrum sabulosum. Diaperis boleti, f. fungi. Hypophloeus unicolor. Helops coeruleus. Cylindronotus aeneus. — Caccobius Schreberi. Onthophagus taurus, v. recticornis, ruficapillus, vitulus, vacca, f. media. Aphodius varians. Maladera holosericea. Pentodon idiota. Valgus hemipterus. Gnorimus octopunctatus. Trichius sexualis. Oxythyrea funesta. Cetonia aurata, f. purpurata, f. tunicata. — Lucanus cervus. — Cerambyx cerdo, Scopoli. Rhagium sycophanta, mordax. Cortodera humeralis. Leioderus Kollari, 1 Ex. Phymatodes testaceus f. praeusta, f. variabilis, f. combinata n. n., die Beschreibung in Entom. Nachrichtbl. 1931. Pyrrhidium sanguineum. Clytus tropicus, nur 1 Ex. Plagionotus detritus, arcuatus. Dorcadion fulvum, Scopoli. Neodorcadion bilineatum. Morimus funereus. Oberea oculata. Phytoecia caerulea. — Donacia semicuprea. Orsodacne lineola. Lema melanopus. Crioceris quinquepunctata. Lilioceris merdigera. Labidostomis longimana. Cryptocephalus coryli, einige Weibchen mit feiner punktiertem Elytren, als bei den mitteleuropäischen Stücken, f. temesiensis. Eupales ulema, Adoxus obscurus. Chrysomela sanguinolenta. Gastroidea polygoni. Prasocuris phellandrii. Melasoma saliceti. Phytodecta fornicatus. Entomoscelis adonidis. Phyllostreta nigripes. Epithrix pubescens. Podagrica Menetriesi (Heikertinger det.). Cassida murraea. — Tanymericus palliatus. Cleonus piger. Sphenophorus parumpunctatus.

Jugoslavija: Šar planina-Crni Kamen.

Leg. Doc. Dr. Jaroslav Štorkán-Prag, VI. 1930.

Pterostichus Brucki. Othius punctulatus. Mycetoporus angularis.

Leptusa Reitteri, gemein. *Ocalea puncticeps*. — *Orchestes fagi*, sehr kleine Ex. — *Xyleborinus Saxessini*.

Jugoslavja-Perister.

Leg. Dr. Cyril Purkyně jun.-Prag, IX. 1926 und VI. 1930.

Einige Arten gesammelt von Doc. Dr. Jaroslav Štorkán, wie dies speziell bei betreffenden Formen durch die Abkürzung Štork. angegeben wird.

Cychrus balcanicus, *attenuatus* s. *peristericus* Roub., Čas. Čsl. Spol. Ent. (Ac. Soc. Ent. Čechosl.) XXVII (1930), p. 75 (Štork.). *Carabus violaceus* s. *řilvensis* (Štork.). *Nebria aetolica* s. *peristerica*. — *Ochthebius impressus*. *Hydraena morio*, 1 ♀. *Helophorus nubilus* s. *meridionalis*, viele Ex., alle mit ziemlich stark glänzenden Rippen der Elytren, *aquaticus*, *brevipalpis* s. *montenegrinus*, *granularis*. *Megasternum boletophilum*. *Anacaena globulus*. *Chaetarthria seminulum*. — *Anemadus Karamani*, 2 Ex. *Nargus velox*, ziemlich variabel, mehrere Ex., Wilkini. *Catops grandicollis*. — *Agaricophagus cephalotes*. *Amphicyllis globus*. *Agathidium Leonhardianum*. — *Mycetoporus punctus*. *Leptusa salonichia* Bernh. Die zwei mir vorliegenden Stücke weichen von der Beschreibung ab: die vorletzten Fühlerglieder sind nicht besonders schmaler als bei der *L. eximia*, mit der *salonichica* verglichen wurde, die Hinterwinkel des Halsschildes sind nicht besonders spitz, die Decken sind ziemlich stark körnelig, das Abdomen ist auffallend stark zerstreut punktiert; anders stimmen meine zwei Ex. mit der Beschreibung überein. — *Atheta fungi*. *Oxypoda amoena*. *Aleochara bilineata*. — *Hister corvinus*. — *Throscus carinifrons*, *obtusus*. — *Dryops Ernesti*. — *Anthrenus museorum*. — *Simplocaria carpathica*, zahlreich. Nach Winkler, Cat. Col., l. c. aus Balkan nur von Cro. mitgeteilt, die peristerischen Ex. haben nichts Gemeinschaftliches mit der *S. montenegrina*, von der ich Type besitze. — *Meligethes viridescens*, mit schwach chagriniertem Halsschild. — *Atomaria fuscicollis*. — *Enicmus histrio*, nach Winklers Cat. Col., l. c. nur aus Br., ich kann noch zugeben: Ga. G. Slovak. *Cartodere elongata*. *Corticaria olympica*. *Corticarina truncatella*. — *Typhaea stercorea*. — *Corticus diabolicus*. *Cerylon fagi*. — *Sphaerosoma merditana*, mehrere Ex., shardaghense, Sturanyi, dieses bis jetzt nur aus Bos. Bulg., nicht selten; *dispersepunctatum* sp. n.; sie wird an einer anderen Stelle publiziert; *Reitteri*, nicht in der *v. albanicum*, die von Perister, Ann. Mus. Nat. Hung. XIV (1916), p. 493 zitiert wird und die ich z. B. auch von Miloti (Albania) habe.

(Fortsetzung folgt.)