

Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes.

Von Jan Roubal.

(Fortsetzung)

Cybister lateralimarginalis. — *Hydrobius fuscipes.* *Hydrous piceus.* *Berosus signaticollis.* — *Ablattaria laevigata.* — *Scaphosoma boleti.* — *Hister quadrinotatus, corvinus.* — *Dasytes coeruleus, plumbeus.* — *Pseudoclerops mutillarius.* *Trichodes apiarius.* — *Drasterius bimaculatus.* *Elater sanguineus, elongatus, praeustus, f. semirubra.* *Corymbites impressus, bipustulatus.* *Agriotes brevis.* — *Lampra rutilans.* *Anthaxia manca.* *Agrilus biguttatus, f. aenescens, derasofasciatus.* — *Dermestes laniarius, Attagenus piceus v. dalmatinus.* — *Byrrhus pilula.* — *Byturus tomentosus.* — *Meligethes aeneus.* — *Coccinella quinquepunctata, f. Rossii.* — *Bostrychus capucinus.* — *Oedemera virescens.* — *Pyrochroa serraticornis.* — *Melandrya caraboides.* — *Mycetochara humeralis.* *Omophlus Proteus.* — *Opatrium sabulosum.* *Diaperis boleti, f. fungi.* *Hypophloeus unicolor.* *Helops coeruleus.* *Cylindronotus aerieus.* — *Caccobius Schreberi.* *Onthophagus taurus, v. recticornis, ruficapillus, vitulus, vacca, f. media.* *Aphodius varians.* *Maladera holosericea.* *Pentodon idiota.* *Valgus hemipterus.* *Gnorimus octopunctatus.* *Trichius sexualis.* *Oxythyrea funesta.* *Cetonia aurata, f. purpurata, f. tunicata.* — *Lucanus cervus.* — *Cerambyx cerdo,* *Scopolii.* *Rhagium sycophanta, mordax.* *Cortodera humeralis.* *Leioderus Kollari, 1 Ex.* *Phymatodes testaceus f. praeusta, f. variabilis, f. combinata m. n., die Beschreibung in Entom. Nachrichtbl. 1931.* *Pyrrhidium sanguineum.* *Clytus tropicus, nur 1 Ex.* *Plagionotus detritus, arcuatus.* *Dorcadion fulvum,* *Scopolii.* *Neodorcadion bilineatum.* *Morimus funereus.* *Oberea oculata.* *Phytoecia caerulea.* — *Donacia semicuprea.* *Orsodacne lineola.* *Lema melanopus.* *Crioceris quinquepunctata.* *Lilioceris merdigera.* *Labidostomis longimana.* *Cryptocephalus coryli,* einige Weibchen mit feiner punktierten Elytren, als bei den mitteleuropäischen Stücken, f. temesiensis. *Eupales ulema,* *Adoxus obscurus.* *Chrysomela sanguinolenta.* *Gastroidea polygoni.* *Prasocuris phellandrii.* *Melasoma saliceti.* *Phytodecta fornicatus.* *Entomoscelis adonidis.* *Phyllotreta nigripes.* *Epithrix pubescens.* *Podagrion Menetriesi* (Heikertinger det.). *Cassida murraea.* — *Tanymecus palliatus.* *Cleonus piger.* *Sphenophorus parumpunctatus.*

Jugoslavja: Šar planina-Crni Kamen.

Leg. Doc. Dr. Jaroslav Štokrán-Prag, VI. 1930.

Pterostichus Brucki. Othius punctulatus. Mycetoporus angularis.

Leptusa Reitteri, gemein. *Ocalea puncticeps*. — *Orchestes fagi*, sehr kleine Ex. — *Xyleborinus Saxessini*.

Jugoslavja-Perister.

Leg. Dr. Cyril Purkyně jun.-Prag, IX. 1926 und VI. 1930.

Einige Arten gesammelt von Doc. Dr. Jaroslav Štorkán, wie dies speziell bei betreffenden Formen durch die Abkürzung Štork. angegeben wird.

Cyphrus balcanicus, attenuatus s. *peristericus* Roub., Čas. Čsl. Spol. Ent. (Ac. Soc. Ent. Čechosl.) XXVII (1930), p. 75 (Štork.). *Carabus violaceus* s. *rîvensis* (Štork.). *Nebria aetolica* s. *peristerica*. — *Ochthebius impressus*. *Hydraena morio*, 1 ♀. *Helophorus nubilus* s. *meridionalis*, viele Ex., alle mit ziemlich stark glänzenden Rippen der Elytren, *aquaticus*, *brevipalpis* s. *montenegrinus*, granularis. *Megasternum boletophilum*. *Anacaena globulus*. *Chaetarthria seminulum*. — *Anemadus Karamani*, 2 Ex. *Nargus velox*, ziemlich variabel, mehrere Ex., Wilkini. *Catops grandicollis*. — *Agaricophagus cephalotes*. *Amphicyllis globus*. *Agathidium Leonhardianum*. — *Mycetoporus punctus*. *Leptusa salonichia* Bernh. Die zwei mir vorliegenden Stücke weichen von der Beschreibung ab: die vorletzten Fühlerglieder sind nicht besonders schmäler als bei der *L. eximia*, mit der *salonichica* verglichen wurde, die Hinterwinkel des Halsschildes sind nicht besonders spitz, die Decken sind ziemlich stark körnelig, das Abdomen ist auffallend stark zerstreut punktiert; anders stimmen meine zwei Ex. mit der Beschreibung überein. — *Atheta fungi*. *Oxypoda amoena*. *Aleochara bilineata*. — *Hister corvinus*. — *Throscus carinifrons*, obtusus. — *Dryops Ernesti*. — *Anthrenus museorum*. — *Simplocaria carpathica*, zahlreich. Nach Winkler, Cat. Col., l. c. aus Balkan nur von Cro. mitgeteilt, die peristerischen Ex. haben nichts Gemeinschaftliches mit der *S. montenegrina*, von der ich Type besitze. — *Meligethes viridescens*, mit schwach chagriniertem Halsschild. — *Atomaria fuscicollis*. — *Enicmus histrio*, nach Winklers Cat. Col., l. c. nur aus Br., ich kann noch zugeben: Ga. G. Slovak. *Cartodere elongata*. *Corticaria olympica*. *Corticarina truncatella*. — *Typhaea stercorea*. — *Corticus diabolicus*. *Cerylon fagi*. — *Sphaerosoma merditana*, mehrere Ex., shardaghense, Sturanyi, dieses bis jetzt nur aus Bos. Bulg., nicht selten; *dispersepunctatum* sp. n.; sie wird an einer anderen Stelle publiziert; Reitteri, nicht in der *v. albanicum*, die von Perister, Ann. Mus. Nat. Hung. XIV (1916), p. 493 zitiert wird und die ich z. B. auch von Miloti (Albania) habe.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes. 144-145](#)