

## Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone [Faunula Illiyo- Adriatica].

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

### 4. Abschnitt.

*Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.*

(Fortsetzung)

1303. *nudella* O. Von Stdr. nirgends beobachtet. Carrara meldet einen leeren Sack im September von Opcina, bedarf der Bestätigung. Von Süddalmatien (Ragusa) von Mann (3 R. Dalm. zool. bot. 1869) aufgeführt. Ob nicht Verwechslung mit *sappho*?

1304. *Epichnopteryx pulla* Esp. Wippach 26. IV. (Hafn. F. Kr.), Salcanoabhänge an Grashalmen 2 ♂♂ 31. III. (Hafn. F. G.); Wiesen bei Padrich 21. III. gemein, im Sonnenschein am Boden fliegend (Stdr.); Dragatal in Südistrien, [Cul di Leme 1 ♂ 19. III. (Stdr.); Volosca 26. III. sehr zahlreich an feuchten Stellen am Wege (Rbl. M. M.); Fiume (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.). Inseln: Grado 20. IV. (Galv.); Brioni Mitte April (Rbl.). Herzegowina: Jablanica, sehr große Stücke, einige aus Bosnien, kleiner, weniger dicht und bräunlich beschuppt, gehören zu *sieboldi* Reutti (Rbl. Stud. II).

Sonst noch Kroatien, Slavonien, Bosnien, Ungarn; sibirisch.

### Psychidea Rbr.

1305. *bombycella* Schiff. Wocheiner Feistritz, Mojstrana Ende Juni, Wippach Mai, Juni, Vratatal Juli (Hafn. F. Kr.); Umgebung Görz Ende April bis Ende Juni überall in Hecken, jedoch nicht häufig (Hafn. F. G.); Trentagebiet 2 ♂♂ 16. VI.; Salzsümpfe bei Noghera Mai, abends vor und knapp nach Sonnenuntergang, sehr gemein (Stdr.); Abbazia, Mattuglie, alle zur zeichnungsloseren f. *rotundella* Brd. gehörig (Rbl. M. M. I); Mitteldalmatien (Mn.); Cetina-Sümpfe bei Sinj zwei Männchen 18. VI. (Stdr.).

Herzegowina: Mai und Juli (Schaw. B. H. III); Plaša, noch in 1700 m mehrfach 5. VII. (Rbl. Stud. II), letztere sind klein und schwächer gezeichnet, *rotundella* (Rbl.).

Auch Kroatien, Slavonien, Bosnien; orientalisches.

1306. *pectinella* F. B. Rbl. IX: Dalmatien im Mai. Triest, Verz. F. A. Vogel (Carr.) bedarf der Bestätigung (Str.); Mitteldalmatien, *perlucidella* Brd. Lesina (Mn. 3 R. Dalm.); Prenj 1750 m 18. VII, (Rbl. Stud. II).

Auch Fiume, Siebenbürgen; orientalisches.

1307. *raiblensis* Mn. aus dem sehr nahen Raibl in Kärnten dürfte von Flitsch noch gemeldet werden. Sonst noch vom Triglav, 2400 m, Säcke an Steinen (zool. bot. 1913, pp. 14/7).

### Fumea Stph.

1308. *casta* Pall. (= *intermediella* Brd.) Überall in Krain (Hafn.), Görz, Triest, auch sonst im Gebiet, Falter im Mai, Juni, Säcke allenthalben gemein (Str.); Triest gemein (Carr.); Abbazia Säcke sehr häufig (Rbl. M. M. I); Wippach Mai (Mn.); Görz Säcke an Steinen, Mauern, Pfählen, Falter im Juni (Hafn. F. G.).

Auch Kroatien, Slavonien, Alpen; mediterranes.

1309. *reticulatella* Brd. B. Rbl. IX: Dalmatien, Südherzegowina Juni. Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Kučiste Säcke im April, Falter Ende Mai bis Ende Juni nicht häufig (Werner); Stolac 31. V. (Rbl. Stud. II). Insel Lagosta Männchen abends in den Macchien sehr häufig fliegend (Galv. Dalm. Ins.).

Auch von Sarepta, Brussa; orientalisches.

1310. *cornitella* Brd. Nur aus der Herzegowina, vom Prenj 1300 m, Vucijabara, Orjengebiet (Rbl. Stud. II).

Diese wenig bekannte Art noch von der Bukovina und ? Armenien; Herkunft ?

1311. *crassiorella* Brd. Mojstrana 26. VII., Wippach 25. VI. (Hafn. F. Kr.); Görz Säcke an Mauern, Steinen nicht selten, einige Männchen Juni e. I. (coll. Wagner); Triest ein Weibchen e. I. 28. V. und ein Männchen 30. V. (Naufock); Mitteldalmatien, Kučiste, Säcke April an Mauern, Falter e. I. Anfang Mai bis in den Juli (Werner); Herzegowina: Bišina, Mitte Juli, Mostar Mitte Juni Orjengipfel (Schaw. B. H. III, VII, IX); Lakat, Bilek (Rbl. Stud. II). Inselfund: Brioni, Säcke im September (Rbl.); Lissa, Umgebung Comisa (Galv. Dalm. Ins.).

Sonst auch Ungarn, Albanien (Rbl.), Südeuropa und südliches Mitteleuropa; mediterranes.

*betulina* Z. Wippach 1. VI. aus Epheu gescheucht (Hafn. F. Kr.). Sonst nördlich davon; sibirisches.\*)

\*) *Bacotia sepium* Spr. führt F. A. Vogels Verz. (Carr.) an. Diese Angabe fand bis jetzt keine Bestätigung (Str.).

**Sesiidae.****Trochilium Sc.**

1311. *apiforme* Cl. Kronberg 14. VI., Stadt Görz 19. VI. (Hafn. F. G.); Wippach an Weidenstämmen (Mn. Kstld.); Triest nicht häufig Juni in Ruhestellung an Pappelstämmen gefunden (Carr.); Fiume Mai an Pappelstämmen (Mn.). Aus Dalmatien nicht bekannt, wohl aber aus der Herzegowina: Lakat 23. VII., Trebinje, Gacko (Rbl. Stud. II).

Auch Kroatien, Slavonien, Bosnien, Albanien, Serbien; sibirisch.

1313. *tabaniforme* Rott. Wippach Juni auf Ligusterblüten (Mn. Kstld.); Mitteldalmatien: Kučiste Anfang Juni ein Stück an Brombeerblüten (Werner); Vucija bara 9. VII. (Schaw.); f. *rhingiaeforme* Hb. auch von Görz Mai (Schreiber, Museum Wien); Sesana (Winkler).

Auch Kroatien, Slavonien, Bosnien; sibirisch.

**Sesia F. \*)**

Von diesem Genus werden aus dem Gebiete später wohl noch weitere Arten gemeldet werden.

1314. *cephiformis* O. Crna Prst 7. VIII. (Hafn. F. Kr.); Triest, Verz. F. A. Vogel (Carr.); letztere Angabe bedarf der Bestätigung.

1315. *tipuliformis* Cl. Görz 20. IX. ein sehr großes Weibchen (Hafn. F. G.); Triest (Graeffe); Jablanica, Doljankasattel, Ubli (Rbl. Stud. II); Herzegowina Ende Juni (Schaw. B. H. III); auch Umgebung Spalato (Mn.).

Sonst noch Kroatien, Slavonien, Bosnien, Ungarn; orientalisches.

1316. *conopiformis* Esp. Mitteldalmatien (Mn.); Herzegowina: Bišina (Schaw. B. H. V).

Auch Tirol, Italien, Ungarn, Albanien; sibirisch.

1317. *vespiformis* L. (= *asiliformis* Rott.). Triest nicht selten Juli auf Wiesenblumen (Carr.); Opcina zwei Männchen 16. VII., Pinguente ein Weibchen 14. VII., Cul di Leme zwei Stück 20. VII. (Std.); Fiume an Pappeln (Me.); f. *melliniformis* Lasp. aus Pola 31. VIII. (Wagner); Nennform Insel Brioni ♂♀ Juni (Rbl. Br. gr.); Mitteldalmatien (Mn.); Herzegowina: Prenjgebiet 1 ♂ 1050 Meter 30. VII. (Rbl. Stud. II).

Sonst noch Kroatien, Slavonien, Serbien, Banat; orientalisches.

(Fortsetzung folgt)

\*) *S. spheciformis* Gern. aus Jablanica (Rbl. Stud. II) und Radmannsdorf in Krain, 12. VI. (Hafn. F. Kr.).

*S. mesiaeformis* H. S. Herzegowina (Rbl. Stud. II).

*S. andrenaeformis* Lasp. von Igman in Bosnien (Rbl. Stud. II).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \[Faunula Illyro-Adriatica\]. 150-152](#)