

Beitrag zur Kenntnis der Großschmetterlingsfauna von Frankfurt a. M.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Schluß)

- 243 c. *Lygris reticulata* F. B. fand eine Raupe bei Schwanheim im Herbst 1930 an *Impatiens noli tangere* L.
244. *L. populata* L. Die Heidelbeere tritt dort, wo sie wächst, stets in ausgedehnten Beständen auf. Meine Bemerkung, daß die Heidelbeere in der Mainebene „nur ziemlich vereinzelt wächst“, bedeutet deshalb auch nur, daß die Zahl ihrer Standorte relativ gering ist, nicht, daß ihre Individuenzahl besonders klein sei. Das Vorkommen von *L. populata* L. in der Mainebene habe ich nie in Frage gestellt.
- 253 a. *Larentia spadicearia* Bkh. Pk. fing am 10. 8. 31 einen Falter bei Louisa.
254. *L. pomoriaria* Ev. B. fand im Herbst 1930 die Raupen bei Schwanheim.
- 254 a. *L. vittata* Bkh. B. fand im März 1930 die Raupe im Grafenbruch.
- 255 a. *L. sociata* Bkh. B. beobachtete den Falter am 16. 5. 30 bei Mitteldick. Am 30. 7. 31 ein Falter an der Zimmerlampe in Frankfurt gefangen (L.). — Keine Seltenheit, Stadtwald, Enkheimer Wald (Hepp); auch bei Heusenstamm.
264. *L. capitata* H. S. B. fand die Raupe im Herbst 1930 bei Schwanheim an *Impatiens noli tangere* L.
- 280 a. *Tephroclystia succenturiata* L. Pk. fing einen Falter am 29. 7. 31 an der Tempelseemühle (Offenbach).
- 280 b. *T. scabiosata* Bkh. A. fand am 17. 8. 30 die Raupen bei Langen.
284. *Abraxas sylvata* Sc. Als Fundorte sind bisher nur bekanntgeworden: Babenhäuser Landstraße, Oberrad, Buchrainweiher, Luhrwald (Offenbach), Eppstein i. T. Mein Vermerk: „Nach Hepp weit im Gebiet verbreitet; Soden i. T.“ gilt für die folgende Art (*A. marginata* L.) und ist daher bei *A. sylvata* Sc. zu streichen.
- 284 a. *A. marginata* L. Pk. fing am 11. 8. 31 einen Falter im Schwanheimer Sand. — Im Gebiet weit verbreitet; Soden i. T. (Hepp).

- 286 a. *Stegania trimaculata* Vill. Als drittes in Frankfurt festgestelltes Stück fing L. am 30. 7. 31 im Zimmer am Licht ein ♂. Es ist wesentlich heller als der von Herrn Aue gefangene Falter (♀) und wohl der Stammform zuzurechnen. Zu den Fundortangaben des Herrn Hepp im Ent. Anz. X, 1930, Seite 317, ist nachzutragen: Nach Mitteilung der Herren Noack und Till wird *St. trimaculata* Vill. alljährlich bei Darmstadt an Pappeln in zwei Generationen, sowohl als Falter wie als Raupe gefunden.
287. *Deilinia pusaria* L. A. erzog im Frühjahr 1930 einen Falter der f. *rotundaria* Hw. aus einer bei Goldstein gefundenen Raupe.
291. *Ennomos alniaria* L. L. fand am 14. 9. 31 einen Falter in Frankfurt.
300. *Semiothisa notata* L. A. fand am 5. 7. 31 die Raupe im Schwanheimer Wald.
- 307 a. *Biston zonaria* Schiff. B. fand die Raupen im Frühsommer 1930 bei Cronberg i. T. auf Wiesen an *Genista germanica* L. — Auch bei Eschersheim/Ginnheim.
309. *B. strataria* Hufn. A. fand am 4. 6. 31 eine Raupe bei Mitteldick.
311. *Boarmia gemmaria* Brahm. Außerordentlich häufig vom 26. 7. bis 2. 9. 31 am Licht in Frankfurt (L.).
319. *Fidonia limbaria* F. Am 17. 8. 30 und 30. 8. 31 wurden die Raupen zahlreich an Besenginster bei Langen gefunden (A.).
322. *Thamnonoma wauaria* L. A. erhielt am 23. 5. 31 eine Raupe aus Frankfurt.
- 329 a. *Spilosoma mendica* Cl. B. fand im Frühjahr 1930 eine Puppe bei Neu-Isenburg und zog daraus den Falter.
332. *S. urticae* Esp. B. fand die Raupen im Herbst 1929 im Stadtwald und im Herbst 1930 im Enkheimer Wald.
334. *Parasemia plantaginis* L. Die Boldt'schen Funde aus dem Jahre 1912 sind die ersten aus neuerer Zeit bekannt gewordenen und deshalb erwähnenswert. Koch (1856) nennt Fundplätze, die heute der Ausdehnung der Großstadt zum Opfer gefallen und deshalb für die neuere Zeit bedeutungslos geworden sind.
339. *Coscinia striata* L. A. fand am 16. 5. 30 die Raupen bei Mitteldick.
341. *Cybosia mesomella* L. A. fing am 6. 6. 31 einen Falter bei Mitteldick.

343. *Gnophria rubricollis* L. Es ist nachzutragen: „— Hohemark i. T. (Till).“
- 343 a. *Oeonistis quadra* L. A. fand am 5. 7. 31 ein ♀ bei Schwanheim, L. am 30. 7. 31 ein ♀ bei Mitteldick. — Auch bei Heusenstamm.
- 343 b. *Lithosia complana* L. B. fand die Raupen am 1. 6. 30 bei Mitteldick.
344. *L. sororcula* Hufn. B. fing am 1. 6. 30 ein ♀ bei Mitteldick, A. fand ebenda die Raupen im Sommer 1931.
- 345 a. *Zygaena filipendulae* L. Ein Falter am 14. 7. 31 bei Mitteldick (A.). — Häufig, Offenbach, Sprendlingen, Dietzenbach, Isenburg, Taunus (Hepp).
347. *Ino statices* L. Mehrere Falter am 30. 7. 31 bei Mitteldick (L.).
- 352 a. *Fumea betulina* Z. Die Säcke wurden im Frühjahr (bis Juni) 1930 im Schwanheimer Wald und bei Mitteldick an Baumstämmen (Fichten z. B.) gefunden (B.).
- 352 b. *Bacotia sepium* Spr. B. fand im März 1930 die Säcke an Fichtenstämmen in der Nähe der Unterschweinstiege im Schwanheimer Wald.
- 353 a. *Sesia vespiformis* L. B. zog den Falter aus im Frühling 1930 bei Kelsterbach gefundenen Raupen.
- 354 a. *S. empiformis* Esp. A. und B. fanden am 1. 6. 30 Raupen und Puppen in *Euphorbia cyparissias* L. bei Mitteldick, am 11. 6. 30 und bis in den Juli hinein ebenda die Falter.
- 354 b. *Cossus cossus* L. A. erhielt am 17. 5. 30 eine Raupe aus Frankfurt. — Nach Hepp auch bei Mühlheim a. M.
- 354 c. *Zeuzera pyrina* L. Am 14. 6. 31 ein ♀ an der Zimmerlampe in Frankfurt (A.). — Ziemlich häufig im Stadtgebiet.

Nachtrag zum Literaturverzeichnis.

29. Hepp, A., Bemerkungen zu: Wilhelm Lommatzsch, Die Großschmetterlingsfauna um Frankfurt (Main) im Jahre 1929 (Entomolog. Anz. XI [1931], Seite 289 ff.).
30. —, Zwei bemerkenswerte Formen von *Himera (Colotis) pennaria* L., 2f. n. *nubilosa*, *nuda* (Lep. Geometridae) (Entomolog. Anz. XII [1932], Seite 12 f.).
31. *Crocallis tusciaria* Bkh. bei Frankfurt a. M. (Entomolog. Rundschau XLIX [1932], Seite 3 ff.).
32. —, Zusammenstellung der Noctuiden, Cymatophoriden und Brepheiden aus der Umgebung von Frankfurt a. M. Zuträge I. (Entomolog. Rundschau XLIX [1932], Seite 27 ff.).

Die Arbeit wurde Anfang April 1932 abgeschlossen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Lommatzsch Wilhelm

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Großschmetterlingsfauna von Frankfurt a.M. 9-11](#)