

Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes.

Von Jan Roubal.

(Fortsetzung)

Notoxus miles (Kniaževo). — *Lytta dives* (Sofia). *Zonabris humerosa* (Pirin). — *Mordella sulcicauda* f. *Ragusai* (Suflu), f. *obsoleta* (dto.), *vestita* (dto.), *Horvathi* (German, Sliven). — *Gnaptor spinimanus* (Mac.). — *Aphodius quadriguttatus* (Karabažir). *Anomala oblonga* (Čepelare). — *Cortodera flavipennis* (Išikar), f. *brachialis* (dto.). *Leptura livida* (V.). *Strangalia maculata* (dto.). *Dorcadion olympicum* (Jambol). — *Cryptocephalus aureolus* (V.), *octacosmus* (dto.), *pygmaeus* f. *amoena* (Suflu), *connexus* f. *arenaria* (dto.). *Phytodecta fornicatus* (dto.). *Cassida viridis* (dto.). — *Larinus latus* (dto.), *jaceae* (dto.). *Psallidium maxillosum* (dto.).

Nachtrag zu „Jugoslavia-Slavonia: Mitrovica“ (Entom. Anz. XII, 1932, p. 130 und 144).

Agonum Holdhausi. — *Stenus carbonarius* (Benick vid.). — *Cantharis fusca*, *livida* f. *rufipes*. — *Malachius bipustulatus*. — *Elater „elongatus“* (p. 144) soll *elongatulus* heißen. — *Asclera caerulea*. — *Menophilus cylindricus*. — *Phytoecia pustulata*. — *Mononychus punctum album*. — *Balaninus glandium*. — *Xyleborus monographus*.

Nachtrag zu „Attica“ (Entom. Anz. XI, 1931, p. 363 und 393).

Brachynus incertus. — *Clambus dubius*. — *Bledius bicornis*. *Mycetoporus bosnicus*. *Oxypoda haemorrhoea*. — *Saprinus semipunctatus*. — *Dermestes mustellinus*. *Attagenus piceus*. — *Scymnus bipunctatus* f. *nigricans*. — *Ptinus „calcifer“* soll *calcarifer* heißen; *P. Kiesenwetteri*. — *Formicomus pedestris*. — *Zonabris polymorpha* f. *Dahli*. — *Catomus angustatus*. — *Aphodius granarius*, gemein. *Diastictus tibialis*. — *Phaedon armoraciae*. — *Otiorrhynchus Carceli* (Reitt. det.). *Trachyphloeus laticollis*. *Coniocleonus nigrosuturalis*. *Bagous subruber*.

(Fortsetzung folgt)