

Beiträge zur Kenntnis der Schildläuse (Hemipt.-Homopt., Coccid.).

Von L. Lindinger, Rahlstedt.

(Fortsetzung)

1899. *Parlatoria (Websteriella) blanchardi*. Leonardi. Riv. pat. veg. 8. 204, 209.

Vorkommen: Mittelmeergebiet. Sahara. Sudan. Ital.-Somaliland. Palästina. Irak. Mesopotamien. Indien. Verschleppt nach Südwestafrika, Australien (Südaust. und Nordterritorium), Kalifornien und Arizona.

Apteronidia leucaspis Ldgr. nom. nov.

1905. *Cryptoparlatoarea leucaspis*. Lindinger, Insekten-Börse 22.132.
Vorkommen: Japan.

Apteronidia (?) lithocarpicola (Takah.) nom. nov.

1934. *Neoparlatoria lithocarpicola*. Takahashi, Dep. agr. gov. res. inst. Formosa rep. 63. 30, 35.

Vorkommen: Formosa.

Apteronidia machili (Takah.) nom. nov.

1931. *Parlatoria machili*. Takahashi, Bull. ent. res. 22. 218.
1932. *Cryptoparlatoarea machili*. Lindinger, Konowia 11. 188.

Vorkommen: Formosa.

Apteronidia machilicola (Takah.) nom. nov.

1933. *Parlatoria machilicola*. Takahashi, Dep. agr. gov. res. inst. Formosa rep. 60. 30, 52.

Vorkommen: Formosa.

Apteronidia myersi (Green) nom. nov.

1929. *Leucaspis myersi*. Green, Bull. ent. res. 19. 386.
Vorkommen: Neuseeland.

Apteronidia papillosa (Green) nom. nov.

1919. *Parlatoria (Websteriella) papillosa*. Green, Rec. Indian mus. 16. 443.

1929. *Porogynaspis papillosa*. Bellio, Boll. lab. zool. Portici 22. 224.

Vorkommen: Indien: Palghat; Malabar.

Apteronidia parallela (Green) nom. nov.

1926. *Neoleucaspis parallela*. Green, Bull. ent. res. 17. 63.

1932. *Cryptoparlatoarea parallela*. Lindinger, Konowia 11. 204.

Vorkommen: Indien: Malabar.

Apteronidia parlatoreoides Ldgr. nom. nov.

1911. *Cryptoparlatorea parlatoreoides*. Lindinger, Ztschr. wiss. Ins.-Biol. 7. 89.

Vorkommen: Indien: S. E. Wynaad.

Apteronidia rufa (Green) nom. nov.

1916. *Porogymnaspis rufa*. Green, Bull. ent. res. 7. 55.
1932. *Cryptoparlatorea rufa*. Lindinger, Konowia 11. 204.

Vorkommen: Australien, Nordterritorium.

Apteronidia senilobata (Green) nom. nov.

1929. *Leucaspis cordylinidis* var. *senilobata*. Green, Bull. ent. res. 19. 383.
1932. *Cryptoparlatorea senilobata*. Lindinger, Konowia 11. 203.

Vorkommen: Neuseeland.

Apteronidia silvestrii (Bellio) nom. nov.

1929. *Porogymnaspis silvestrii*. Bellio, Boll. lab. zool. Portici 22. 220.
1931. *Cryptoparlatorea silvestrii*. Lindinger, Ent. Rundschau 48. 43, 180.

Vorkommen: Indochina.

Apteronidia spinimarginata (Green) nom. nov.

1905. *Gymnaspis spinomarginata*. Green, Journ. Bombay nat. hist. soc. 16. 348.
1905. *Syngenaspis spinomarginata*. Green, Journ. Bombay nat. hist. soc. 16. 349.

Vorkommen: Zeilon.

Apteronidia uberifera Ldgr. nom. nov.

1911. *Cryptoparlatorea uberifera*. Lindinger, Ztsch. wiss. Ins.-Biol. 7. 126.
1929. *Silvestraspis sinensis*. Bellio, Boll. lab. zool. Portici 22. 160.
1934. *Neoparlatoria lithocarpis*. Takahashi, Dep. agr. gov. res. inst. Formosa rep. 63. 28, 35.

Vorkommen: Zelebes. Philippinen. China: Futschou. Formosa.

Apteronidia vateriae (Green) nom. nov.

1919. *Parlatoria (Websteriella) vateriae*. Green, Rec. Indian mus. 16. 444.

Vorkommen: Indien: Travancore.