

Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes.

Von Jan Roubal.

II.

Nachtrag zu „Parnass“ (l. c., p. 393).

Nebria brevicollis. *Pterostichus puncticollis*. *Zabrus validus*.
Calathus ellipticus. *Agonum antennarium*. *Brachynus incertus*. —
Ochthebius metallescens. *Helophorus viridicollis* s. Krüperi. —
Catops Oertzeni. — *Dianous caerulescens*. *Actobius rivularis*.
Philonthus bimaculatus, dtto f. *nitidicollis*. *Atheta clientula*. —
Haplocnemus turcicus. *Dasytes aequalis*. — *Lacon punctatus*.
Cardiophorus discicollis, *rufipes*. *Limonius parvulus*. — *Anthaxia nigrojubata*, *tenella*. — *Helmis Maugei* f. *aenea*. — *Xyletinus laticollis*. — *Oedemera flavipes*. — *Isomira intrusa*. — *Dorcatypus Fairmairei*. — *Pachybrachys limbatus* f. *maculata*.

Bulgaria: Pirin planina.

Leg. Ing. C. B. Kouřil-Prostějov als Mitglied der Expedition N. Museum-Prag, 1932. („G. P.“ bedeutet Gara Pirin; die anderen Fundorte sind unabgekürzt, wo nichts angeführt, ist hiemit das Piringebirge im Allgemeinen gemeint).

Helophorus glacialis, El Tepe, häufig, *brevipalpis* v. *monte-negrinus*. — *Necrophorus humator*, *interruptus*, Sad v., *vestigator*, Černa voda, dtto f. *trimaculata*. *Thanatophilus rugosus*. *Aclypea undata* v. *nitidior*, beschrieben aus Bos., das einzige Pirin-Ex. hat den Kopf, Pronotum und Schildchen minder glänzend. *Silpha obscura*, Černa v. — *Trogophloeus bilineatus*, G. P. *Oxytelus nitidulus*. *Bledius opacus*, G. P., *subterraneus*. *Stenus guttula*, G. P., *ater*, El Tepe, *providus*, G. P., *palposus*, G. P. *Dianous caerulescens*. *Paederus rubroscutellatus*, G. P. *Stilicus orbiculatus*, G. P. *Lathrobium apicale*, Kremnicko defilé, eine rare Art. *Xantholinus tricolor*, G. P., *distans*, *graecus*. *Philonthus politus*, G. P., *caerulescens*, *concinnus*, *varius*, *rufimanus*, *femoralis*, *pennatus*, G. P. *Staphylinus stercorarius*, *picipennis* v. *tristis* Kr. *Quedius lateralis*, G. P., *ochripennis*, *ochropterus*, *obliteratus*, G. P. *Conosomus pubescens*. *Falagria nigra* v. *jonica* und Übergänge, G. P. etc. *Tachyusa coarctata*, Pirin u. G. P., *umbratica*, G. P. *Atheta currax*, *insecta*, G. P., *alpicola*, El Tepe, häufig. *Astilbus canaliculatus*. *Ocalea badia*, G. P., *puncticollis*, in der Größe recht variabel. *Aleochara crassicornis*, G. P., *laevigata*, Pirin, G. P. —

Dryops striatopunctatus Heer v. Kouřilii n.

Die erste und zweite innere Punktreihe der Flügeldecken

der ganzen Länge nach mit sehr feinen, von den übrigen sehr auffällig abweichenden Pünktchen, die bei der flüchtigen Ansicht nur un- wesentlich von den feinen Pünktchen der Zwischenräume verschieden sind, sodaß ein Eindruck, als ob auf jeder Decke zwei Punkte fehlten, hervorgerufen wird; auch die dritte innere Punktreihe ist etwas schwächer. — Die Beschreibungen sprechen von gleichstarken Punkt- reihen, z. B. Heers Originalbeschreibung, Faun. Helvet. I, 1841, p. 466: „sat profunde striatopunctatis“; Mulsant, Hist. Nat. Col. Fran. XXII, 1872, p. 23: „neuf rangée striales de points gros“; Dodero, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Gen. XLVIII, 1918, p. 103: „nove strie marcate di grossi punti assai regolari e profondi“ etc.

Banderica. Zu Ehren des Entdeckers, H. Ing. C. B. Kouřil, benannt.

Helmis Maugei s. bosnica, bis jetzt nur aus Bos. zitiert, aber wohl weit über den Balkan verbreitet. — Laemophloeus duplicatus. — Lydus trimaculatus. Cerocoma Schreberi, zahlreich, f. viridula, dtto. Mylabris variabilis, G. P., quadripunctata, G. P., dtto f. Adamsi, dtto, Fabricii, polymorpha, Krupnik, alle auch anderswo in Pirin. Zonitis maculata, Krupnik, häufig.

Jugoslavia-Perister.

Leg. Dr. Cyril Purkyně jun. — Prag, X. 1926. Als Zusatz zu der Liste auf der Seite 145 und 177—178 dieser Ztschr. XII. (1932).

Trechus subnotatus f. pallidipennis, 1 Ex. Zabrus sp., 1 ♀. Pterostichus (Crisimus) monastirensis, 4 Ex. mit den etwas kürzeren und gewölbteren Elytren, aber mit dem hinten gerandeten Prosternum. Synuchidius Ganglbaueri. — Hydroporus planus, H. sp. n. ? ad nigrita, 1 Ex. Agabus biguttatus. — Ochthebius montanus, 2 Ex. — Catops nigrita, 1 Ex. Choleva elongata, 1 ♂. — Anisotoma humeralis. — Stenichnus collaris. — Omalium rivulare. Olophrum bulgaricum Scheerp., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 79 (1929), p. 37, bis jetzt nur in 2 Ex. bekannt. Lesteva punctata. Oxytelus clypeonitens. Stenus nanus. Paederus Baudii. Domene scabricollis, nach Winklers Cat. Col nur aus „E. c.“ Lathrobium (Glyptomerus) sp., 1 ♀. Xantholinus distans. Philonthus fuscipennis, bimaculatus f. nitidicollis, albipes, fulvipes, vernalis. Staphylinus mus, 1 Ex., Winkleri, dtto. Quedius cruentus, sehr zahlreich, punctatellus, fuliginosus, dubius, 1 Ex., pyrenaicus, viele Ex., schon lange aus Balc. (und auch aus den Südkarpaten) bekannt — nach Winkler, l. c. nur „P.“; semiaeneus. Bolitobius lunulatus. Atheta melanura, oblita, ein von den mittel-europäischen abweichendes Pärchen, Lioglula sp., 1 ♀. A. sulcifrons. Ocalea badia, puncticeps. Oxypoda umbrata. Aleochara verna. — Meligethes solidus. — Chaetocnema aridula, immat. Cassida vibex.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes. 43-44](#)