

Neue exotische Coleopteren (Malacodermata).

III. *)

Von M. Pic.

Lycus (Haplotycus) prolongatus n. sp. [Lycide].

Elongatus, ad medium paulo latior, apice attenuatus, subopacus, niger, thorace lateraliter elytrisq̄e antice late aurantiaciis. Rostro sat elongato; antennis parum crassis, deplanatis; thorace parum elongato; antice subarcuato, angulis posticis fere rectis; elytris thorace paulo latioribus, ad medium arcuate dilatatis, postice paulo attenuatis; distincte costatis, intervallis inaequale plicatis, humeris longe carinatis; infra corpore nigro.

Long. 15 mm. Afrika: Camerun (coll. Hicker et Pic).

Diese Art ist gekennzeichnet durch ihre sehr verbreitete schwarze Färbung, welche sich fast bis zur Mitte der Flügeldecken und zwar mehr auf die Scheibe als auf den Seiten hinzieht.

Calopteron breveaurantiacum n. sp. [Lycide].

Elongatum, post medium valde dilatatum et apice attenuatum, subopacum, nigrum, elytris apice breve et oblique aurantiaco notatis. Capite minute; antennis elongatis, depressis; thorace angustato, parum breve lateraliter fere recto, antice subarcuato, angulis posticis prominulis, medio carinato; elytris thorace ad basin paulo latioribus deinde valde dilatato-subarcuatis et apice attenuatis, in singulo distincte 4 costatis, costa 3^o reducta; intervallis diverse, non approximate, plicatis; pedibus elongatis.

Long. 9 mm. Columbia (coll. Hicker).

Nahe verwandt mit *C. pretiosum* Brg., von dieser Art, beim ersten Anblick, durch die entschiedene schwarze Flügeldeckenfärbung (ohne violetter Glanze), sowie durch den ganz dunklen Halsschild abweichend. Ferner anderseits von *I. Mariae* Pic verschieden durch den engeren Halsschild und durch die Flügeldecken, die weniger glänzend und mit feinerer Skulptur versehen sind.

Pyrogaster magniceps n. sp. [Lampyride].

Angustatus, capite thorace latiore, nitidus, griseo pubescens, nigro-fuliginosus, thorace, femoribus pro majore parte et abdomine postice flavis, elytris antice vage pallidior marginatis et sutura

*) Siehe I. im „Entom. Anzeiger“, Jahrgang XI, 1931, p. 377—379, und
II. „ „ „ „ „ XII, 1932, p. 250—255.

pro parte pallidiora. Capite breve et lato, thorace latiore, antice paulo brunnescente; antennis gracilibus et brevibus; thorace sat angustato, antice subogivale-attenuato, angulis posticis fere rectis; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subparallelis, postice paulo attenuatis, dense ruguloso-punctatis et parum costulatis; pedibus gracilibus, unguibus simplicibus.

Long. 6 mm. Costa Rica: Surrubres (coll. Hicker).

Diese Art ist deutlich kennbar durch die schmale und kleine Gestalt, sowie durch die Form des Vorderkörpers, bei welchem der Kopf breiter als der Halsschild und letzterer fast spitzbogig zulauft und blaß ist.

Luciola Grandjeani var. nov. *infrapallida* [Lampyride].

Elongatus, depressus, parum nitidus, testaceus aut flavus, elytris circa pallidioribus, vertice nigro maculata, antennis, tibiis anticis et intermediis pro parte tarsisque nigris.

Long. 10—11 mm. Portug. O. Afrika: Sikumba (coll. Hicker et Pic).

Beim ersten Anblick von *Grandjeani* Pic durch die fast einfarbigen, hellen Flügeldecken, sowie durch die ganz weißlichgelbe Unterseite verschieden.

Malthinus Sauteri n. sp. [Cantharide].

Angustatus, parum nitidus et paulo punctatus, griseo pubescens, nigro-fuliginosus, capite antice, antennis ad basin, thorace, abdomine pedibusque pro majore parte testaceis. Capite sparse punctato, elongato, postice valde attenuato, thorace latiore, oculis prominulis; antennis longissimis et gracilibus; thorace parum punctato, elongato et angustato, lateraliter sinuato, supra lateraliter et postice impresso, medio breve sulcato; elytris thorace valde latioribus, elongatis, postice angustatis et longe dehiscentibus; abdomine apice valde inciso et lobato, medio longe prolongato et spatuliforme; pedibus gracilibus et elongatis, testaceis, tibiis pro parte tarsisque obscuris, femoribus infra sulcatis.

Long. 7 mm. Formosa: Kankau (Sauter, in coll. Hicker).

Eine gut durch ihre schlanke Gestalt und ihre Flügeldecken, die nicht kürzer als das Abdomen sind, gekennzeichnete Art.

Lycocerus Hickeri n. sp. [Cantharide].

Elongatus, subopacus, pubescens et hirsutus, niger, thorace circa elytrisque purpureis. Capite breve, sat late, oculis paulo prominulis; antennis nigris, brevibus, parum crassis et deplanatis,

apice attenuatis; thorace capite paulo latiore, subquadrato, medio sulcato; elytris thorace latioribus, subparallelis, elongatis, postice breve attenuatis et apice subrotundatis, in disco et singulo fortiter bicostatis, fortiter sculpturatis; pedibus nigris, sat gracilibus, tibiis paulo curvatis.

Long. 11 mm. China (coll. Hicker et Pic).

Mit *L. distinctecostatus* Pic nahe verwandt, unterscheidet sich jedoch sofort von dieser Art durch den etwas breiteren und dunkelgefleckten Halsschild.

Tylocerus brevebasalis n. sp. [Cantharide].

Elongatus, fere opacus, griseo pubescens, rufo-testaceus, elytris pallidioribus, in singulo ad basin reducte nigro notatis, membris pro parte nigro-piceis. Capite breve et lato, thorace non latiore, parum punctato, oculis sat validis, antennis nigro-piceis, ad basin rufis, sat gracilibus, articulo 1^o elongato, non dilatato; thorace breve et lato, lateraliter sinuato, angulis rotundatis, lateraliter late explanato, medio sulcato, parum punctato; elytris thorace non latioribus, ad medium paulo latioribus, postice attenuatis, apice subrotundatis, minuto et dense punctatis; pedibus sat gracilibus, testaceis, femoribus apice et tibiis ad basin piceis.

Long. 10 mm. Insel Baru (coll. Hicker).

Eine an der gelblichen Hauptfärbung ihres Körpers und nur an der Basis kurz, dunkel gezeichneten Flügeldecken sehr leicht zu erkennende Art.

Tylocerus batavianus n. sp. [Cantharide].

Oblongo-elongatus, nitidus, paulo griseo pubescens, testaceus, capite, elytris postice late abdomineque nigris. Capite breve, sat lato, parum punctato, oculis prominulis; antennis gracilibus, articulo 1^o parum crasso, ad basin attenuato, 2^o elongato; thorace breve et lato, lateraliter subsinuato, supra paulo inaequale, parum punctato; elytris thorace parum distincte latioribus, lateraliter sinuatis, minute punctatis; pedibus sat gracilibus, unguibus simplicibus.

Long. 10 mm. Java: Batavia (coll. Hicker).

Kann in die Nähe von *T. Humbolti* Pic gestellt werden, leicht aber von dieser Art durch den kürzeren Halsschild und durch die hinten breiter schwarz gezeichneten Flügeldecken zu unterscheiden.

(Schluß folgt)