

Beschreibung vier neuer Coleopteren-Formen.

Von Jan Roubal.

Anaspis frontalis L. f. *umbriceps* n.

Der Kopf vor den Fühlern schwarz, nicht rot, wie dies bei der f. nom. artcharakteristisch der Fall ist.

RČS.: Rossia subcarpathica: Užok (leg. Zborník).

Gonodera luperus Hrbst. f. *densepunctata* n.

Die Zwischenräume der Flügeldeckenstreifen zweimal dichter und fast zweimal gröber punktiert als bei der f. nom. wodurch diese Form auf den ersten Blick sehr auffällig von der letzteren abweicht.

Bulgaria: Pirin planina: Šarlir. (leg. Kouřil).

Strangalia maculata Poda f. *subranotata* n.



Beiderseits des Schildchens befindet sich je eine schwarze Makel, in derselben Höhe, hinter der Elytrenbasis, wieder eine, und zwar eine kleine quere Makel in der Mitte jeder Decke; die erste schwarze Binde besteht aus sechs halb-kreisförmig angeordneten Makeln: die äußerste auf der Epipleure, die dorsale in der Mitte jeder Decke, die dritte an der Naht, teilweise mit der korrespondierenden der anderen Decke gebunden; unweit, oberhalb dieser steht eine ganz gleiche suturale, nach außen verkürzte quere akessorische Makel; die zweite Binde ist auf der Naht breit unterbrochen und reicht seitlich bis auf den äußersten Seitenrand; die dritte Binde ist ganz, die Elytralspitze schwarz

Slovakia: Harmanec 22. VI. 1934 (leg. Vrzal).

Oberea erythroptera F. f. *testaceicolor* n.

Der ganze Körper, mit Ausnahme der schwarzen Augen, rot, nur die Fühler zur Spitze etwas dunkler, die weniger gesättigten roten Flügeldecken vor der Spitze mit einem schwachen dunklen Schatten, die äußerste Spitze des Abdomens schwarz; dabei vollkommen erhärtet.

Jugoslavia: Sarajevo (coll. Roub.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Beschreibung vier neuer Coleopteren-Formen. 10](#)