

ENTOMOLOGISCHER ANZEIGER

Offizielles Organ des Vereines der Naturbeobachter und Sammler, Wien
Herausgegeben und redigiert von Adolf Hoffmann, Wien.

INHALT: A. Hepp, Bemerkungen über Lepidopteren aus dem Faunengebiet von Frankfurt (Main) und aus der Umgebung von Mainz (Zuträge II) (Fortsetzung). — L. Mader, Coccinelliden (Fortsetzung). — Woldemar Ermolajev, Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren des Rayon Tajschet (Ost-Sibirien) (Fortsetzung).

Bemerkungen über Lepidopteren aus dem Faunengebiet von Frankfurt (Main) und aus der Umgebung von Mainz. Zuträge II.

Von A. Hepp, Frankfurt (Main).

(Fortsetzung)

10. (105) *Hydroecia micacea* Esp. Ich habe den Falter im Sumpfgelände häufig gefunden. — v. Reichenau, S. 255, kannte *micacea* nur von Wiesbaden. Rössler, S. 114, fing den Falter an *Carex* Segge, vermutlich an der Blüte. Frankfurt.

11. (109) *Nonagria geminipuncta* Hatchett. Häufig bei Mainz. — v. Reichenau, S. 256, schreibt: Um Mainz fand ich die früher bei Wiesbaden so häufige Noctue noch nicht. Frankfurt. Der Falter scheint an bestimmte Plätze gebunden zu sein. Werden diese geändert, d. h. die Daseinsbedingungen ausgeschaltet, dann verschwindet die Art. Rössler, S. 115, schildert das drastisch.

12. (111) *Leucania impudens* Hb. Den Falter habe ich bei Mainz nicht feststellen können. — Rössler, S. 117 und v. Reichenau, S. 256, kannte *impudens* nur von Frankfurt. Die Umgebung von Frankfurt scheint eine Insel im Verbreitungsgebiet der Art zu sein. In Baden fing A. Gremminger den Falter bei Graben-Neudorf: Ein Stück 1916 am Licht. — 1924/25 im Erlicht abends an einer Schilfstelle mehrfach mit dem Netz erbeutet (Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf, Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebiets II, 1926, S. 56). J. Preiss, Die Schmetterlingsfauna des unteren Werratal, Kassel 1929, kennt *impudens* aus diesem Gebiet nicht.

13. (112) *Leucania impura* Hb. Um Mainz jedes Jahr häufig. — Der Falter muß v. Reichenau entgangen sein, da er ihm nur vom Salztal bei Wiesbaden kennt, S. 256. Dort flog er aber nur bis zu den 1850er Jahren, Rössler, S. 117. Frankfurt.

14. (132) *Rusina umbratica* Goeze. Raupe um Mainz wiederholt gefunden. Sechs Falter erzogen. — v. Reichenau hat den Falter anscheinend nicht selbst gefunden. Seine Bemerkung (S. 258), der Schmetterling wird an Waldrändern geködert, läßt darauf schließen. Frankfurt.

15. (170) *Orrhodia ligula* Esp. Der Falter war bis 1924 auf dem Mainzer Sand noch häufig. Danach nicht mehr gefunden. — Nach v. Reichenau, S. 262, einzeln am Köder. Frankfurt.

16. (179) *Xylomiges conspicillaris* L. Raupe bei Mainz häufig an warmen Abhängen unter Hecken gekratzt. — Nach v. Reichenau, S. 263, von Dr. Bastelberger im Rheingauer Taunus gefunden. Bei Wiesbaden einzeln, Rössler, S. 72. Um Frankfurt bisher nur in den Formen *intermedia* Tutt und *melaleuca* View.

17. (180) *Xylocampa areola* Esp. Falter um Mainz öfter gefunden und ab ovo gezogen. — Auch diesen Falter kannte v. Reichenau, S. 263, nur von Weilburg. Frankfurt. Nicht so selten, wie ich annahm. *Areola* wird jedes Jahr gefunden.

18. (195) *Erastria uncula* Cl. Fehlt bei Mainz. Bei Raunheim — gehört nicht mehr zum Gebiet — habe ich *uncula* mit *argentula* am 24. VI. 1932 öfter gefunden. v. Reichenau, S. 266, erwähnt *argentula* von Mainz, selten; *uncula* kennt er von Wiesbaden, ebenfalls selten. *Uncula* auch bei Frankfurt, *argentula* noch nicht gefunden.

19. (200) *Emmelia trabealis* Scop. Die Art hat v. Reichenau in seinem Verzeichnis vergessen. *Trabealis* kommt um Mainz häufig vor. — Damit ist meine Frage in der Arbeit unter a) Nr. 200 geklärt. Wiesbaden häufig, Rössler S. 126 als *Agrophila Sulphuralis*. Frankfurt.

20. (207) *Plusia pulchrina* Hw. Acht Raupen an Geißblatt gefunden, aber nur ein Falter erzogen. Die anderen Raupen ergaben Parasiten. — v. Reichenau, S. 267, führt den Falter nur von Wiesbaden an. Frankfurt.

21. (224) *Herminia cribralis* Hb. Zwei Raupen bei Raunheim gekratzt. Daraus einen Falter erhalten. — v. Reichenau, S. 269, bemerkt: „Bei Frankfurt“. Von Boldt die Raupe wiederholt gefunden. Fehlt auch bei Wiesbaden, Rössler, S. 122.

(Schluß folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Hepp Albert

Artikel/Article: [Bemerkungen über Lepidoptern aus dem Faunengebiet von Frankfurt \(Main\) und aus der Umgebung von Mainz. Zuträge II. 165-166](#)