

## Dichotomische Tabelle der *Euplectus*- Leach. Arten aus der Gruppe des *Euplectus* *brunneus* Grimm.

Jan Roubal.

Seit der letzten synoptischen Bearbeitung der palaearktischen *Euplecten* von Raffray in *Annal. Soc. Entom. France*, LXXIX, 1910, S. 179—264, planche 5—7 und von Reitter in *Fauna Germanica*, II, 1909, S. 208, wurden einige neue Anschauungen bezüglich der Artencharakteristik, sowie einige neue Arten, nomenklatorische Änderungen etc. publiziert und da viel davon in der Literatur recht zersplittert, halte ich es für angezeigt, einen Überblick darüber zu liefern; dazu kommen noch einige ergänzende Notizen.

- 1" Kopf, ohne die Augen betrachtet, nach vorne nicht, oder fast nicht verengt.
- 2" Augen zweimal kleiner als bei den folgenden, 5. Fühlerglied des Männchens vergrößert, die Medianfurche des breiteren Pronotums stark; ♂: die Trochanteren der Hinterbeine mit einem gekrümmten Zahn bewaffnet, das 2. und 5. Tibienpaar hackenförmig endend *oligops* Peyerimhoff, *Bull. Soc. Ent. Fr.* 1915, 221, 1 f. — Alg.
- 2" Augen groß, Pronotum lang, das Männchen ohne die sekundären Sexualcharaktere der Fühler und Beine.
- 3" Fühler kurz, Kopf stark gerunzelt, Flügeldecken gewölbt, breiter als lang ♀ *Eichleri* Fleisch. *Wien. Ent. Ztg.* XXXVIII, 1921, 145. — Ca. occ.
- 3" Fühler länger, Kopf nicht gerunzelt, Flügeldecken länger als breit, nicht auffällig gewölbt.
- 4" Scheitel mit einem tiefen triangulären, durch ein Kielchen bewaffneten Einschnitt, Abdomen so lang wie die Flügeldecken, stark gewölbt; licht gefärbt *oblitus* W. Blattny, *Col. Rundschau* II, 1913, 175—177. — Gehört lediglich zum *brunneus* Grimm, oder zu einem anderen, indem die Beschreibung darauf gut paßt. — Boh.
- 4" Die erwähnte Beschaffenheit des Scheitels sehr schwach, manchmal obsolet, die Färbung des Körpers dunkler.
- 5" Kopf von der Pronotumsbreite.

- 6'' Körper auffallend niedergedrückt, Kopf quadratisch  
*Duponti* Aubé. — E. c.
- 6' Körper gewölbt, mehr oder weniger quer  
*brunneus* Grimm. — E. c. m.
- 5' Kopf schmaler als der Halsschild
- 7'' Kopf quadratisch, kaum punktiert, Körper gewölbt  
*Frivaldszkyi* Saulcy. — Balc. b. Hu. Ruman. Slov.
- 7' Kopf quer, ziemlich stark punktiert, Körper weniger gewölbt  
*Pelopsis* Reitt. — Gr.
- 1' Kopf, ohne die Augen betrachtet, nach vorne mehr oder weniger verengt.
- 8'' Gelbrot oder rötlich.
- 9'' Kopf sehr lang, absolut unpunktirt, die quere Frontalfurche sehr seicht, die breite Kopfpattie vor den Augen nach vorne mehr verengt, oben mehr flach  
*Tenenbaumi* Roub.  
Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, 181—182. — Palaest.
- 9' Kopf kürzer, wenigstens etwas punktiert, die quere Frontalfurche scharf, tief.
- 10'' Kopf gewöhnlich breiter als lang, seine quere Frontalfurche tiefer, in der Mitte gleich tief wie anderswo, Pronotum unpunktirt oder fast unpunktirt.
- 11'' Körper, besonders die Flügeldecken parallel, das vorletzte Abdominalsternit des ♂ mit einem tiefen Grübchen.
- 12'' Viertes Abdominalsternit des ♂ ohne Ausschnitt, die übrigen nicht verflacht  
*bescidicus* Reitt., non Raffr. — Machulka, Entom. Nachrichtenbl. IV, 44—45. — E. c.
- 12' Viertes Abdominalsternit des ♂ halbmondförmig ausgeschnitten, die übrigen schwach verflacht  
*v.lunifer* W.C. Blattny, Col. Rundsch. II, 1913 — non 1914, wie in Winklers Cat. Col., 201. — Austr. inf.
- 11' Körper, besonders die Flügeldecken nicht parallel, breiter, das vorletzte Abdominalsternit des ♂ nur mit einem schwachen Eindruck  
*bohemicus* Machulka, n. n., l. c. — *bescidicus* Raffr., non Reitt., *Reissi* W. C. Blattny, Entom. Mitteil. III, 1914, 59—61, 3 f. — E. c.
- 10' Kopf oft so breit wie lang, seine quere Frontalfurche seichter, besonders in der Mitte.

- 13'' Körper schmäler, mehr konvex, Pronotum sehr gut kenntlich  
 punktiert *decipiens* Raffr. —  
 E. c. m. — Einige ♀-Stücke meiner Sammlung aus Lokve  
 (Cro.) und von Hluboká (Boh.) haben einen breiteren, fast  
 überall punktierten Kopf.
- 13' Körper breiter, weniger konvex, Pronotum unpunktirt  
*decipiens* Raffr. v. *caspicus* Raffr. — Casp.
- 8' Schwarzbraun, pechbraun, Füße licht  
*piceus* Motsch. — E. c. Hi. Ca.

---

## Literaurschau.

### Diptera.

- Fairchild, Notes on Tabanidae. Occ. Pap. Bost. Soc. Nat. Hist. VIII,  
 139. — Johannsen, Richardia telescopica found in Costa Rica (Ortalidae)  
 Bull. Brookl. Ent. Soc. IXXX, 95. — Latta, A note on the distribution of  
 Eumerus narcissi (Syrphidae) Proc. Ent. Soc. Wash. XXXVI, 80.