

Jahrgang XVI

1. Jänner 1936

Nummer 1

# ENTOMOLOGISCHER ANZEIGER

Offizielles Organ des Vereines der Naturbeobachter und Sammler, Wien  
Herausgegeben und redigiert von Adolf Hoffmann, Wien.

INHALT: M. Pic, Neue Coleopteren (Malacodermata) — Otto Sterzl, Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna des oberen Zillertales — Woldemar Ermolaev, Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren des Rayon Tajschet (Ostsibirien) (Fortsetzung)

## Neue Coleopteren (Malacodermata).

Von M. Pic.

### *Themus flavoscutellaris* n. sp.

Elongatus, nitidus, sparse, griseo pubescens, testaceus, capite thoraceque testaceis et nigro notatis, elytris viride-metallicis, membris et abdomine pro majore parte nigris. Capite lato, testaceo ad et inter oculos nigro-metallico notato, oculis valde prominulis; antennis gracilibus, nigris, ad basin infra testaceo notatis, articulo 2° et 3° fere aequalibus; thorace breve sat lato, lateraliter fere recto, testaceo, in disco nigro-metallico bimaculato; elytris thorace valde latoribus, parum elongatis, subparallelis, minute et dense ruguloso-punctatis, ad basin nitidioribus; pedibus gracilibus, nigris, coxis et trochantoribus testaceis; abdomine pro majore parte nigro, apice testaceo.

Long. 17—19 mill. India (coll. Hicker und Pic).

Eine mit *T. subiridipennis* Pic verwandte Art; von dieser verschieden durch ihre weniger lange Form, sowie durch die Grundfarbe der Flügeldecken (dunkel metallisch) und durch den mit kleineren Makeln gezierten Halsschild.

### *Cantharis testaceohumeralis* n. sp.

Parum elongata, postice paulo attenuata, nitida, griseo pubescens, rufo-testacea, capite postice, macula mediana thoracis membrisque pro majore parte nigris, elytris nigro-cyanis, externe angusto rufo-testaceo marginatis, ad humeros rufo-testaceo maculatis. Capite sat robusto, antice testaceo, postice nigro; antennis gracilibus, nigris, ad basin infra testaceo notatis; thorace

parum elongato, antice paulo attenuato et subarcuato, angulis posticis prominulis et pilosis, illo rufo-testaceo, in disco breve nigro notato; scutello rufo-testaceo; elytris thorace sat latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, ruguloso-punctatis, in disco subcostulatis; pedibus parum gracilibus et elongatis, nigris, femoribus ad basin testaceis, tibiis anticis parum curvatis; infra corpore testaceo.

Long. 12 mill. China: Yunnan (coll. Hicker).

Durch ihre Form mit *C. brahma* Gorh. verwandt, aber von dieser zu unterscheiden durch Kopf und Halsschild (beide sind dunkel gefleckt) und durch die Flügeldecken, die nicht einfarbig dunkel sind, sondern der Saum und die Schultermakel sind rotgelb-

### *Chauliognathus subacuminatus* n. sp.

Oblongus, parum nitidus, pro parte subopacus, testaceus, capite et elytris nigro signatis, membris pro parte nigris. Capite testaceo, medio inter oculos reducte nigro 4 maculato et post oculos nigro notato; antennis nigris, ad basin testaceis; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, supra pro parte granuloso; elytris ad basin thorace angustioribus, ad medium dilatatis, postice attenuatis, pro parte et sparse granulosis, illis testaceis, post medium ad suturam sat late nigro notatis; pedibus nigris et testaceis, tibiis ad basin angustioribus et subarcuatis; infra corpore pro majore parte testaceo.

Long. 12—13 mill. Paraguay (coll. Hicker). Brésil (coll. Pic).

Kann in die Nähe von *C. amplipennis* Pic gestellt werden, unterscheidet sich von diesem durch den mehr queren Halsschild und durch die gegen die Mitte mehr erweitert und breit schwarz gezeichneten Flügeldecken.

### *Silis inapicipennis* n. sp.

♂ Parum elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, capite membrisque pro majore parte nigris. Capite breve et lato, fere impunctato; antennis nigris, brevibus, gracilibus; thorace capite latiore, medio paulo dilatato, postice strangulato, lateraliter sinuato et paulo biinciso, antice angulato et postice spinoso, in disco medio fortiter biimpresso; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice non attenuatis, minute, ad basin sparse, punctatis; pedibus gracilibus, nigris, femoribus pro parte ad basin, tibiis intermediis et posticis intus postice rufis.

Long. 8 mill. Brésil (coll. Hicker).

Eine Art, die beim ersten Anblick leicht zu erkennen ist durch ihre größtenteils rotgelbe Färbung und durch die Flügeldecken, welche an der Spitze keine dunkle Zeichnung haben. Kann in die Nähe von *S. brevenotata* Pic gestellt werden, aber von dieser, außer den einfarbigen Flügeldecken, durch die kräftigere Form, durch den anders gebauten Halsschild und durch die fast ganz dunklen Beine verschieden.

*Aclytia testaceiceps* n. sp.

Parum elongata, subparallelia, nitida, fere glabra, nigra, capite testaceo. Capite breve et latō, minute punctato, oculis nigris, convexis; antennis nigris, pilosis, gracilibus, elongatis; thorace capite latiore, breve et valde transverso, circa marginato, lateraliter subarcuato, supra medio binoduloso et sulcato, parum punctato; elytris parum latis, sat brevibus, apice subrotundatis et dense rugulosopunctatis; pedibus nigris, gracilibus; segmento antepenultimo abdominis valde inciso, ultimo angustato, capuliforme.

Long. 5 mill. Nova Guinea (coll. Hicker).

Diese Art, welche eine eigentümliche Färbung besitzt, unterscheidet sich von den Arten der Gattung *Aclytia* Broun in meiner Sammlung durch den Bau ihres Halsschildes. Diesem fehlt die verdickte Seitenfalte und auf dem ganzen Umkreis sind seine Ränder nach oben aufgebogen. Kann zu *A. fulvithorax* Broun gestellt werden.

*Danacea cervina* v. nov. *diversipes*.

Nigra, supra olivacea, griseo pubescens; pedibus bicoloribus, piceis, tibiis apice femoribusque testaceis.

Macédoine (coll. Hicker).

Steht durch die Färbung der Beine zwischen der typischen Form und der var. *macrocephala* Schauf.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1936

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Neue Malacodermata \(Coleopteren\). 1-3](#)