

rot, der Kopf bis auf die vor den Augen gelbroten Seiten schwarz; der Halsschild mit meist in größerer Ausdehnung dunkler Scheibe ansonsten das Schildchen, die Schulterbeule und mehrere rudimentäre Reihen von größeren Punkten an den Seiten, gegen die Spitze und oft auch an der Naht der Flügeldecken schwarz. Die Unterseite und der pubeszente Teil der Schenkel schwarz; die Hüften, die Schienen und die Tarsen bräunlichrot, die Kiefertaster und die Fühler, letztere mit Ausnahme der dunklen Keule rötlichgelb.

Kopf und Halsschild ziemlich kräftig und ziemlich dicht punktiert, im Grunde glatt glänzend, nicht schagriniert, ebenso die Flügeldecken. Der Nahtstreifen der letzteren vor der Mitte ziemlich plötzlich erloschen; die größeren Punkte der drei oben erwähnten Punktreihen sehr distant. Von den transparenten, schwarzen Punktreihen nur jene am Seitenrande, gegen die Spitze und meist auch ein bis drei Reihen an der Naht stets deutlich ersichtlich.

Das Kinn kräftig und ziemlich dicht punktiert. Am Abdomen das fünfte Sternit mit sehr flachem, rundlichen Ausschnitt oder ein wenig abgestutzt.

Long. 3·6—4·3 mm.

Patria: Südamerika (Details nicht bekannt). Sieben Exemplare dieser interessanten Art wurden von Charles Darwin während seiner Voyage of the „Beagle“ gesammelt und mir von Herrn Dr. Hugh Scott aus dem Cambridge Univ. Museum gütigst zur Beschreibung mitgeteilt. Ich widme die Art ihrem berühmten Entdecker Charles Darwin. — Die Belegstücke sind im British Museum London, im University Museum Cambridge und in meiner Sammlung aufbewahrt.

(Fortsetzung folgt.)

Die Krainer Höhlen (Grotten) und die in denselben vorkommenden Käfer und sonstigen Tiere.

Von Professor Josef Sever, New-York. (Fortsetzung.)

Gleich am Eingange unter Steinen und im Geröll treffen wir auf *Anophthalmus Bilimeki* v. *robustus* (Riesenexempl.). Die Höhle ist etwa 30 m lang und hat auch einen 10 m Seitengang. Vorhanden sind, hauptsächlich unter Steinen, *Anophthalmus Bilimeki* v. *robustus*, *Bathyscia acuminata*, *Laemostenus Schreibersi* mit var., *elongatus*, vereinzelt *Bythinus subterraneus*. An sonstigen Tieren *Titanethes albus*, *Brachydesmus*, *Lythobius stygius*, *Monolistra coecca*, *Stalita taenaria*, an den nassen Wänden *Carychium lautum*, *speleum* und *Frauenfeldi*.

Beim Dorfe Podtabor in einem kleinen Fichtenbestand befindet sich eine etwa 10 m lange Höhle, die in einen kleinen Tümpel endet. Darin tummeln sich *Monolistra coecca* und *Asselus cavaticus*. Im trockenen Vorderteil ist *Bathyscia globosa*, *Laemostenus cavicola* und *elongatus*. Sehr selten ist *Maecherites speleum* zu finden. Häufig jedoch *Lythobius stygius*, *Titanethes albus*, *Carychium speleum*, *Schmidti* und *alpestre*. Vereinzelt *Obisium brevimanum*.

Determiniere,

tausche und kaufe Halipidae u. Dytiscidae der ganzen Erde. Mit Vorliebe Exoten!

L. Gschwendtner, Linz, Ob.-Oest.
Hauptstrasse 28.

Malocodermata (Canthariden)

determiniert, kauft und tauscht (bessere Arten auch geg. Blindtiere) sowie Canthariden-Literatur sucht zu erwerben

Richard Bicker, Hadersdorf-Weidlingau
bei Wien, Mauerbachstrasse 123.

Pal. Cicindelidae und Histeridae

tauscht, kauft und bestimmt.
Vorherige Anfrage erwünscht.

F. Blühweiß, Wien XX./2,
Nordbahnstrasse 4.

Maikäfer-Larven (Engerlinge)

und

Agriotis-Larven (Drahtwürmer)

in Spiritus oder lebend suchen in Anzahl

Dr. Schlüter & Mass, Halle a. S.

Naturwissenschaftliche Lehrmittel-Anstalt.

Wünsche Ankauf

und auch Tausch von seltenen und interessanten cavernicolen Coleopteren.

Oblata-Verzeichnisse erbittet

Commandant Magdelaine

Paris 16^e, 3 rue Theophile Gautier.

ICH SUCHE

für meine Abnormitätensammlung von Käfern:

1. Käfer in Monstrositäten (Füße, Hörner, Flügel usw.) doppelt oder dreifach.
2. Käfer (Hybriden od. Bastarde mit ihren Vorgängern), gute Typen.
3. Käfer, Hermaphroditen.

Ich sammle nicht stropierte, defekte, deformierte oder schlecht entwickelte Tiere. Ich antworte auf alle Briefe, sofern es sich um vernünftige Angebote handelt. Ich bin fortlaufend Käufer, die Anzeige bleibt deshalb stets gültig.

Ich biete an Geld oder argentinische Käfer oder alte, gute und seltene argentinische Briefmarken.

Um keine Zeit zu verlieren, bitte ich, mir nichts anzubieten oder zu verlangen, was nicht dieser Anzeige entspricht.

DR. DALLAS, 1790 Mendes de Andes,
Buenos Aires, Argentinien.

Coleopteren-Verkauf

wegen Aufgabe des Lagers zu 1/2 der Reiterliste. Tausch auf Schularten in jeder Stückzahl.

Jürgen Schröder, Kossau bei Plön,
Holstein.

Bei Rasica unweit Ponikve und Grosslaschitz (Eisenbahnstation) befinden sich eine Anzahl kleinerer Grotten und Höhlen, von welchen ich nur die bedeutendsten und ergiebigsten erwähnen will.

Die Grotte Skedenca nad Gojzdiccum ist sehr leicht zugänglich. Dieselbe ist 22 m lang, 25 m breit, mit schöner Tropfsteinbildung. Der Eingang liegt in einem flachen Kessel und senkt sich anfangs mäßig, steigt dann an und wir gelangen in eine geräumige, 5 m hohe Halle.

In dieser Höhle haust der sehr seltene *Laemostenus paradoxus*, ferner *elongatus*, *Leptoderus Hohenwarti*, *Bathyscia globosa*, *Leptinus testaceus*, *Ptinella anophthalma*, im Eingangskessel unter Moos und Laub *Bythinus crassicornis*, *Stussineri* und manch andere begehrte Art. Ansonsten befinden sich in der Höhle *Titanethes fracticornis*, verschiedene *Thysanuren*, *Poduriden* und *Accarinen*.

Die in der Nähe befindliche 36 m lange Höhle Skedenca nad Rajnturnom weist eine mit der vorgenannten Höhle übereinstimmende Fauna auf.

Der Fahrstraße entlang von Rašica nach Ponikve gelangen wir zu einer Höhle, in die der kleine Rašicafluß sich ergießt. Zugänglich ist diese Höhle nur bei sehr niederem Wasserstand. Doch finden wir darin nur *Thysanuren* und auffallend häufig den Grottenolm *Proteus anguinus*.

In der Nähe der Ortschaft Grosslaschitz liegt die Konjšea jama, die als Aufbewahrungsort für Nahrungsmittel dient. Diese ist klein, ohne jeden Schmuck, der Boden mit Gerölle bedeckt. Vorhanden sind: *Anophthalmus Bilimeki* v. *robustus*, v. *angusticollis*, auch *Schaumi*, jedoch selten, *Homalota spelea*, ferner *Catops nigricans*, *Choleva angustatus* und *Cryptophagus dentatus*. An sonstigen Tieren *Stalita taenaria*, *Titanethes albus*, *Brachydesmus subterraneus*, die Grottenheuschrecke *Troglophilus cavicola*, an der nassen Wand *Carychium speleum*, *lautum* und *Schmidti*, weiters auch verschiedene *Thysanuren*, *Poduriden* und *Accarinen*.

Von Großlaschitz gelangen wir per Bahn zur Station Ortonek. In den Waldungen der Mala gora in der Nähe des Dorfes Velke poljana befinden sich zwei kleine, jedoch sehr ergiebige Höhlen, die Velka tkavcja und Mala tkavcja. Darin finden wir: *Laemostenus paradoxus*, *elongatus*, *Anophthalmus Bilimeki*, mit var. *robustus*, auch *angusticollis*, *Schaumi* mit der äußerst seltenen var. *planipennis*, *Troglorrhynchus anophthalmus*, *Leptoderus Hohenwarti*, einzeln *Parapropus sericeus*, *Bathyscia accuminata*. Aus dem Laub zu sieben sind: *Bathyscia caelata*, *montana*, *Homalota spelea*, *Catops nigricans*, *Choleva angustata*, *Cryptophagus dentatus*, *Leptinus testaceus*. Außerdem beherbergt die Höhle *Thysanuren*, *Poduriden*, *Accarinen* und in Massen die Grottenheuschrecken *Troglophilus cavicola* und *neglectus*, An Spinnen die schöne *Stalita taenaria* sowie *Obisium speleum*. Die letzteren richten unter den vorhandenen *Leptoderus* und *Parapropus* große Verheerung an. Besonders besuchenswert sind diese beiden Höhlen für den Conchyologen. *Carychium speleum*, *alpestre*, *Schmidti*, *lautum* und *Hyalina cellania* sind in Anzahl vorhanden.

Carabus clathratus

f. typ. Serie von einer Lokalität zu kaufen oder tauschen gesucht.

Dr. St. Breuning, Wien IV.,
Prinz Eugenstrasse 18.

Lepidopteren.

50 Sphingiden

palaearkt. und nordamerik. mit prachtvollen Sachen dabei wie Kindermanni, modesta, achemon, dahlii, lineata etc. in guter IIa Qual. und Spannung zum festen aber billigen Preis von nur 150—Mark. Porto und Packung extra. Nur Voreinsendung auf Postscheckkonto: Berlin Nr. 31.937.

E. Weppner, Wilmersdorf, Durlacherstr. 3.

Sphingiden

aller Erdteile kauft und tauscht
Gehlen, Berlin-Lichterfelde-Ost.
Parallelstrasse 3.

50 gespannte Falter

aus den Glatzer Gebirgen 30—50 Mark.

10 Pracht-Exoten

mit *Ornith hecuba* ♀, *Pap. ulysses*, *pitmani*, *Hestia (Riese)*, *Tenaris* u. a. 120 M. Nachnahme, Porto, Packg. extra.

Jul. Stephan.

Reinerz in Schlesien (Friedrichsberg).

Zygaena.

Suche unausgesuchte Ausbeuten sowie einzelne aberrative Stücke.

Dr. Przegendza, Nürnberg, Josefspl. 8.

Acraeidae

kauft — tauscht — determiniert

Dr. med. C. le Doux, Fürstenwalde, Spree.

Als Spezialsammler der Gattung

Zygaena

suche stets unausgesuchte Originalausbeuten, auch einzelne interessante Stücke und Serien aller Fundorte.

Prof. Dr. Burgeff, München, Nymphenburg, botanisches Institut.

Puppen jeder Art,

laufend zu kaufen gesucht. Gefl. Quantitäts- und Preisangebote an

Göth. Budde, Berlin W 8, Behrenstr. 66
Postscheckkonto Berlin 119.405.

Verkaufe ca. 3.000 Stück pal. und exot.

Lepidopteren.

Eine Sammlung Briefmarken. 1600 St. sowie einige tausend Doubletten um 300 tsch. Kronen.

Aug. Fiedler, Schönlinde in Böhmen,
Schmiedestrasse 10.

Von der Station Ortonek begeben wir uns nach dem deutschen Gottschee, um die Grotten des Kulpflusses zu besuchen.

Von der Stadt Gottschee, der Strasse nach Brod befindet sich etwa 15 Minuten abseits der Franziskus-Kapelle, in der Kette des Friedrichsteinergebirges die Franziszi-Grotte, auch Mehrerschloch genannt.

Der in einer Mulde befindliche Grotteneingang ist leicht auffindbar. Die Höhle ist gegen 50 m lang, ziemlich feucht und ohne Topfsteinschmuck. Darin kommen vor: *Anophthalmus Bilimeki*, *Aphaobius Milleri*, *Bathyscia acuminata*, vereinzelt auch *Laemostenus Schreibersi* und *elongatus*, *Homalota spelea*, *Catops nigricans* und *Leptinus testaceus*.

In der Nähe des Dorfes Sele, im sogenannten Seler Hügelgebiet befinden sich mehrere kleinere Grotten, deren einige von einem Bach durchströmt werden, in denen der Grottenolm *Proteus anguineus* zahlreich haust. Doch sind eigentlich nur zwei Höhlen, deren Besuch lohnend ist. In den Vorhallen dieser zwei Grotten herrscht zwischen dem Gerölle eine auffallend üppige Vegetation. Die Laubmassen dieser Höhlen, die durch zahlreiche Löcher eindringen, geben eine vorzügliche Sieb Gelegenheit. Besonders reichhaltig sind *Pselaphiden* vorhanden. Im Steingerölle finden wir *Cychnus rostratus*, *Carabus violaceus* mit schönem Purpurrand, ferner *Laemostenes elongatus* und *Schreibersi* und noch verschiedene *Carabiden*. Im eigentlichen Innenraum der Höhle kommt *Anophthalmus Bilimeki* und var. *robustus* häufig, *Bathyscia acuminata* und *Parapropus sericeus* vereinzelt, sehr häufig jedoch *Leptacinus testaceus* vor. Ansonsten zahlreich *Asseliden*, *Accarinen* und *Poduriden*. Das *Obisium brevimanum* sowie *Stalita taenaria* sind in den Höhlen gleichfalls vorhanden. An den Wänden sind ziemlich häufig an Conchylien das *Zospeum speleum* und *alpestre*.

(Fortsetzung folgt.)

Bausteine zur Lepidopterenfauna des Salzkammergutes.

Von H. Stauder, Wels. (Mit 19 Neubeschreibungen.)
(Fortsetzung.)

veuberata Sc. eine reichhaltige Serie, ziemlich variabel, im ganzen Dachsteingebiete gemein bis etwa 2000 m. Sehr gut gezeichnete Stücke. Nennenswert sind 4 Stücke ab. *vogesiaria* Peyer mit gänzlich zeichnungslosen Hinterflügeln und gelblicher Vflgl.-Zeichnung. — Neue Form *bifasciata* m. Die typische *veuberata* besitzt auf den Htflgl. nur eine dunkle Bogenlinie (nach der Mitte proximalwärts!) Mir liegen 7 ♂♂ vor, welche eine sehr deutliche weitere Bogenbinde im Mediantteile der Hflgl. aufweisen. Bei diesen Stücken steht auch zwischen der normalen, also proximalen Binde und dem Saume noch eine dritte, die jedoch nur mehr sehr schwach angedeutet ist.

scripturata Hb. Traunstein 8. VII. bei 1500 m ein ausnehmend großes ♂; Hallstatt 25. VII. ein verschwommen bezeichnetes ♂; Krippenalm 1400 m, 23. VII., 6 etwas dunkler gezeichnete ♂♂ mit stark braunem Einschlag. — *sociata* Bkh. Wels, 14. VII. —

Tütenfalter,

40 T. polyphemus, 10 A. cynthia, 20 A. orizaba, 5 C. promethea, en bloc für den billigen Preis von nur 295.— Mk. abzugeben. Desgleichen viele gespannte Sachen palaeart. und exot. Tagfalter, Schwärmer, Spinner, Bären, Eulen, Spanner wegen Räumung meines Doublettenlagers allerbilligst. Interessenten wollen Liste einfordern geg. Rückporto.

E. Weppner,
Wilmsdorf, Durlacherstrasse 3.

Uganda u. Kenia Butterflies Moths, Beetles etc.

In great beauty and variety. Bargain lot of 100 butterflies of 30 spp. 2 Livre Sterling. Post free.

R. A. Dummer, c/o. Kampala P. O.
Uganda.

Zuchtmaterial

(E., Rp. u. Ppp.) von machaon, podalirius, vespertilio, proserpina, galli, elpenor, euphorbiae, porcellus, livornica, ligustri, stellatarum, pinastris, villica, aulica, purpurata, pavonia, pyri, spini, vinula, lanestri, C. lunula. Preisliste geg. Rückporto. Gibt ab:

O. Muhr, Wien XV., Mariahilferstr. 172.



Wir zahlen für

virgaureae ♂ à 2 Mk.

bellargus ♂ . à 3 Mk.

und nehmen große Posten.

Dr. O. Staudinger & Bang-Haas,
Dresden-Blasewitz.

L. monacha,

getötete Puppen, Tütenfalter od. Falter gespannt in jeder Anzahl gibt ab gegen jedes andere Insektenmaterial Aberation von weiss bis schwarz. Bei Kauf bitte um Anbot für 100 Stück.

R. Sitka, Fachl., Jungbuch, Böhmen.

Lycaena Bellargus

500 ♂♂ in denkbar bester Beschaffenheit in Tüte gesucht. Gebe im Tausch dafür asiatische Palaearten, Exoten von Indien und im Winter lebende Japanpuppen.

Emil Werner, Neukölln, Weserstr. 208.

Noch nie angeboten!

Im Auftrage eines Freundes in Argentinien abzugeben: Lebende Puppen v. *Dirphia venata*, [hochselten, fehlt fast in allen Sammlungen], desgl. von *Attacus jacobaeae*, desgl. von *Hyperch. viridescens* sowie e. l. Falter von *Att. jacobaeae* in Tüten. Angebote nur in Auslandswährung an

K. Dietze, Plauen i. V., Seminarstr. 15.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Sever Josef

Artikel/Article: [Die Krainer Höhlen \(Grotten\) und die in denselben vorkommenden Käfer und sonstigen Tiere. 91-93](#)