

Bei lebhafteren, schnellfüßigen Höhlenbewohnern wie z. B. bei *Bathyscien* und *Anophthalmen* ließe sich die Möglichkeit vielleicht noch vorstellen, daß sie die Höhle gelegentlich verließen oder auf passive Art verlassen mußten und so glücklich waren, noch zeitgerecht in eine andere mit gleichen Lebensbedingungen zu gelangen, wo sie sich unverändert weiter fortpflanzen konnten. Der Gedanke ist — wenn auch etwas abenteuerlich — nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Tiere müssen den Weg nicht auf einmal zurückgelegt haben, sie können generationenlange Rasttage unter Steinen u. s. w. gehalten haben. Auch bei Herculesbad fand ich ziemlich weit abseits jeder Höhle zu meiner nicht geringen Überraschung eine *Bathyscia insignis* Friv. unter tief im Boden eingebettetem Stein. Sie war vielleicht nicht die einzige. Wenn auch äußerst selten, kommt sie möglicherweise in der ganzen Herculesbader Umgebung auch außerhalb der Höhlen vor oder aber sie war ein solches Wandertier, welches gegebenen Falles wieder in eine Höhle gelangen kann, wo sie zweifellos zusagendere Lebensbedingungen finden dürfte, wo es ihr zahlreiches Vorkommen z. B. in der Tatärzyhöhle vermuten läßt. Auch in anderen Höhlen bei Herculesbad ist sie häufig.

(Fortsetzung folgt.)

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

32. *Araschnia levana* L. Im Waldgebiete des Rachsthurn nur einzelne Stücke, darunter auch ein ab. *porima* Ochs. ab. *prorsa* L. im ganzen Gebiete verbreitet, jedoch nicht häufig, immerhin häufiger als die Stammform.

33. *Melitaea maturna* L. Am Visoka und Rachsthurn je ein schön stark abgeflattertes ♀.

34. *Melitaea cinxia* L. Im ganzen Gebiete verbreitet, jedoch nur einzeln fliegend; relativ am häufigsten am Thebner Kogel.

35. *Melitaea didyma* Ochs. Im ganzen Gebiete verbreitet, besonders bei Bösing und St. Georgen ziemlich häufig.

36. *Melitaea trivialis* Schiff. Bei Rohrbach und am Ahörnberg vereinzelt, am Thebner Kogel und Hundsheimberg häufiger.

37. *Melitaea athalia* Rott. Im ganzen Gebiete, besonders in den Waldlichtungen des Rachsthurns, Wetterling und Ahornberg.

38. *Melitaea aurelia* Nick. Bei Theben-Neudorf an einem Sumpf auf Schilf sitzend, wenige Exemplare.

39. *Argynnis aphirape* Hb. bei Theben-Neudorf und Rohrbach nur vereinzelt.

40. *Argynnis selene* Schiff. Im ganzen Gebiete, besonders am Bradlo, Modrener Kogel und Ahornberg nicht selten, am Wetterling ziemlich häufig.

41. *Argynnis euphosine* L. im ganzen Gebiete verbreitet, jedoch überall nur vereinzelt auftretend.

42. *Argynnis hecate* Esp. bei Bösing, Modern und am Klokcava nur in wenigen Stücken.

Morpho! Morpho!

hecuba 6·50, amathonte 3·50, cypris 6·—, rhetenor 8·—, menelaus 3·50, nestira 6·50, anacibia 7·50, didius 4·50, granadensis 4·50, peleides 3·50, aega 2·—, epistrophis 1·—, hercules 2·—, amphitriion 8·—, adonis 6·—, eugonia 14·—, mettelus 14·—, papyrus 3·50, deidamia 3·50. **Agrias:** lugens 12·—, lugina 12·—, amydon 25·—, oedon 22·—, larsoni 50·—.

C. Zacher, Erfurt, Weimarische Str. 13.

Beliebtes Zuchtmaterial!!

Eier: *Agrotis decora* —50, *Rhod. fugax* 1·20, *Anth. yammamal* 1·— per Dtz. Spesen —20. Ausland doppelt! Vorzhlg. **Puppen:** *D. vespertilio* 7·50, *Pterog. proserpina* 7·50, *Ch. eipenor* 2·40, *ocelata* 1·80, *ligustri* 1·80, *Samia cynthia* 1·80 per Dtz. Spesen —50. Ausland doppelt! Vorzhlg. Tausch erwünscht! **Vertausche!** *Celerio* hybride *luciani* ♂♂-Puppen u. gleichviel la. gespannte ♀♀-Falter! und suche la. Puppenmaterial von *porcellus*, *gallii*, *euphorbiae*, *hypophae*, *populi*, *liliae*, *pinastri*, *pavonia*, *pyri*, hochwert. exot. Saturn.-Coc. und pal. Catocalen-Eier in Anzahl. Gef. Zuschriften erbeten an

Otto Muhr,

Wien XV., Mariahilferstr. 172.

Sikkim.

Offeriere 100 Falter mit *Pap. paris*, *ganeshia* und anderen guten Arten für nur Mk. 20·— (in Tüten).

Morpho in Tüten oder gespannt, la. *didius* 3·— bis 4·50, *menelaus* 2·— bis 3·50, *nestira* 6·50, *anaxibia* 3·50, ♀ 12·50, *deidamia* 1·50 bis 3·50, *elektra* 4·50, *peleidas* 2·— bis 3·50, *papyrus* 3·— bis 4·50, *hecuba* 4·50 bis 6·50, *adonis* 4·50 bis 5·50, *eugenia* 8·— bis 12·50, *metellus* 8·50 bis 14·—, *aega* 1·50 bis 2·—, *epistrophis* 1·—, *amphitriion* 5·— bis 8·50, *phokkildes* 3·50, *godarti* 4·50 bis 6·50, *rhetenor* ♂ 5·— bis 8·50, *cacica* 15·— bis 30·—, *diadema* 2·—, *portis* 2·—, *cytheris* 2·50, *cypris* 4·50 bis 6·50, *amathionte* 2·50 bis 3·50, *zepheritis* 15·—, ♀ nach Übereinkunft.

Prächtige *Agrias:* *lugens*, *lugina*, *narcissus*, *larseni*, *sahlkei*, *beata*, *amydon*, *sedon*. Preise auf Anfrage.

Prächtige *Coleopteren:* *M. longimanus* 3·—, *M. dejani* 5·—, *Euch. parryi* 6·50 M. 4 Wandschmuckrahmen mit *cypris*, *riphesus*, *longimanus* und *Laternenträger* Mk. 28·50.

Kallima inachis, grosser Blattnachahmer Mk. 3·50, ♂♀.

Leichte Zahlungsbedingungen.

C. Zacher, Erfurt, Weimarische Str. 13.

TAUSCH.

Habe zur Saison abzugeben: *Chr. virgaureae*, *Lyc. amanda*, *Chr. Hippothoe*. — Im Tausch oder Kauf geg. palaearktische Tagfalter. Angebote erbitte an:

Erich Kolebka, Berlin-Neukölln, Teupitzerstrasse 98.

43. *Argynnis daphne* Schiff. bei St. Georgen ein Pärchen in Kopula.

44. *Argynnis latonia* L. im ganzen Gebiete, stellenweise häufig.

45. *Argynnis aglaia* L. Im ganzen Gebiete, besonders in Waldlichtungen häufig, am Hundheimberg und Braunsberg bei Hainburg, an Disteln und Brombeerhecken gemein.

46. *Argynnis adippe* L. bei Rohrbach, St. Georgen, am Visoka, Thebner Kogel, Ahornberg, Rachsthurn, Wetterling, überall nur wenige Stücke.

47. *Argynnis paphia* L. Im ganzen Gebiete besonders häufig Gemsenberg bei Preßburg, Plateau des Thebner Kogels, bei St. Georgen und Rohrbach.

48. *Argynnis pandora* Schiff. In einer buschreichen Lichtung am Wetterling auf Brombeerblüten nur zwei Stücke.

49. *Melanargia galathea* L. im ganzen Gebiete mehr weniger häufig, am Braunsberg, Pfaffenberg, Hundheimberg, Gemsenberg und Wetterling an den sterilen Hängen gemein, ab *marginata* Metz., *aperta* Rbl., *fulvata* Lowe, *galene* Ochs. in Gesellschaft der Stammform, nicht häufig.

50. *Erebia edusa* F. am Plateau des Thebner Kogels, am Braunsberg, Gemsenberg, Wetterling, Rhachsthurn und Visoka, nicht häufig.

51. *Erebia aethiops* Esp. Thebner Kogel, besonders beim Klafterbründl sehr häufig, sonst im ganzen Gebiete minder häufig.

52. *Satyrus circe* F. Galgenberg bei Theben, Rohrbach, St. Georgen, Bösing, Rachsthurn, Ahornberg, Wetterling, Visoka nicht häufig.

53. *Satyrus hermione* L. Am Thebner Kogel, besonders in der Umgebung des Kaltenbründl häufig, sonst im ganzen Gebiete in buschreichen Waldlichtungen nicht häufig, am Ahornberg in einem ausgedehnten Holzschlag an den gefälltten Stämmen in großer Anzahl gefangen.

54. *Satyrus briseis* L. nur am Braunsberg, besonders zwischen den Felsen am Gipfel, ziemlich selten.

55. *Satyrus semele* L. Am Plateau des Gemsberges, bei Rohrbach, St. Georgen, Ahornberg, Wetterling, fliegt besonders gerne an sterilen Hängen.

56. *Satyrus arethusa* Esp. im ganzen Gebiete verbreitet, jedoch nicht häufig.

57. *Satyrus dryas* Sc. Galgenberg, Klafterbründl, Schwabenberg, bei Rohrbach, Bösing, St. Georgen, Modern nicht sehr häufig.

58. *Pararge megera* L. im ganzen Gebiete verbreitet, stellenweise ziemlich häufig.

59. *Pararge hiera* F. am Gipfel des Wetterling nur 1 ♂.

60. *Pararge achine* Sc. in den Auen bei Preßburg ziemlich häufig, sonst im ganzen Gebiete vereinzelt.

61. *Epinephele jurtina* L. Galgenberg, Schwabenberg, Klafterbründl, bei Rohrbach, Bösing, St. Georgen mehr weniger häufig.

Suche Ach. atropos

in Ia. u. II. Qualität im Tausche gegen schöne Exoten oder Paläarkt. Ex.

C. Zacher, Erfurt. Weimarische Str. 13.

Achtung!

Museen u. Sammler!

Ich erwarb geschlossen die wenigen Exemplare des neuen und herrlichen

Papilio stresemanni Roth. ♂ ♀

Zur weiskei Gruppe gehörig, jedoch von Ceram! In sup. Qualität!

Ansichtssendung bereitwilligst! Bestellg. bald erbeten, da Ausbeute sehr klein.

Herm. Wernicke, Inh. H. Koltsch,

Dresden-Blasewitz,

Jüngststrasse 19 (früher Südstrasse)

Agrotinae.

Kaufe jederzeit einzeln oder in Anzahl mir erwünschte paläarktische Agrotinae. Suche besonders Asiaten, Vorderindien und Hinterindien ausgeschlossen.

Porto für Offerten wird vergütet.

Dr. A. Corti, Fabrikdirektor, Dübendorf (Schweiz).

Achtung!

Wichtig für Museen u. Sammler!!

Nur solange Vorrat reicht, biete ich die bis jetzt, unter Mithilfe bedeutender Entomologen, bearbeiteten Schmetterlinge (Tagfalter, Schwärmer u. Spinner) sowie Hymenopteren und Hemipteren der **Stoetznernschen Ausbeute** aus der Provinz Szetschwan und Pecking an. Listen gegen Voreinsendung von 10 Pf.

J. Draesecke, Dresden-Blasewitz,

Berggartenstr. 38 II.

Lepidopteren-Liste Nr. 58

(110 Seiten) mit 15.000 pal. u. 12.000 exot. Lepidopteren . . . Mk. 2.—

Coleopteren-Liste Nr. 30

(160 Seiten) mit 30.000 Col. Mk. 2:50

Liste VII über diverse Insekten

(62 Seiten) mit 3.200 Hym., 2.400 Dipt. 2.200 Hemipteren, 600 Neuropterer und 1.100 Orthopteren . . . Mk. 2:50

Alle Listen sind mit vollständigem Gattungsregister und eignen sich gut zu Sammlungsverzeichnissen.

Versand gegen Voreinsendung (auch in Briefmarken).

Liste XII, enthaltend Lose zu sehr billigen Preisen, Bücher-Offerte etc. auf Wunsch gratis.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas,
Dresden-Blasewitz.

62. *Coenonympha oedippus* F. bei Theben-Neudorf ein Exemplar auf Schilf sitzend.
63. *Coenonympha iphis* L. in einer Waldlichtung unterhalb des Rachsturn Gipfels, nur zwei Stücke.
64. *Coenonympha arcania* L. im ganzen Gebiete verbreitet, ziemlich selten, nur in den Lichtungen des Schwabenberges häufiger.
65. *Coenonympha pamphilus* L. im ganzen Gebiete sehr häufig.
66. *Coenonympha tiphon* Rott. desgleichen in ganzen Gebiete verbreitet, jedoch weniger häufig.
67. *Nemeobius lucina* L. im ganzen Au- und Waldgebiete sitzt besonders gerne in Waldlichtungen auf Klafterholzstößen.
68. *Tecla spini* Schiff. Am Thebner Kogel, Gemsenberg, bei Rohrbach, Bösing, St. Georgen nicht häufig.
69. *Tecla ilicis* Esp. im ganzen Gebiete jedoch nur vereinzelt
70. *Thecla pruni* L. bei St. Georgen ein ♂.
71. *Callophrys rubi* L. im ganzen Gebiete mehr weniger häufig, bei Theben-Neudorf gemein.
72. *Zephyrus quercus* L. Thebner Kogel, Gemsenberg, bei Rohrbach und St. Georgen, nicht häufig.
73. *Zephyrus betulae* L. am Pfaffenberg und bei Modern nur wenige Stücke.
74. *Chrysophanus virgaureae* L. im ganzen Gebiete verbreitet, stellenweise häufig.
75. *Chrysophanus hippothoe* L. bei Theben-Neudorf und Rohrbach nur wenige Stücke.
76. *Chrysophanus phlaeas* L. im ganzen Gebiete verbreitet, an sterilen Hängen bisweilen sehr häufig.
77. *Chrysophanus dorilis* Hufn. am Pfaffenberg bei Rohrbach, St. Georgen, am Plateau des Thebner Kogels nicht häufig.
78. *Lycaena telicanus* L. bei Hainburg und Modern je ein Exemplar,
79. *Lycaena argiades* Pall. bei Rohrbach, Bösing und am Gemsenberg nur wenige Stücke, unterhalb des Bradlo in einiger Anzahl.
80. *Lycaena argus* L. im ganzen Gebiete verbreitet, jedoch nicht häufig.
81. *Lycaena argyrognomon* Bergstr. bei Bösing und Modern nur vereinzelt.
82. *Lycaena eumedon* Esp. nur bei Theben-Neudorf in wenigen Stücken gefangen.
83. *Lycaena eroides* Friv. bei St. Georgen ein stark beschädigtes Stück.
84. *Lycaena icarus* Rott. im ganzen Gebiete häufig, stellenweise gemein.
85. *Lycaena hylas* Esp. Braunsberg bei Hainburg 1 Exemplar.
85. *Lycaena bellargus* Rott. Braunsberg, Pfaffenberg, Rohrbach, St. Georgen, Bösing und Modern nur vereinzelt.

(Fortsetzung folgt).

Diverses.

Hoffmanns Entomologen-Adreßbuch gelangt im Oktober zur Ausgabe!!

Wer noch nicht bestellte, hole dies umgehend, nach, da bis 15. Oktober noch der Subskriptionspreis von Mark 10.— gilt. ———

Nach Erscheinen Mark 12.50.

Abgebbare Literatur:

- Ganglbauer**, Käfer Mitteleuropa Bd. I, II, III. Origbd. Mk. 60.—
- Reitter**, Fauna germanica, Bd. I—V. Mk. 25.—
- Tümpel**, Geradflügler, II. Aufl. Origbd. Mk. 20.—
- Seidlitz**, Fauna Transsilvanica. Gebd. Mk. 15.—
- „ Fauna baltica. Gebd. Mk. 25.—
- Junk-Schenkling**, Cat. Coleopt. Priornini, Cerambycini, Lamini, neu in 2 Bänden, gebd. Mk. 120.—

Angebote unter J. B. an die Exped. des Entom. Anzeiger.

Riesenlager

von
palaearktischen und exotischen
Lepidopteren,
palaearktischen und exotischen
Coleopteren
und
Vogeleierschalen.

Preise billigst!!

Liste über palaearktische und exotische Coleopteren gratis.

Ankauf. Tausch.

A Kricheldorf,
Naturwissenschaftliches Institut
Berlin S. 14, Sebastianstr. 63.

Notice for american entomologists

Exclusive Agency for „Hoffmann's Entomologist's Directory for United States of North America, British North America and Possesions. For the convenience of Entomologist's and others, they may order the Directory direct at the

Collectors Supply House
Box 307

Callahan, Florida, U. S. A.

In regards to advertiments in the Directory please write to the same firm which will render prompt service.