

Eine coleopterologische Reise nach Mittel-Dalmatien im Juli 1924.

Von Direktor Prof. Jan Roubal.

(Fortsetzung.)

Chrysomelidae.

Crioceris paracentesis L., Sp, So. — *Coptocephala Küsteri* Kr., Sp, h. — *C. K. a. plagioccephala* F., Ms. — *C. K. a. inornata* Fleisch., Ms, 1 Ex. — *Cryptocephalus 3-maculatus* Rossi, von Punicasträuchern. — *C. pygmaeus* F., Ms, an Gras. — *C. fulvus* Goeze a. *signaticollis* Scop., Ms, Mr. — *C. f. a. succinctus* Weise (a. *apricus* Wse.), Ms. Alle an niederen Pflanzen. — *Galeruca litoralis* F., So, s. h., an Felsen. — *G. laticollis* R. Sahlb. v. *Villae* Joann., mit voriger, nach Reitt. Cat., 1906: I. — *Podagrica fuscipes* L. Sp. — *Ochrosis ventricosa* Illig., Mr, an niederen Gewächsen, n. h. — *Chaetocnema aridella* Payk., So, nur Nominatform (am Plateau die s. *herzegovinensis* Hktg.). — *Psylliodes pyritosa* Kutsch., Mr, 1 Ex. gestreift. — *Haltica quercetorum* Foudr., Gr, Eiche. — *Aphthona flava* Guillb. oder sp. n.(?), Mr, 2 Ex. — *A. nigriceps* Redtb., Mr, von niederen Pflanzen gestreift, h. — *A. cyanella* Redtb., Mr, Gr, auf *Euphorbia cyparissiae*, h. — *A. euphorbiae* Schrank., Mr, dto. — *Longitarsus obliterated* Rosh., Mr, h. — *L. o. a. meridionalis* Wse., Gr, mit Bezug auf Reiters Catal., 1906 nur von Hi., Ca., neu für D. — *L. pratensis* Panz., Mr, h. — *L. exoletus* L., dto. — *L. pellucidus* Foudr., Mr, Gr. — *Agropus Ahrensi* Germ., So, vereinzelt. — *Hispia testacea* L., Sp, an Felsabhängen am Gesträuch, abends. — *Hippocassida subferruginea* Schrank, Mr, h.

Lariidae.

Spermeophagus sericeus Geoffr., Sp, Ms, Gr, h. — *Bruchidius nanus* Germ., Sp. — *B. bimaculatus* Oliv., Sp, Gr. — *B. foveolatus* Gyll., Gr. — *B. perparvulus* Boh., Sp, Ms, mit den Fühlerwurzeln oben schwarz oder gelb. — *B. sericatus* Germ., Gr, 1 sehr kleines Ex. — *B. pusillus* Germ., Sp, Ms. — Alle an Rainen, in Gärten an niederen Pflanzen.

Anthribidae.

Tropideres curtirostris Rey, Mr, an Sträuchern.

Curculionidae.

Phyllobius brevis Gyll. a. *cinereipennis* Gyll., Ms, s. — *Sciaphobus barbatulus* Germ., Sp, Gr. — *Sitona crinita* Hbst., h. — *Thyllacites lapidarius* Gyll., Ms. — *Leucocleonus pedestris* Podar

Ms. — *Lixus punctirostris* Boh., Sp, 1 Ex. — *L. elegantulus* Boh., Ms, 2 Ex. — *Larinus latus* Hbst., So. — *Larinus* 3 weitere sp. — *Bagous glabrirostris* Hbst., Sp, unter Meerestang. — *Mesites curvipes* Boh., Tu, in einer alten Weide, Ms, 2 Ex., ♂. Nach Reiters Catal., 1906 Ga., I. b. — *Tychius tibialis* Boh., Ms. — *Orchestes pratensis* Germ., Ms, von Gras gestreift. — *Mecinus circulatus* Mannh. v. *horridus* Desb., Gr, 1 Ex. — *Miarus longirostris* Gyll., Ms. — *Rhynchites praeustus* Boh., Sp, mit *Hispa testacea*.

B. Biokovo-planina.

Bezüglich der weiter zitierten Arten sei im allgemeinen bemerkt, daß die Planticola an den dürftigen Pflanzen der zum Meer geneigten felsigen Abhänge, die Humicola am Plateau in zahlreichen Schluchten, tiefen, humusreichen Dolinen, Abgründen, auch unweit vom Höchstgipfel Sveto Juro, wo sich ausgedehnte Buchenbestände befinden, erbeutet wurden. Abweichungen davon sowie nähere Bezeichnungen der Lokalitäten etc. werden bei den betreffenden Formen angegeben.

Carabidae.

Carabus caelatus F. s. *dalmatinus* Duft. in einer humusreichen Schlucht unter einem Stein, 1 kleines Ex. — *Calosoma inquisitor* L. ebenda, tot. — *Trechus obtusus* Er., s. h. (Cf. Roubal, W. E. Ztg. XLII, 1925, 48. — *Duvalites biokovensis* Holdh., ebenda, s. h. — *Harpalus punctulatus* Duft., *atratus* Latr., *sulphuripes* Germ., der letztere in der Größe sehr variabel und mit verschiedenfarbigen, auch veilchenblauen Decken und bei größter Hitze an Felsenblöcken herumlaufend. Alle 3 an dünnen Felsenabhängen. — *Molops bucephalus* Dej., h., *obtusangulus* Ganglb. v. *svilajensis* J. Müll., 2 Ex., neu für das Biokovo, *biokovensis* J. Müll., alle 3 in schattigen Dolinen. — *Laemostenus dalmatinus* Dej. (cf. die Note bei *Trechus obtusus*). — *Lebia crux minor* L. an einem Buchenstrauch. — *Aptinus acutangulus* Chaud. mit *Laemostenus*, n. s.

Hydrophilidae.

Cercyon haemorhoidalis F. im Mist. — *Helophorus granarius* L. v. *griseus* Hbst. in einer Doline.

(Fortsetzung folgt.)