

dissecticeps Roub. und *hippophæes* auf. Die Decken sind dicht punktiert, die Tendenz zur Reihung der Punkte in der hinteren Hälfte sehr schwach, die Räume zwischen den Punkten auffallend eben. Länge 3·2 mm (weit größer als meine Ex. von *Karamani*, die ich von Dr. Karaman besitze). Von niederen Pflanzen gekätschert, 1 Ex. Ich erlaube mir die Art Herrn D. A. Ogloblin-Poltava (Ukrajina), meinem lieben Kollegen in Studium der *Halticinen* zu widmen. — *Ochrosis ventricosa* Illig., s. — *Minota obesa* Waltl. f. *Halmae* Apflb. ? ein sehr auffallendes Ex., das ich mangels weiteren Materials vorläufig hierherstelle. Es ist nicht groß, breit gerundet (Heikertinger in Soc. Ent. XXVII, 61), sondern nur wenig länger als *obesa nivalis* Apflb., nicht breit gerundet, die Decken sind auffällig flach, lang und auffällig stark nach hinten verengt zugespitzt. Der kurze Halsschild seitlich ganz gut sichtbar gleichmäßig gerundet, keineswegs vom ersten Drittel nach vorne hin mehr verengt, die Punktierung der letzteren stimmt mit der Beschreibung der f. *Halmai*, die Basalstricheln sind sehr kurz. Die f. *Halmai* stammt von Bos. austr. — *Chaetocnema aridella* Payk. (*hortensis* Foudr.) s. *montenegrina* Hktg., V. z. b. G. Wien, LXII, 1912, 44—45, 10 übereinstimmende, schön goldmetallisch glänzende Ex. Neu für D. — *Aphthona flava* Guill. ? oder sp. n. — *A. nigriceps* Redtb., h. *Longitarsus gracilis* Kutsch. — *L. atricillus* L. a. *similis* Wse.

Lariidae.

Bruchidius perparvulus Boh.

Curculionidae.

Otiorrhynchus 5 sp., wohl jene, die Hoffmann im Ent. Anz. l. c. anführt. — *Apionen* noch nicht bearbeitet.

Eine neue *Morphocarabus*-Rasse aus Ungarn.

Morphocarabus Scheidleri-pannonicus var. *Gebhardti* Bodemeyer.

Von B. v. Bodemeyer, Berlin.

Diese Form des *pannonicus* ist in Form und Färbung der Stammform *pannonicus* gleich. Sie unterscheidet sich im habitus durch kleinere, schmalere Körperform. Als charakteristisch ist zu nennen: Die Streifen zwischen den Intervallen sind feiner, regelmäßiger und deutlicher punktiert, es sind deutliche Körnerreihen, die bei *pannonicus* verwischt erscheinen, meist querrunzelig punktiert, oft ziemlich verworren. Herr Staatsanwalt Dr. A. v. Gebhardt sandte mir eine Reihe dieser interessanten Lokalform aus Dombóvár (Ungarn) ein.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Bodemeyer Wilhelm Eduard Leopold Bodo von

Artikel/Article: [Eine neue Morphocarabus-Rasse aus Ungarn.
Morphocarabus Scheidleri-pannonicus var. Gebhardti Bodemeyer. 75](#)