

# Über die Coleopterenbiocoenose des faulenden Stroh im Winter.

Von Dir. Jan Roubal.

(Fortsetzung.)

**Orthoperidae.** *Sericoderus lateralis* Gyll. ist hier an seiner Stelle, h., I, IV.

**Ptiliidae.** *Ptenidium Gressneri* Er., s., I, ein interessanter Fund der baummulmliebenden Art. — *P. pusillum* Gyll., II, IV, h. — *Ptilium modestum* Wankow., II (2 Exemplare), IV (sehr h.), VIII (ungemein h.). Meistens ohne Spur jeder Furche auf dem Halschild. Sehr interessant ist das massenhafte Vorkommen dieser raren Art, die z. B. in Reitters F. G., II, 269, nur von Königsberg in Deutschland angeführt ist. — *Oligella foveolata* Allib. IV, s. h., eine bekanntlich seltene Art der Jäte und trockenen Duges. — *Nephanes Titan* Newm. V, s. h. — *Acrotichis grandicollis* Mannh. V, h., außerdem drei weitere Arten.

**Staphylinidae.** *Micropeplus Marietti* Jacqu. I, II, III, VII, ein häufiger und typischer Bewohner. — *Acrolocha striata* Grav. I, III. Ausgezeichnete Komponente der Donaugegenden, geht nördlich bis zur B. Bystrica. — *Phyllodrepa nigra* Grav. II, *floralis* Payk. I, II, beide sind hier an ihrer Stelle. — Die gemeinen *Omalium rivulare* Payk. und *caesum* Grav. I bis VIII häufig. — *O. excavatum* Steph. I, III, VIII, eine seltenere Erscheinung. — *Xylodromus depressus* Grav. I und der sehr häufige *concinus* Marsh. III, VIII, waren hier zu Hause. — *Oxytelus rugosus* F. I, *nitidulus* Grav. VII, *complanatus* Er. VII. — *Stenus clavicornis* Scop. II, *providus* Er. I, *circularis* Grav. I, V, *humilis* Er. I, VIII, *brunnipes* Steph. III. — Winterquartier finden hier *Paederus limnophilus* Er. I und *litoralis* Grav. I, II, VI. — *Astenus angustatus* Payk. II. — *Stilicus similis* Er. I, II. In IV auch ein Exemplar mit auffallend viel kürzeren Schläfen als sie die Exemplare aus I und II haben. — *Medon melanocephalus* F. I, h., *obscurellus* Grav. V, s. h. — *Lathrobium longulum* Grav. II. — *Leptacinus parumpunctatus* Gyll. V, h., bekanntlich eine rare Art. — *L. bathydrus* Gyll. I, II, V, h., *linearis* Grav. I, V, s. — *Xantholinus angustatus* Steph. I, V, *linearis* Ol. I, II, V, h. — *Gauropterus fulgidus* F. V, ein Exemplar. *Othius punctulatus* Goeze I, h., eine mehr die ursprünglichen Waldlaubschichten liebende Art.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Über die Coleopterenbiocoenose des faulenden Stroh im Winter. 63](#)