

## Genus *Syntomis* O. im zirkum-adriatisch-tyrrhenisch-ligurischen Gebiete.

Von H. Stauder.

Mit 5 Textabbildungen.

(Schluß)

- phegea orbiculifera* Zerny aberr., vielleicht identisch mit der folgenden?
- *aberr.* Hafner, Groß-Schmett. Krains, pp. 202, 237, t. 2, f. 127; Type aus Krain; in Istrien mehrfach festgestellt.
  - *seminigra* Spul. aberr. ubique; im Gebiete mit Trs. nicht so selten.
  - *puellula* Stdr. aberr. mit fehlendem vorderen Hinterleibsring; Trti.: Ital.
  - *semidiafana* Trti. aberr. alle Makeln zusammengeflossen, wohl rarissimum! Von mir nie beobachtet. Trti.: Ital. (l. c. p. 215/39).
  - *monosignata* Trti. aberr. (l. c. aberr. 215/39, t. A, f. 6). Vflgl. vollfleckig, Hflgl. nur mehr mit dem Mfleck. ubique! In Illyrien sehr häufig, namentlich in Übergängen zu *phegeus* und *pfluemeri*.
  - *iphimedia* Esp. ubique aberr., praec. Regio medit., Triest 2 ♂♂ coll. m., aberr. rarissima! f. trs. frequentiores; ob nicht mehrere der adr.-tyrrh.-appenn. Funde (der Größe der Individ. wegen) anderen Arten (*ragazzii*, *kruegeri*, *marjana*) zuzuschreiben sind?!

### II. *Syntomis ragazzii* Trti.

- ragazzii ragazzii* sp., loc. class. Castellamare Stabia, 50—900 m. Wird wohl noch aus vielen anderen Orten Italiens gemeldet werden. In Anzahl von der sorrent. Halbinsel in coll. mea.
- *repicta* Trti. aberr. lux. (Analogon zu *phegea ornata* Skala.) Mir nur 1 ♀ vorliegend. Trti.: ex loc. class. (l. c. 218/42, t. B, f. 18).
  - *pfluemerooides* Trti. aberr. (l. c. p. 218/42, t. B, f. 15 und 16). Vflgl. wie bei *phegea pfluemeri*, Hflgl. normal gefleckt (1 oder 2 Makeln); nicht selten; e loc. class. mehrf. in coll. mea. Trti.: loc. class.
  - *phegeusida* Trti. aberr. (l. c. p. 218/42, t. B, f. 17). Vflgl. vierfleckig, Hflgl. mit sehr kleiner Präapikalmakei.

- *pseudoclelia* Trti. aberr. (l. c. p. 218/42, t. B, f. 14). Vflgl. ohne oder bis zu 3, Hflgl. mit nur einer (sehr kleiner) Basalmakel; wohl sicher zu *herthula* Stdr. gehörig!
- *mendax* Stdr. }  
 — — *pfluemeroides* Trti. }  
 — — *phegeusida* Trti. } Beschreibung unter A.  
 — — *inversa* Stdr. }  
 — — *reinstalleri* Stdr. }  
 — *pseudomarjana* Stdr.  
 — *decadica* Stdr.

### III. *Syntomis herthula* Stdr.

*herthula* (f. *aeticola*) *salticola* Stdr. loc. class. von etwa 1600 bis 1900 m Aspromonte, Montalto, Ende Juni, Anfang Juli, nicht häufig; in niederen Lagen seltener als aberr.

- — *tenera* Stdr. Extrem von *salticola* mit winzig kleinen Makeln.
- — *warneckei* Stdr. mit fehlender Basalwinkel.
- — *tenera warneckei* Stdr., selten;
- — — *phegeulus* Stdr., nicht selten;
- — — *pseudoclelia* Trti.; selten.
- — *turbidepicta* Stdr. selten.
- — *cuprea* Stdr. selten.
- — — *felkeli* Stdr. selten.
- — — trs. *philippsi* Stdr. selten.
- — *posticeprivata* Stdr. selten.
- — *tenera posticeprivata* Stdr. selten.
- *silvatica* Stdr. (Form der Ölbaum- und Kastanienregion.)
- — *tenera* Stdr., seltener.
- — *warneckei* Stdr. nicht so selten.
- — *phegeulus* Stdr.
- — *pseudoclelia* Trti.
- — *feuerherdti* Stdr.
- — *biga* Stdr.
- — *posticeprivata* Stdr.
- — *felkeli* Stdr.
- — *seminigroides* Stdr.
- — *philippsi* Stdr.
- — *puellula* Stdr.

*herthula silvatica marjanoides* Stdr.

— — — *warneckei* Stdr.

— — *repicta* Stdr.

— — *marjanoides repicta* Stdr.

— — *luetkemeyeri* Stdr.

— — — *marjanoides* Stdr.

— — — — *repicta* Stdr.

— — *danieli* Stdr.

— — *turbidepicta* Stdr.

— — *danieli turbidepicta* Stdr.

— — *cuprea* Stdr.

Sämtliche Typen in coll. mea.

#### IV. *Syntomis marjana* Stdr.

*marjana marjana* sp. (= *quercii* Ver.) loc. class. Monte Marjan bei Spalato. Monti Sibillini, Susa in Oberital. Sizilien (Palermo). Triest, Salvore (Istr.), Insel Lussin (Trti.). (Wird wohl gewiß noch vom Balkanlitorale, Griechenland, griech. Inseln und vielleicht auch der kleinasiatischen Küste später gemeldet werden.)

— *repicta* Trti. aberr. frequ. in ♀, rara in ♂; Analogon zu *phegea ornata* und *ragazzii repicta*. Ital., Siz., Dalm., Triest, Salvore. (l. c. p. 217/41, t. B, f. 4—7.)

— *parvipuncta* Trti. (l. c. p. 217/41) alle Makeln kleiner; sehr selten unter Stücken e loc. class.; Trti.: Italien.

— *kammeli* Stdr. aberr. (vide unter C dieser Arbeit);

— *quadriga* Stdr. " ( " " " " " );

— *bimaculata* Stdr. " ( " " " " " );

— *rebeli* Stdr. " ( " " " " " );

— *puellula* Stdr. " ( " " " " " );

— *cerberus* Stdr. " ( " " " " " );

sowie die weiters unter C beschriebenen Aberrationen und Gynandromorphismen.

#### V. *Syntomis kruegeri* Ragusa.

*kruegeri kruegeri* sp., loc. class. Siz.; vom Festlande nicht bekannt.

— *phegeoides* Trti., aberr. Makel 1 und 3 der Vflgl. zusammenfließend.

— *evanescens* Trti., aberr., Flecken 4, 5 und 6 völlig oder nahezu verdunkelt (t. B, f. 10!).

— *cyclopea* Ragusa, aberr.; alle Sizilien:

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Genus Syntomis O. im zirkum-adriatisch-tyrrhenisch-ligurischen Gebiete. 10-12](#)