download unter www.biologiezentrum.at

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Dyschirius Wagneri Müll.

Exakt cylindrisch, wenig schlank, Habitus des *pusillus* oder etwas breiter, Fld.-Streifen wie bei diesem punktiert. Hsch. nicht länger als breit, hinten deutlich erweitert, nach vorne fast geradlinig verengt. Clypeus herzförmig zugespitzt, in ein kleines Stirnkielchen ausgezogen, davor quer eingedrückt oder von einer regelrechten Querfurche durchsetzt. Fldbasis um die Schulter zart gerandet, ohne Basalhöckerchen. 3 Dorsalpunkte, 1 Präapical- und 2 Posthumeralgrübchen. Vdschienen außen scharf gezähnt, der Enddorn deutlich nach außen gerichtet. Fühler bei ausgefärbten Stücken schwärzlich mit rötlichgelber Basis. Sardinien. Kol. Rundschau X, 49, 96.

Dyschirius pseudoextensus Fleisch.

ssp. ***Karamani*** Müll. Körperform wie *macroderes*. Hsch. deutlich gestreckt, erheblich länger als beim typ. *pseudoextensus;* hinten kaum erweitert, Flgd. gestreckter, grünlich bronzefärbig, die inneren Streifen scharf eingeschnitten, nicht deutlich vertieft, in der Regel 2 Präapical- und 3 Posthumeralgrübchen. Clypeus hinten meist durch zwei stumpfwinkelig zusammenstoßende Schrägfurchen begrenzt, knapp vor denselben oft quer eingedrückt. Enddorn der Vdschienen fast gerade oder schwach nach innen gekrümmt. An der Basis desselben ein spitzes Außenzähnchen. Dalmatien: Spalato. Kol. Rundschau X, 49, 101.

Bembidion (Bracteon) striatum F.

ssp. ***maurum*** Netol. Färbung dunkler als Nominatform. Erstes Fühlerglied nur auf der Unterseite heller gefärbt, Beine bis auf einen leichteren Schimmer in der Mitte der Schienen des zweiten Paares metallisch schwarz. Ponferado. Kol. Rundschau VII, 19.

Bembidion (Plataphodes) Haeneli Netol.

Schulter winkelig, Basalrand zieht gerade vom Schultergipfel bis zum Beginne des vierten Strerfens. Hsch. gewölbter, an den Seiten weniger abgeflacht, keine deutlichen Querrunzeln ziehen zum Hinterwinkelfältchen wie bei *Fellmanni.* Die Mikroskulptur der noch feiner gestreiften, stärker gewölbten Fld. besteht aus viel enger gestellten Netzmaschen. Hohe Tatra: Csorba-See. Kol. Rundschau VII, 26.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. (Col.). 63