

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung.)

795. *consolidata* Led. Skala Stud.: Dalmatien, Bosn. Herzeg. Juni, Juli und September. Zengg 12. III. ein frisches ♂ (Dobiasch, zool. Bot. 1912, p. 142); Mitteldalmatien (Mn.); Spalato, einige Stücke im Museum Wien, ohne Datum (vid. Lbl.); Kučiste, Mitte Mai und Ende Juni und wieder im August (Werner); zwischen Mostar und Blagaj 18. VII. (Schaw. B. H. VIII).

Auch in Kärnten (?), Griechenland; orientalisches.

796. *metohiensis* Rbl. Zengg 7. VI. (Rbl.) und Anfang Juli (Dobiasch); Bišina, Gacko Juli 1917 e. l. (Schaw. B. H. V); Gacko (türkische Metohia), Prenj (Podasje) 1300 m 31. VII. Licht, Nevesinje 20. VII. mehrfach am Licht; Lakat, 21. VII. (Rbl.). Die Flugzeit dieser Art ist demnach Mitte bis Ende Juli, ihre Fundorte zwischen 350 m und 1300 m. Der Falter geht sehr gerne ans Licht (Rbl. B. H. Stud. II, p. 249).

Die Art ist als Vertreterin der westmediterranen *cervantaria* Mill. anzusehen. Balkanform.

797. *camparia* H. S. Eine östliche Art, die bis Dalmatien reicht, Juni, August. Mitteldalmatien (Mn.); Gabela (südl. Herzeg.). 1. V. (Rbl. Stud. II). Inselfunde: Lussin (Lussingrande 7. IX. und Neresine 6. IX.) (Galv.), Lissa (Comisa) Ende Mai und 29. VIII. am Licht (Galv. B. A. I.). Lissa Ende Mai und Anfang Juni, Licht (Galv. Dalm. Ins.). Orientalisch.

798. *sodaliaria* H. S. B. Rbl. IX: südl. Krain, Istrien, Fiume Mai, Juni und August, September. Bei Wippach und in der Görzergegend, wo Epheu an Mauern und Felsen wächst; Rp. an Epheu auf der Unterseite der Blätter (Mn. Kstld.); Napoleonstraße Opčina-Prosecco, 10. VI. selten (Bohatsch); Lovrana 9. IX. 1 ♂ an Felsen.

(Rbl. M. M. II); Fiume Mai, Juni (Mn.); Mte. Marjan bei Spalato, sehr gemein 12.—20. V. (Stdr.); Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Kosore 7. IX. (Miller); Kučiste Mai, Juni in Gärten häufig an Blättern sitzend (Werner); Gravosa Ende Juni Licht (Galv.); Mostar 29. IX. und 3. X. (II. Gen.) (Schaw. B. H. XI). Jablanica, Stolac 20. V. bis 5. VI. und Lastva (Rbl. Stud. II).

Inselfunde: Lussingrande Mitte Juni (Galv. Ausb. Lussin, zool. bot. 1916); Lissa Ende Mai, Anfang Juni am Licht (Galv. Dalm. Ins.).

Sonst auch aus Mehadia und Makedonien bekannt, in Dalmatien sehr verbreitet, wird häufig mit der vorigen Art verwechselt; Balkanform.

799. *virgularia* Hb. Im ganzen Gebiete verbreitet, gegen den Süden seltener werdend, fehlt in der Herzegowina, in Bosnien nur aus Dervent (Nennform) bekannt. Sehr variabel, meist in den Südformen *australis* Z. und *canteneraria* B., welche letztere nur eine Zwergform von *australis* Z. darstellt.

Wippach f. *obscura* Mill. (Hafn. F. Kr.); Wippach (*australis* Z.) Mai an Mauern (Mn. Kstld.); daselbst auch 28. IV. *obscura* (Wagner); Görz, in der Dämmerung fliegend, dann im Epheu, am Köder und Licht angetroffen Mai bis September, darunter nicht häufig *obscura* (Hafn. F. Görz); Triest, Villa Muratti Ende Mai, Anfang Juni, Nennform und *australis*, auch *canteneraria*; ebenda, *australis* 11. IX. (Mus. Wien); diese Form auch aus Pola, Mitterburg, Triest (Galv.); Sesana 20. VIII. Nennform; 22. V. *obscura*, ziemlich häufig am Licht (Lbl.); Abbazia *australis* an der Küste sehr häufig (Rbl. M. M.); *canteneraria* aus Abbazia Mitte Juni; Mattuglie 20. V., Lovrana August (Rbl. M. M. I); f. *australis* Lovrana und M. Maggiore-Haus 2. VII. (Schaw. M. M.); Nennform um Abbazia 9. VI., 6. VIII., 9. IX. aus Gebüsch an der Reichsstraße (Gbl. M. M. II); Portorose (Istrien) die ♀ f. *hauderi* Kautz (H. Kautz in zool. Bot. 1913, p. 57/58); Fiume Mai, Juni (*calcearia* H. Sch. = *australis* Z.) (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (*virgularia*, *australis* und *canteneraria*, Mn. 3 R. Dalm.); Kučiste (*obscura*) Mai, Juni (Werner); Spalato *canteneraria* 7. V. (Stdr.).

Inselfunde: Brioni Mai, diese neigen mehr zur Nennform; *australis* Anfang September, häufig bis Oktober (Rbl.); auch 12. X. (Rbl. Brioni I); Sansego, Lussin 11. IX. und San Andrea 23. VIII. Nennform und *australis*, Lussin (Val oscura) *canteneraria* April (Galv. B. A. I.); Meleda 10.—12. IV., Lissa Ende Mai (Nennform

und *australis*) am Licht, Lagosta, ebenfalls beide Formen, nicht selten am Licht, *Pelagosa grande (australis)* (Galv. Dalm. Ins.).

Sonst aus Kärnten, Slavonien, Banat, Siebenbürgen; mediterran.

800. *pallidata* Bkh. Črna Prst Gipfel 25. VI. (Hafn. F. Kr.); Podbrdo 14. VI. sehr häufig; Wochein-Feistritz (Krain) 2. VI. (Stdr.); auf dem Nanos in Buchen- und Haselgebüsch, des Abends geflogen (Mn. Kstld.); Triest, Fa. Vogel (Carr.); bei Volosca Juni (Mn. Fiume); auf Sumpfwiesen auf dem Mte. Maggiore (Rbl. M. M.); Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Klinje 9. VI., Vucija baza Anfang Juni (Schaw. B. H. IX).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien (lokal), Banat, Siebenbürgen; sibirisch.

801. *subsericeata* Hw. B. Rbl. IX: südl. Mitteleuropa Mai, Juni und August lokal, nicht häufig.

Auf dem südl. Nanosabhang bei Gradišče Anfang Juni aus Rosenhecken gescheucht, selten (Mn. Kstld.); Kronberg 28. V. ein Stück aus Brombeergebüsch, Hudajužna 17. V. ein Stück (Stdr.); am Isonzoufer, nicht häufig, Mai, Juni, Falter der II. Generation im August sind im allgemeinen kleiner, ein Stück 9. VIII. am Köder (Hafn. Görz); Pola Juli (Klos); Abbazia, Mattuglie, Ende Juli, Anfang August (Rbl. M. M. I); Abbazia 9. VI., 4. VIII. aus Gebüsch an der Reichsstraße (Rbl. M. M. II). Fiume (*asbestaria* Z.) Mai und Juni (Mn. Fiume); ebenda 8. VI. (Mändl); Mitteldalmatien (Mn.); Spalato 8. V. (Mus. Wien). Mostar 8. IX. II. Gen.? (Schaw. B. H. XI); Jablanica und Tassovič bei Capljina September (Rbl. Stud. II). Insel Brioni 2.—17. V. und August am Licht (Rbl. Br. gr.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Serbien, Banat (aus Bosnien noch nicht nachgewiesen); orientalisches.

802. *straminata* Tr. Oberfeld bei Wippach 11. VI.; Mojstrana 8. und 17. VII. (Hafn. F. Kr.); hinter Oberfeld Mitte Juni nach Sonnenuntergang sehr nahe am Boden geflogen, selten (Mn. Kstld.); Carrara erwähnt in seiner Liste die Art von Triest (sehr zweifelhaft, Stdr.); um Abbazia (Rbl. M. M. II). Mitteldalmatien **I** (Mn.).

In den nördlichen Nachbarländern nachgewiesen, auch aus Italien bekannt; orientalisches.

803. *laevigata* Scop. Wochein-Feistritz 6. VIII., Radmannsdorf 4. VII. (Hafn. F. Kr.); Mitteldalmatien (Mn.). B. Rbl. IX: südliches Mitteleuropa, lokal Juni, Juli und September. Spalato, ohne Datum (Museum Wien). Lakat 21. VII. frisches Stück (Rbl. Stud. II).

Ist auch in Kroatien-Slavonien, Siebenbürgen nachgewiesen worden; orientalisches.

804. *extersaria* H. S. Bei Buccari Mai selten (*efflorata* Z.) (Mn. Fiume). Nach Skala auch aus Kroatien (Carlopage) bekannt; mediterran.

805. *infirmaria* Rbr. Skala Stud.: Dalmatien Juni, Juli und September. Mitteldalmatien (Mn.).

Sonst in Südwesteuropa; mediterran.

806. *obsoletaria* Rbr. Nanosabhang (*rufilaria* H. S.) Ende Juni ein Stück (Mn. Kstld.); Wippach Juli häufig in Hecken (Hafn. F. Kr.); Abbazia, überall häufig (Rbl. M. M.); Pola Juli (Klos); Mitteldalmatien (Mn.); Kučiste, einzeln im Juli (Werner). Belegstücke im Museum Wien aus Spalato, Ragusa, Insel Brazza.

Lastva 20. VIII. (Schaw.); Radobolje, Konjica 18. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch aus Kroatien, Banat, Bosnien, Griechenland bekannt; orientalisches.

807. *incarnaria* H. S. B. Rbl. IX: Südeuropa bis Krain Mai, Juni und August. Bei Haidmannschaft und Oberfeld Juni aus Hecken, selten, in der f. *ruficostata* Zell. (Mn. Kstld.); *ruficostata* auch aus Fiume (Draga) im Mai (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Kučiste, ziemlich häufig Mitte Mai bis in den Juli, viele mit grauer Färbung (Werner). Belegstücke von „Dalmatien“ der II. Gen. im Museum Wien.

Sonst lokal ums Mittelmeer; mediterran.

808. *ostrinaria* Hb. Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Kučiste, nicht häufig Ende Mai, Juni (Werner); Spalato (Mus. Wien); Insel Brioni, um den 23. V., mehrfach (Rbl. Brioni gr.); Insel Lissa Ende Mai, Anfang Juni am Licht (Galv.); Lagosta, in der Dämmerung in den Macchien, Ende Mai (Galv. Dalm. Ins.).

Sonst in Südeuropa, Balkanhalbinsel bis Armenien; mediterran.

809. *circuitaria* Hb. Um Spalato (V. Geiger, zool. Bot. 1873). Südwesteuropa, Italien; ? orientalisches.

810. *herbariata* F. Mojstrana Ende Juni; Wippach, im Epheu häufig im Juni (Hafn. F. Kr.); bei Wippach im Hause gefunden, Juli (Mn. Kstld.); St. Lucia, Canale, Reifenberg, Görz, schon ab Mai nicht selten; Triest Juni gemein an Straßenlaternen (Stdr.); Triest, gemein Juni an Lampen (Carr.); Fiume Mai, Juni an Gebäuden (*pusillaria* Hb.) (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Spalato 15. V. (Mus. Wien); Kučiste Mai, Juni, nicht selten an Mauern (Werner). Mostar 23. VI. ein stark dunkel bestäubtes Stück (Schaw. B. H. IX); Domanovic, Stolac (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bukarest, Westbulgarien; verm. orientalisches.

811. *elongaria* Rbr. Mojstrana, Lichtfang, August (Hafn. F. Kr.); Pola, August (Klos); Mitteldalmatien (Mn.); Rakitovic 4. VIII.; Halbinsel Marjan bei Spalato mehrfach Anfang Juni (Stdr.); Spalato 15. V. (Mus. Wien).

Auch sonst in Südeuropa bis Südrubland; orientalisches.

812. *bisetata* Hufn. Črna Prst, 700—900 m, 31. VII., 7. VIII.; Mojstrana Mitte Juli; Nanos 16. VII.; f. *extincta* Stgr. bei Slap ob. Wippach 16. VII. (Hafn. F. Kr.); Grahovo 20. VII. 2 Stück; Plava, Canale Ende Juli Lichtfang (Stdr.); Karfreit 2. VII. (Zerny, Mus. Wien); Grojnatal 6. VII. (Hafn. F. Görz); Görz 14. IX. ein Stück *extincta* (Preißbecker); am Monte Maggiore (Rbl. M. M.); Mitteldalmatien (Mn.); aus der Herzegowina (Schaw. B. H. V).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Siebenbürgen; sibirisches.

813. *trigeminata* Hw. B. Rbl. IX: In Mitteleuropa, Juni, an sonnigen Hängen. Bei Wippach, Oberfeld und Zoll, Juni, in Hecken (Mn. Kstld.); Leme 1 ♀ 4. VI. abgeflogen (Stdr.); Veprinaz 9. VI. am Köder; Mattuglie 6. VII. abgeflogen, Köder (Rbl. M. M. II); Triest, gemein Juli, August am Köder (Carr.); Fiume Juni in Eichengebüsch (*reversata* Tr.) (Mn. Fiume); Lovrana 10. VII. (Schaw. M. M.); Mitteldalmatien (Mn.); Kučiste, vereinzelt (Werner); Domanovic (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Banat, Siebenbürgen; orientalisches.

814. *politata* Hb. B. Rbl. IX: Krain, Dalmatien Juli. Wippach, auch f. *abmarginata* Bhtsch. Ende Juni, Anfang Juli (Hafn. F. Kr.); Ende Juni bei Maria Au an einem Lindenstamm, verfliegen (Mn. Kstld.); St. Lucia 1. VII.; Hudajužna, Ende Juni; St. Daniel-Kobdil, Slap, Heiligenkreuz Anfang Juli; Görz 21. VI. (*abmarginata*); Repentabor Ende Juni in Eichengebüsch nicht selten; Nabresina 1. VII. (*abmarginata*) (Stdr.); *abmarginata* mit Übergängen zur Nennform: Kalvarienberg, Grojna und Salcano-Abhänge, häufig in Hecken, ab Ende Juni bis Mitte Juli (Hafn. Görz); Nabresina 1. VII. (Hafner); die Form *abmarginata* auch aus Cervignano, Belvedere, Prosecco, Duino (Zerny, Mus. Wien); Triest, Fa. Vogel (Carr.); bei Abbazia, gar nicht selten (Neustetter). Abbazia 16. VI. (*politata*); Mattuglie 6. VII., Lovrana Juli, aus Gebüsch gescheucht (Rbl. M. M. I u. II); Fiume, Juni, selten an Gebäuden (Mn.); Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Insel Brioni Juni. Jablanica, große Stücke der f. *abmarginata* Anfang Juli (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien (Derwent), Banat, Siebenbürgen; orientalisches.

815. *filicata* Hb. B. Bbl. IX: südl. Österreich, Ungarn Juni und September. Mitte August zweite Brut, deren Falter kleiner sind, auch am Köder (Hafn. F. Kr.); Mitte Mai bis Anfang Juni Salcanohänge Gebüsch. Die kleinere II. Gen. im August, auch am Köder (Hafn. F. Görz); ganze Gegend von Wippach bis Görz in Dornhecken, Mai, Juni, am zahlreichsten auf den südlichen Nanosabhängen (Mn. Kstld.); Hudajužna 17. V., Opcina 2. VI., 26. V. Napoleonstraße, 1 ♂; Triest 25. VII. ein abgeflog. ♀ am Licht (Stdr.); daselbst, gemein Mai und August, September Lampenlicht (Carr.); Mte. Spaccato 9. IX. an Felsen (Galv.); Sesana 20. VIII., kleine Stücke (Lbl.); Mattuglie 1. VI. (Rbl. M. M. II); Fiume Mai, Juni (Mn.); ebenda, 10. VI. (Mändl). Mitteldalmatien (Mn.). Jablanica, Tassovic im September, Stolac 20. V., Lastva (Rbl. Stud. II); Trebinje 20. V. (Schaw. B. H. IX); Insel Brioni 21. IV. und 10. bis 12. V. (Rbl.); Lissa, Anfang Juni; Lagosta, abends in den Macchien (Galv. B. A. I.).

Auch sonst in Südeuropa und Kleinasien; orientalisches.

816. *rusticata* F. Mojstrana, Senosetsch, Wippach Juni bis August, darunter *vulpinaria* H. S. (Hafn. F. Kr.); Görz, Ende Mai, Juli, Nennform und *vulpinaria*, überall häufig in Hecken (Hafn. Görz); Plava, Canale, Čepovan, Heiligenkreuz, Kronberg, Mossa, Grojnatal, St. Florian, Oslavija, Reifenberg, Opcina, Miramar, Decani, Salvore, Canfanaro Juni, Juli, August, scheinbar nicht besonders häufig (Stdr.); Triest, gemein Juli, August am Köder (Carr.); Opcina-Prosecco 10.—12. VI. (Bohatsch); Grignano Juli (Schima); Sesana 16. V. 2 Stück (Lbl.); Pola *vulpinaria* 26. VII. Anfang August (Lbl.); Abbazia (*vulpinaria*) 23. VII. (Rbl. M. M.); Fiume, bei Martinischza (*vulpinaria*) Juni (Mn. Fiume); Draga di Lovrana 9. VII. (Schaw. M. M.); Mitteldalmatien (v. *vulpinaria*) (Mn. 3 R. Dalm.); Stücke der Stammform ohne Datum aus Dalmatien (Mus. Wien); Kučiste (Nennform) wenige, Juni (Werner); Spalato 13. VII. (Mus. Wien); Trebinje 13. VII. (Schaw. B. H. VIII); Prenj, Grn. biela, 600 m, 2. VIII. *vulpinaria* (Rbl. Stud. II).

Insel Brioni, Mai (Rbl. Brioni gr.); Lussingrande Mitte Juni, *vulpinaria* (Galv. Ausb. Lussin); Insel Brazza (Mus. Wien).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien (Nennform), Banat, Siebenbürgen; orientalisches.

817. *dilutaria* Hb. (= *holosericata* Dup.). Überall verbreitet, meist in der größeren Form *praeustaria* Mn. mit auswärts verdunkelten Flügeln. Wocheiner See 8. VII.; Mojstrana 16. VII., 24. VII.; Wippach Juni, Juli; *praeustaria* bei Wippach jahrweise vorherrschend (Hafn. F. Kr.); bei Oberfeld Juni auf Berglehnen und Hutweiden (Mn. Kstld.); Salcano, Kronberg, Görz Ende Juni mehrfach (Str.); Canale 23. VII. (Prinz); Umgebung Görz, Salcano in Hecken häufig, *praeustaria*, 1905 häufiger als die Stammform (Hafn. Görz); Triest, nicht häufig Juni, Juli in Gebüsch (Carr.); Mte. Maggiore; 23. VII. mit *praeustaria* an der Küste (Rbl. M. M.); Fiume Juni (*holosericata*); bei Martinischza (*praeustaria*) Juli selten (Mn. Fiume). Diese Form auch von Lovrana Juli (Schaw. M. M.); Mitteldalmatien, *praeustaria* (Mn.); Mostar, II. Generation, 14. XI. (Schaw. B. H. XI); Orjengebiet (Schaw. B. H. IX); Jablanica, Lakat, Domanovic, Bilek, Vrbanje (*praeustaria*) 17. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien lokal, Banat; orientalisches.

818. *interjectaria* B. Wippach, Ende Juni bis Mitte Juli in Hecken, ziemlich häufig (Hafn. F. Kr.); Grojnatal Ende Juni, Juli in Hecken, nicht selten (Hafn. Görz); Mitteldalmatien (Mn.). Jablanica 6. VII., Lakat, Vrbanje (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, Banat; orientalisches.

819. *humiliata* Hufn. Črna Prst, Untere Alm, 800 m, 17. VII.; Mojstrana 16. VII., Loitsch 2. VI., Wippach Juni häufig (Hafn. F. Kr.); Salcanoabhänge Juni im Grase nicht selten (Hafn. Görz); Kronberg, Plava, Canale, Hudajužna, Triest-Cologna, Miramar Juni nicht häufig (Str.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Abbazia, sehr häufig (Rbl. M. M.); Fiume (*osseata* H. Sch.) Mai, Juni (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.), Gacko und Vrbanje (Rbl. Stud. II).

Auch sonst in allen Nachbarländern; orientalisches.

820. *nitidata* H. S. Gradišče ob. Wippach 12. VII. (Hafn. F. Kr.); Grojnatal, Salcanoabhänge und beim Kloster Kostagnevizza Ende Juni bis Ende Juli ziemlich häufig in Gebüsch, besonders auf jungen Akazien (*Robinia pseudoacacia*) (Hafn. F. Görz); Grojna 4. VII., Salcano Anfang Juli einzeln, Reifenberg 24. VII. ein Stück. Umg. Triest 29. VI. 1 ♂ (Str.).

Sonst in Slavonien, Südungarn; sibirisches.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 88-94](#)