

## Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

### *Bembidion (Peryphus) oblongum* Dej.

ssp. *tergluense* Netol. Vorletztes Glied der Kieferpalpen ist geschwärzt, Schenkel pechbraun,  $2\frac{1}{2}$  selten  $3\frac{1}{2}$  Basalglieder der Fühler licht. Kreuzzeichnung auf d. Fld. ausgeprägt, Hsch. ausgezeichnet durch Schlankheit und Länge. Fld. fein punktgestreift wie *testaceum* Duff. Von *oblongum* v. *Lomnickii* Net. durch die auffallende Kleinheit und den längeren Hsch. verschieden. Troglav. Kol. Rundschau VII, 23.

### *Bembidion (Philodonthus) guttula* Fab.

ssp. *castilicum* Netol. Differiert von der Nominatform durch größeren Kopf und breitere Stirn, während der Hsch. typisch für *guttula* und nicht für *Mannerheimi* spricht. Färbung, Skulptur und Mikroskulptur von letzterem nicht verschieden. La Granja (Guadarrama), Penalare, Potes. Kol. Rundschau VII, 25.

### *Bembidion (Peryphus) nitidulum* Marsh.

ssp. *pallidicorne* Müll. Körper glänzend, metallisch bläulich-grün, Beine, Palpen und Fühler fast einfarbig rötlichgelb, letztere zur Spitze kaum verdunkelt. Hsch. quer herzförmig mit relativ breiter Basis und kräftigem Postangularfältchen, ohne Mikroskulptur, vor der Basis deutlich punktiert. Fld. vollzählig und innen ziemlich kräftig punktiert gestreift. Beim ♀ im apikalen Drittel mikroskopisch genetzt, beim ♂ ist die Netzung sehr schwach und nur an der Spitze der Fld. erkennbar. Long 4·8 bis 5 mm. Mte. Viso. Kol. Rundschau IX, 28.

### *Bembidion obtusum (Phila)* Serv.

ssp. *Tethys* Netol. Ausgezeichnet durch kräftigeren Bau, besonders durch die Bildung der Htwinkel des Hsch., indem ihnen ein deutliches Fältchen fehlt. An dessen Stelle befindet sich entweder ein erhabenes Feld oder dieses ist gegen den abgestumpften Htwinkel etwas keilförmig verengt. Hschbasis nicht horizontal abgeschnitten, der hintere borstentragende Punkt etwas nach oben gerückt, sodaß er nicht mehr den Scheitel der Htwinkel bildet. Fühlerbasis ausgedehnter hell (2 bis 3 Glieder). Alle 7 Streifen sind erkennbar, der äußerste recht schwach. Die Klavikularfalte der Schulter ist länger und deutlicher. Barcelona-Gualba, Palma auf Mallorca, Madeira, Cabo Gerasao, Assuni, Ajaccio, Siracusa, Palermo, Elba. Kol. Rundschau XII, 163.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 103](#)