

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, *Nolidae*, *Syntomidae*, *Arctiidae*, *Zygaenidae*,
Psychidae, *Sesiidae*, *Cossidae*.

(Fortsetzung.)

821. *degeneraria* Hb. B. Rbl. IX: Südliches Österreich-Ungarn Mai und Ende Juli, August; f. *depravata* Stdgr. Gradišče 1 ♂ 31. V. (Hafn. F. Kr.); Wippach bis Görz Juni in Gebüsch und auf Berglehnen (Mn. Kstld.); Kalvarienberg, Salcano Mai und wieder Ende Juli, August nicht häufig in Gebüsch und Epheu; auch am Köder (Hafn. Görz); Görz-Strazig Ende Mai nicht selten; Triest Mai, Juni am Licht, selten — häufiger die II. Gen. Mitte August bis Mitte September (Stdr.); Triest, nicht häufig Mai, Lichtfang (Carr.); Abbazia 4. V. 1 ♀; Lovrana August (Rbl. M. M. I); Fiume Mai bis Juli (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Kučiste Mai einzeln (Werner); Stolac, Lastva (Rbl. Stud. II).

Inseldunde: Lussin: Lussingrände, Neresine Anfang September; Lussin 19.—22. V.; Lissa Ende Mai am Licht, Comisa 19. VIII.; Lagosta 28. V. (Galv. B. A. I.). Die Form *depravata* von Brioni im Mai (Rbl.).

Sonst in Kroatien, Bosnien, Serbien; orientalisches.

822. *rubraria* Stgr. subsp. *bilinaria* Fuchs. Gradišče ob. Wippach Mitte August (Hafn. F. Kr.); Abbazia 3. VI.; Mattuglie 8. und 18. VI.; Mte. Maggiore, ein abgeflogenes Stück (kleines ♀) 11. VI. (Rbl. M. M.); Zengg, auch Stammform, 2., 4., 21. VIII. (Dobiasch). Herzegowina (Schaw. B. H. III); Domanovic 17. VIII. (Rbl. Stud. II).

Auch von Budapest, Griechenland bekannt; orientalisches.

823. *inornata* Hw. Scheint im Gebiete selten und recht lokal zu sein. Črna Prst 29. VI. in etwa 1200 m (Hafn. F. Kr.); südliche Nanosabhänge, einige Ende Juni (Mn. Kstld.); Grojnatal ein Stück aus Hecke 30. V. (Hafn. Görz); Abbazia 16. VII. (Rbl. M. M. I);

Lovrana Juli (Schaw. M. M.); Fiume (*suffusata* Tr.) Mai in Eichengebüsch (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.). Lastva und Gacko (Rbl. Stud. II).

Auch Kroatien - Slavonien, Bosnien, Banat, Siebenbürgen; orientalisches.

824. *deversaria* H. S. Um Wippach häufig Juni, Anfang Juli (Hafn. F. Kr.); hinter Oberfeld Juni in Eichengebüsch (Mn. Kstld.); Görz Juni, Juli überall häufig in Hecken (Hafn. F. G.); Triest Juni, Juli im Gebüsch (Carr.); Sesana 2 ♂♂ 22. VI. und 11. VII. (Lbl.); Triest Ende Juni, Juli in Gebüsch, bei Bologna, Conconello, Barcola ziemlich häufig, Borst, Decani, Salvore, hier am Meeresstrande in macchienähnlicher Formation (Stdr.); Abbazia, Mattuglie 10. VI. bis August (Rbl. M. M. I). Fiume Juni in Eichengebüsch (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.). Prenj 28. VII., Lakat, Domanovic, Stolac 28. VI., Bilek 14. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, Banat, Siebenbürgen; orientalisches (nach Skala sibirisch*).

825. *aversata* L. Mojstrana, Vratatal, Adelsberg Juni, Juli (*aversata* und *spoliata*) (Hafn. F. Kr.); Grojnatal 2. VIII. ein Stück aus einer Hecke (Hafn. F. Görz); Repentabor ein Stück, 25. VI. aus Eichengebüsch (Stdr.); Triest Nennform und *spoliata* F. A. Vogel (Carr.); Grignano Juli (Schima); Mte. Maggiore 23. VII. (Rbl. M. M.); Abbazia, *spoliata* 30. V., 29. VI. (Rbl. M. M. I); Fiume 3. VI. (Mändl); Fiume Juni in Eichengebüsch (Mn.); Zengg (*spoliata*) 20. V. und 3. VI. (Dobiasch); Mitteldalmatien (*aversata* und *lividata* L.) (Mn. 3 R. Dalm.); Prenj, 1300 m, Ulog, Gacko (von allen Orten *spoliata*) (Rbl. Stud. II); Insel Brioni (*spoliata*) 24. V. bis 2. VI. und Anfang September, häufiger als Nennform (Rbl. Brioni gr.); Lussingrande Anfang Juni beide Formen (Galv. Ausb. Lussin, zool. bot. 1916).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien (Nennform), Banat, Siebenbürgen; orientalisches.

826. *emarginata* L. Bei Oberfeld, Haidenschaft in jungen Gebüsch Juni (Mn. Kstld.); Grojnatal 15. VII. aus Eichengebüsch (Hafn. F. Görz); Volosca 1 Juli in Eichengebüsch (Mn. Fiume).

In den nördlichen Nachbarländern verbreitet, in Dalmatien, Bosnien, Herzegowina fehlend; sibirisch.

*) *Ac. diffluata* H. S. Skala Stud.: Bosn.-Herzeg., Dalmatien.

827. *immorata* L. Wippach, zweite Maihälfte, Anfang Juni und wieder Ende Juli, Anfang August, nicht selten (Hafn. F. Kr.); Oberfeld Juni auf Hutweiden (Mn. Kstld.); Görz, ein Stück, ohne Datum (Stdr.); beim Schutzhause auf dem M. Maggiore (Rbl. M. M.); Lovrana Juli mit geschlossener weißer Außenbinde (Schaw. M. M.); Fiume Mai, Juni (Mn.); Vucija bara (Schaw. B. H. VI); Bosnien, Nennform; Herzegowina die große schwärzliche scharf gezeichnete f. *tessellaria* B. *) in typischen Stücken von Nevesinje, Vucija bara 19. VII. (Rbl. Stud. II); f. *meissli* Schaw. aus Bišina im Juli (Schaw. B. H. V).

Auch in Kroatien - Slavonien, Bosnien, Banat, Siebenbürgen; sibirisch.

828. *rubiginata* Hufn. Sehr verbreitet, fast überall gemein. Senosetsch; überall um Wippach Mai bis Anfang September; bei Wippach bestimmt, sonst wahrscheinlich in zwei Generationen (Hafn. F. Kr.). Görz, überall im Grase, auch am Köder, Ende Mai bis Ende August (Hafn. Görz); Grahovo Mitte August, St. Lucia Tolmein, M. Matajur, Trentagebiet, auf dem Karst von Čepovan; Canale, Plava; Umg. Görz gemein, ganze Umgebung Triest auf Karstwiesen; hinter Noghera, Herpelje - Kozina, Rakitovic, Zlum, Pinguente, Cul di Lemè; 1 ♂ der II. Gen. 27. IX. am Licht in Triest (Stdr.). — Von hier auch f. *ochraceata* Stgr. (Galv. B. A. I. 196!); Cologna, äußerst gemein, *ochraceata*, die meisten Stücke mit grell abstechender Außenbinde (Stdr.); Triest, sehr gemein, Juni, August, September; zwischen Wiesenblumen und Gebüsch (Carr.); Sesana 17. V. (Lbl.); Rojano 7. IX. (Galv.); einzeln um Abbazia (Rbl. M. M.); Abbazia, Lovrana 6. VIII. (Rbl. M. M. I); Fiume 4. VI. (Mändl); Mitteldalmatien (Mn.); Fiume (*rubricata* S. V.) Mai bis Juli (Mn.). Jablanica, Prenj (300 m), Mostar 19. VII., Tassovic (Nennform und Übergang zu *ochraceata*) im September, Dolni blato, Lastva, Gacko (Rbl. Stud. II); Herzegowina, f. *bruneo-marginata* Schaw. (vergl. zool. bot. 1915, p. 241) (Schaw. B. H. IX). Insel Brioni, September (Rbl. Br.). Insel Grado 23. V. (Galv.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, Banat, Siebenbürgen; sibirisch.

830. *turbidaria* H. S. Um Spalato (V. Geiger, zool. bot. 1873).
Sonst Südeuropa, Mauretanien, Kleinasien; orientalisches.

(Fortsetzung folgt.)

*) Neuerlich vielfach als eigene Art betrachtet!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 115-117](#)