

Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina.

Vortrag, gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener
Coleopterologen-Verein.

Von Adolf Hoffmann, Wien.

(Fortsetzung)

- Oxytelus rugosus* Fab. Jablanica, Hum bei Mostar häufig.
insecatus Grav. Mostarsko Blato ziemlich häufig.
laqueatus Marsh, Mostarsko Blato sehr häufig.
piceus L. Trebevic, Gacko, Ulog häufig.
sculptus Grav. Sarajevo, Mostarsko Blato häufig.
sculpturatus Grav. Salona, Bilek, Jablanica häufig.
tetracarinatus Block. Mostarsko Blato sehr häufig.
- Platysthetus arenarius* Foucr. Mostarsko Blato sehr häufig.
cornutus Grav. Mostarsko Blato sehr häufig.
capito Heer. Mostarsko Blato 3 Exemplare.
nitens Sahlb. Mostarsko Blato 4 Exemplare.
- Bledius unicornis* Germ. Mostarsko Blato, Kojnica je 2 Exempl.
pallipes Grav. Mostarsko Blato 3 Exemplare.
fracticornis. Mostarsko Blato, Jablanica, Kojnica häufig.
cribricollis Heer. Mostarsko Blato, Ulog 6 Exemplare.
dissimilis Er. Mostarsko Blato 2 Exemplare.
- Leptotyphlus perpusillus* Dod. Gacko aus der Erde der Wurzel-
partie eines Olivenbaumes gesiebt 2 Exemplare.
- Oxyporus rufus* Linn. Bjelasnica, Trescavica häufig in Schwämmen.
maxillosus in Gesellschaft der vorigen weniger häufig.
- Stenus biguttatus* Linn. Bosna, Narenta, Mostarsko Blato sehr
häufig.
bipunctatus Er. Kojnica, Mostarsko Blato je 2 Exempl.
Juno F. Bjelasnica, Trebevic 2 Exemplare.
ater Mannh. Ulog, Mostarsko Blato ziemlich häufig.
clavicornis Scop. Trebevic, Bosna ziemlich häufig.
bimaculatus Gyllh. Ulog, Mostarsko Blato 3 Exemplare.
morio Grav. Kojnica, Jablanica, Gacko wenige.
canaliculatus Gyllh. Narenta, Mostarsko Blato häufig.
fuscipes Grav. Ulog, Bilek, Jablanica ziemlich häufig.
Argus Grav. Trebevic, Grabovica, Bilek, Gacko häufig.
pusillus Steph. Salona, Dugopolje, Gacko wenige.

- nanus* Steph. Bosna, Narenta überall häufig.
circularis Grav. Mostarsko Blato ziemlich häufig.
humilis Er. in Gesellschaft der vorigen weit häufiger.
crassus Steph. Mostarsko Blato ziemlich häufig.
- Paederus riparius* L. Narenta, Mostarsko Blato sehr häufig.
litoralis Grav. Mostarsko Blato ziemlich häufig.
- Astenus filiformis* Latr. Nevesinje, Mostarsko Blato ziemlich häufig.
filiformis a. *humeralis* Gredl. in Gesellschaft des vorigen weniger häufig.
angustatus Payk. Dugopolje, Mostarsko Blato häufig.
- Stilicus subtilis* Er. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
rufipes Germ. Trebevic, Bosna, Kojnica vereinzelt.
- Medon ferrugineus* Er. Bjelasnica ein Exemplar.
melanocephalus Fab. Nevesinje, Mostar häufig.
- Scopaeus laevigatus* Gyllh. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
- Domene scabricollis* Er. Cvrstnica, Vran sehr häufig.
- Lathrobium quadratum* Payk. Mostarsko Blato ziemlich häufig.
elongatum Linn. Trebevic, Bjelasnica ziemlich häufig.
fulvipenne Grav. Mostarsko Blato sehr häufig.
fulvipenne v. *Letzneri* in Gesellschaft der vorigen, die nom. f. überwiegend.
brunipes Fab. Trebevic, Bjelasnica vereinzelt.
filiforme Grav. Narenta, Mostarsko Blato häufig.
longulum Grav. Nevesinje, Mostarsko Blato ziemlich häufig.
- Weiratheri* Scheerpeltz n. sp. Cvrstnica, Vran in Anzahl.
- Scimbalium testaceum* Er. Salona, Mostarsko Blato je ein Exempl.
- Doliceon biguttulus* Boisd. Salona, Mostarsko Blato zieml. häufig.
illyricus Er. Mosor-Gebirge, Bilek, Gacko wenige.
- Cryptobium fracticorne* Mannh. Salona 2 Exemplare, Mostarsko Blato häufig.
- Xantholinus punctulatus* Payk. Mostarsko Blato wenige.
angustatus Steph. Nevesinje, Bilek, Gacko häufig.
relucens Grav. Salona, Dugopolje an Eselsexkrementen häufig.
tricolor Fab. Trebevic, Bjelasnica, Gacko je 1 Exempl.
distans Muls. Mosor, Bilek je 1 Exemplar.
linearis Ol. Narenta, Mostarsko Blato häufig.
- Bäptolinus affinis* Payk. Bjelasnica, Trescavica wenige.

- Othius punctulatus* Goeze. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
melanocephalus Grav. Cvrstnica, Vran ziemlich häufig.
lapidicola Kiesw. Cvrstnica, Bjelasnica je 2 Exemplare.
brevipennis Kr. Cvrstnica, Vran ziemlich häufig.
- Actobius cinerascens* Grav. Trebevic, Bilek 4 Exemplare.
- Philonthus splendens* Fab. Hum bei Mostar, Mostarsko Blato häufig.
intermedius Boisd. Salona, Labin 2 Exemplare.
laminatus Creutz. Hum bei Mostar 4 Exemplare.
nitidus Fab. Gacko, Mostarsko Blato 4 Exemplare.
cyanipennis Fab. Bjelasnica ziemlich häufig.
politus Linn. Mostarsko Blato ziemlich häufig.
carbonarius Gyllh. Hum, Mostarsko Blato sehr häufig.
atratus Grav. überall an der Narenta sehr häufig.
caerulescens Boisd. Mostarsko Blato 4 Exemplare.
ebeninus Grav. Trebevic, Bilek, Gacko häufig.
coruscus Grav. Salona, Labin, Nevesinje, Ulog nicht häufig.
concinus Grav. Salona, Mosor, Nevesinje vereinzelt.
sanguinolentus Grav. Hum, Mostarsko Blato häufig.
debilis Grav. Trebevic, Nevesinje ziemlich häufig.
varius Gyllh. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
bimaculatus Grav. Cvrstnica, Vran je 1 Exemplar.
frigidus Kiesw. Bjelasnica, Cvrstnica, Vran häufig.
lepidus Grav. Trebevic, Bjelasnica ziemlich häufig.
varians Payk. Nevesinje, Bilek, Gacko, Mostarsko Blato häufig.
fimetarius Grav. Hum, Mostarsko Blato häufig.
sordidus Grav. Nevesinje, Mostarsko Blato sehr häufig.
quisquiliarius Gyllh. Hum, Mostarsko Blato sehr häufig.
micans Grav. Narenta, Mostarsko Blato sehr häufig.
salinus Kiesw. Mostarsko Blato sehr häufig.
punctus Grav. Ulog, Narenta, Mostarsko Blato ziemlich häufig.
splendidulus Grav. Narenta, Mostarsko Blato sehr häufig.
nigritulus Grav. wie die vorige ebenso häufig.
- Cafius xantholoma* Grav. Salona, Dugopolje vereinzelt.
- Staphylinus flavocephalus* Goeze. Salona, Labin, Dugopolje häufig.
fulvipes Scop. Cvrstnica, Vran je 2 Exemplare.
olens Müll. Salona, Dugopolje, Mostarsko Blato sehr häufig.

megacephalus Nrdm. Bjelasnica 2 Exemplare.
ophthalmicus Scop. Salona, Labin, Bilek, Gacko häufig.
similis Fab. überall sehr häufig.
pedator Grav. Hum, Mostarsko Blato je 2 Exemplare.

Emus hirtus Linn. Hum, Mostarsko Blato vereinzelt.

Ontholestes murinus Linn. Mostarsko Blato häufig.

Creophilus maxillosus Linn. Gacko an Aas sehr häufig.

Astrapaesus ulmi Rossi. Mostarsko Blato ziemlich häufig.

Quedius fulgidus Fab. Mostarsko Blato 2 Exemplare.

mesomelinus Marsh. Trebevic, Bjelasnica, Visocica
 ziemlich häufig.

mesomelinus s. *Kraussi* Penecke. Höhlen bei Labin
 häufig.

xanthopus Er. Trebevic, Gacko einige.

fuliginosus Grav. Mostarsko Blato ziemlich häufig.

picipennis v. *molochinus*. Mostarsko Blato ziemlich
 häufig.

ochropterus Er. Cvrstnica, Vran je 2 Exemplare.

ochropterus a. *Kiesenwetteri* Gn. Gacko 2 Exempl.

boops Grav. Bjelasnica 2 Exemplare.

Mycetoporus splendens Marsh. Gacko, Mostarsko Blato ziemlich
 häufig.

Conosomus testaceus Fab. Hum, Mostarsko Blato 3 Exemplare.

immaculatus Steph. Mostarsko Blato häufig.

Tachyporus nitidulus Fab. Cvrstnica, Mostarsko Blato 2 Exempl.

pusillus Grav. Mostarsko Blato, Gacko wenige.

(Fortsetzung folgt.)

Melinea lilis imitata f. erica m. n.

Von R. B a r g m a n n, Leipzig.

Neben fast typischen *imitata* fliegt am Rio Dagua forma *erica*, welche noch unter der Submediana des Vflgls. einen gelblich-braunen Basalstreifen führt, der etwa bis zur Mitte des Hinterandes führt. Neben einer Reihe weißer Submarginalpünktchen auf dem Vflgl., die im Apex am deutlichsten sind, ist noch ein gelber Fleck im Analwinkel vorhanden. Das Hflgl.-Band ist schmal und reicht nur bis zur Mitte des Flügels.

♂♀ Type in meinem Besitz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Adolf

Artikel/Article: [Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina. Vortrag gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener Coleopterologen-Verein. 138-141](#)