

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung.)

854. *pupillaria* Hb. Dem alpinen und nördlichen Teile des Gebietes fehlend, im Süden und auf einigen Inseln die häufigste *Codonia*art. meist in der Form *gyrata* Hb. und *nolaria* Hb. auftretend. Nördlichster Fundort Wippachtal (Stdr.); B. Rbl. IX (Südkrain, Dalmatien. Wippach, jedenfalls selten; I. Gen. Anfang Mai, die II. Gen. im Juli (Hafn. F. Kr.); Anfang Mai und Juli hinter Oberfeld in zwei Gen. (Mn. Kstld.); Triest F. A. Vogel (Carr.); Triest, f. *badiaria* Stgr., 1 ♂ 2. X. frisch an einer Laterne (wohl III. Gen.) (Stdr.); Pola und Zengg (Meißl) die f. *alogaria* Schaw., vollständig ungezeichnet, ohne Spur von Pupillen, sie besitzt nicht einmal Flecken anstatt der Pupillen, wie es bei Übergängen der Fall ist (Schaw. E. Z. Wien 1919, p. 67); f. *alogaria* Schaw. Lovrana 31. VII. (Schaw. M. M.); Pola e. l. (Klos); Loebel besitzt einige gezogene Tiere, die den f. *nolaria*, *gyrata*, *alogaria* angehören. Mattuglie 18. VI., 30. VII. (Rbl. M. M. I); *pupillaria* und *nolaria* Abbazia, Mattuglie, Veprinaz Anfang August (Rbl. M. M. II); Fiume, Nennform, *gyrata* und *nolaria*, Mai, Juni in Eichengebüschen und Dornenhecken (Mn. Fiume); diese Formen auch aus Mitteldalmatien (Mn.); Kučiste f. *nolaria* Hb. Mai, Juni nicht selten (Werner); Orjen, Ende Juli, *nolaria* und *badiaria* August (Schaw. B. H. III, IX, V); Stolac 15. VI., *nolaria*; Domanovic, Nennform (Rbl. Stud. II).

Inselfunde: Grado 18. IX. (Galv. B. A. I.); Brioni, *nolaria* September (Rbl. Brioni I); Nennform und *nolaria* 25. V. und September (Rbl. Brioni gr.); Lussin (Cigale) 4. XII.; *nolaria* aus Lussingrande 8. VI. (Galv. Ausbeute Lussin, Verh. zool. bot. 1916); Insel Brazza *gyrata* schon 30. III. (Stdr.); Meleda (Blata) 12. IV., *gyrata* Meleda (Babinopolje) 9. IV.; S. Andrea 23. VIII. (Galv. B. A. I.);

Lissa, *gyrata* 22. V. am Licht; Lagosta, *gyrata* 1. VI. (Galv. Dalm. Ins.).

Auch aus Kroatien, Ungarn; orientalisches.

855. *porata* F. Wippach und Gradišče, gen. aest. *visperaria* Fuchs, Ende Juni, Juli (Hafn. F. Kr.); Oberfeld, Haidenschaft, Gradišče Mai aus Eichengebüsch (Mn. Kstld.); Görz, Kalvarienberg, Grojnatal Mai, Juli, Eichengebüsch, nicht häufig (Hafn. F. Görz); Kronberg 16. V. zwei Stück; Görz, ohne Datum; St. Daniel-Kobdil ein Stück 23. V.; Conconello 22. V. ein Stück (Stdr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Sesana 11. V., 20. V. (Lbl.); Mattuglie 20. V. f. *visperaria*; Abbazia 9. und 16. VII., 1. VIII. (Rbl. M. M. I); Ika 3. V.; *visperaria* Mattuglie 4. VIII., 22. IX. (Rbl. M. M. II); Fiume April, Mai in Eichengebüsch (Mn.); f. *visperaria* 9. VII. Draga di Lovrana (Schaw. M. M.); Mitteldalmatien (Mn.). Herzegowina, August, große Exemplare (Schaw. B. H. V); Domanovic, Bilek, Juli (Rbl. Stud. II). Insel Brioni 2. V. 1 ♀, einziger Inselfund! (Rbl.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, Banat, Siebenbürgen; orientalisches.

856. *quercimontanaria* Bastelbg. Nur aus Mostar 19. VII. ein sicheres Stück bekannt. Da die Art mit *punctaria* meist verwechselt wird, ist ihre Verbreitung in Südosteuropa noch unbekannt (Rbl. Stud. II).

857. *punctaria* L. Wippachtal, St. Veit an der Präwalder Straße Anfang Juni aus Eichen gescheucht (Mn. Kstld.); Kalvarienberg, Grojna Mai und Juli häufig im Eichengebüsch (Hafn. F. Görz); mehrfach Auzza, Kronberg, Salcano, Opcina, Prosecco, Repentabor, Borst von Ende April ab bis Juni, II. Gen. noch Ende September Triest am Licht (Stdr.); Triest. häufig Juni und September Lichtfang (Carr.); Sesana 20. V., St. Kanzian 21. V. im Gestrüpp beim Höhleneingang (Lbl.); Mattuglie 20. V. (Rbl. M. M. I); Fiume April, Mai im Eichengebüsch (Mn.); Zengg 17. VII. und 12. VIII. (Dobiasch); Mitteldalmatien (Mn.); Stobrec, Clissa aus Dornengestrüpp im April, Mai und Juni (Stdr.); Insel Brioni 28. IV. (Rbl. Brioni gr.); Insel Brazza 24. IV. ein Stück (Stdr.).

Flugzeiten: April bis Juni und Juli bis September; möglicherweise in drei Generationen: April, Mai; Juni, Juli und August, September (Stdr.).

Sonst aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Banat; orientalisches.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 157-158](#)