

## Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

### 4. Abschnitt.

*Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.*

(Fortsetzung)

858. *ruficiliaria* H. S. Rarität des Gebietes! Gradišče ob. Wippach 18. V., 1. VI. im Eichengebüsch (Hafn. F. Kr.); Mte. Sabotino bei Görz, nur eine Raupe, 16. IX. geklopft, 1 ♀ am 12. IV.; daselbst auch ein ♀ 12. V. aus Gebüsch gescheucht (Kitschelt); Abbazia 21. IV. (Rbl. M. M. I). Stücke bezeichnet mit „Dalmatien“ im Hofmuseum Wien. Jablanica, Stolac Mai (Rbl. Stud. II).

Auch aus Slavonien, Bulgarien, Kleinasien; orientalisches.

859. *linearia* Hb. B. R. IX: gen. aest. *strabonaria* Z., kleiner, rötelrot bestäubt. Im Gebiete selten, Dalmatien und den Inseln fehlend, in zwei Gen. von Ende April bis Juni und im Hochsommer. Črna Prst, bis 900 m im Juni, Nordseite (Hafn. F. Kr.); Grojnatal 7. VI. ein Stück (Hafn. F. Görz); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Conconello, Steinbrüche, Ende Mai ein Stück (Std.); Abbazia 12. VI. und 23. VII. (Rbl. M. M.). Prozor Juni; Jablanica, Nennform und *strabonaria*, Lakat (Rbl. Stud. II).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien; orientalisches.

860. *suppunctaria* Z. Ebenfalls sehr selten im Gebiete, Jo. B. Rbl. IX: Krain, Istrien, Dalmatien Juli (Rp. auf Eichen). Gradišče ob. Wippach 25. VI. (Hafn. F. Kr.); Draga di Lovrana 31. VII. (Schaw. M. M.); Lovrana 1 ♀ August (Rbl. M. M. I); Mattuglie Mai und August, also in zwei Gen. wie die übrigen Codoniaarten (Rbl. M. M. II). Mostar Oktober (Schaw. B. H. VII); Mostar 18. VII., Bilek 1 ♂ 14. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch Kroatien, Ungarn; europäisches.

### **Rhodostrophia Hb.**

861. *vibicaria* Cl. Ein echtes Karsttier! Wippachtal Juni auf Wiesen und Berglehnen (Mn. Kstld.); linkes Isonzoufer bei Stracig,

Kalvarienberg, Salcanoabhänge im letzten Maidrittel und im Juni ziemlich häufig; die um ein Drittel kleinere II. Gen. im August und Anfang September f. *strigata* Stgr. zu 40 Prozent aus einer Zucht erhalten (Hafn. F. Görz); Triest, gemein Juni und September, Wiesen und Gebüsch (Carr.); Triest *strigata* 14. IX. (Galv.); Opcina-Prosecco 10.—12. VI. (Bohatsch); Sesana, *strigata*, 29. VII. (Lbl.); Triest-Scorcola Anfang Juni allenthalben, Nennform, häufig mit *strigata* 20. VIII.; Villa Vicentina, Monfalcone, Duino, Miramar, Karstplateau von Komen und Dobrdo, St. Daniel - Kobdil, Dutovlje, Muggia, Borst, Salvore, Cul di Leme, Herpelje, Pingvente 30. VI.; Canfanaro, Rovigno, Pola, am Planik bei 1000 m, auf den Höhen von Rakitovic, am Slavnik, im Karste ziemlich variabel, die II. Gen. fast durchwegs zu *strigata* zu ziehen; noch im Oktober mehrfach ziemlich frisch angetroffen— noch in bedeutender Höhe nicht selten. Auch in ganz Dalmatien verbreitet, auch auf mehreren Inseln festgestellt (Strdr.); Nennform 2. VII. M. Maggiore-Haus (Schaw. M. M.); Mte. Maggiore *strigata* 11. VI. (Rbl. M. M.); Mattuglie August (*vibicaria*) (Rbl. M. M. I); Fiume 3. VI. (Mändl); Fiume Juni, Juli (Mn.); Zengg 21. VIII. (Dobiasch). Von beiden letzteren Fundorten auch *strigata*. Mitteldalmatien (Mn.). Prenj, Gacko, Vucija bara (Rbl. Stud. II). — Von Gacko auch *strigata* (Rbl.). Insel Brioni, auch *strigata* im Hochsommer (Rbl. Brioni gr.). Insel Arbe (Galv. B. A. I.); Brazza Ende Mai, mehrfach (Strdr.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

862. *calabraria* Z. Über das ganze Gebiet verbreitet, an heißen Berglehnen und steilen Hängen stellenweise sehr häufig, jahrweise oft gemein. B. Rbl. IX: Südkrain, Istrien Juni, Juli. Ende Mai bis Mitte Juni südl. Nanoshänge, Kouk und Tochauerhänge auf Hutweiden; Rp. im Mai erwachsen an *Asperula calabrica* (Mn. Kstld.); Grojnatal, Abhänge bei Salcano, hier besonders häufig Ende Mai bis Ende Juni. Eine II. Gen. nicht beobachtet, auch nicht durch Zucht erhalten; ein asymmetrisch gefärbtes Stück aus Salcano (Hafn. F. Görz); Hudajužna, im Krn-stock, Mte. Matajur, Canale, Plava, Mte. Santo, alle Hänge gegen das Wippachtal, Reifenberg, Monfalcone, Dutovlje Skopo, Repentabor, Umgebung Triest, Scorcola, Ende Mai, Anfang Juni, Opcina, Miramar gemein, Triestenico, Cologna in Steinbrüchen, Muggia, Decani, Rakitovic. in Dolinen und Bergabhängen; Salvore, Portorose, Rovigno, Cul di Leme 4. VI., Villa di Rovigno, gemein (alle Strdr.); Opcina - Prosecco, Napoleonstraße, 10.—12. VI. (Bohatsch).

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 177-178](#)