Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Trechus (Neotrechus) amabilis Schauf.

ssp. svilajensis Winkl. Die beiden Marginalseten des Hsch. sind voneinander etwa siebenmal so weit entfernt als die hintere Seta vom Htrand. Hsch. erheblich breiter als lang, mit der größten Breite im vorderen Viertel. Long. 4·2—4·4 mm. Svilaja-Gebirge, Mitteldalmatien. Kol. Rundsch. XII, 87.

Trechus (Neotrechus) Weiratheri Winkl.

Hsch. nur um ein Viertel schmäler als die Fld., Viertel breiter als lang, seitlich sehr stark und gleichmäßig gerundet, zur Basis mäßig verengt, mit kleinen, spitzen, kaum nach außen vorspringenden Htecken. Fld. lang elliptisch, um mehr als zwei Drittel länger als breit, fast parallelseitig, mäßig gewölbt, mit ziemlich konvex verrundeten Schultern; die inneren Dorsalstreifen kräftig, die äußeren feiner, deutlich ausgeprägt, dicht und fein punktiert. Der erste und zweite Dorsalpunkt liegen im vierten Zwischenraum, die angrenzenden Dorsalstreifen zeigen die Tendenz, sich dort zu vereinigen. Der umgebogene Nahtstreif verläuft im gleichmäßigen Bogen zum dritten Dorsalpunkt. Kopf bedeutend schmäler als der Hsch., kurz rundlich, mit nach rückwärts stark divergierenden Stirnfurchen. Fühler kurz und kräftig, 3. Glied um die Hälfte länger als das zweite, viertes bis sechstes etwas kürzer, siebentes bis zehntes so lang wie das zweite. Beine kurz, mit stark verdickten Schenkeln. Long. 46 mm. Preni plan. Herzegovina. Kol. Rundsch. XII, 90.

Trechus (Neotrechus) parvicollis Winkl.

Hsch. klein, wenig breiter als lang, zur Basis stark verengt, mit stark abgesetzten spitz nach außen vorspringenden Htecken, sehr schwach aufgebogenem St'rand und nicht vorgezogenen Vdecken. Fld. stark gerundet erweitert, mit stark abgeschrägtem, geradem Schulterrand und wenig konvex verrundeten Schultern; der zweite Zwischenraum ist wenig breiter als der dritte; der zweite Dorsalpunkt befindet sich in der Längsmitte; der erste Punkt der Series umbilicata ist nach innen, der vierte nach hinten gerückt. Kopf kaum schmäler als der Hsch.; Fühler lang und schlank, drittes Glied um die Hälfte länger als das zweite und kaum länger als das vierte, die vorletzten Glieder etwa dreimal so lang als breit. Beine mäßig lang und zart. Long. 6—7 mm. Bei Trebinje. Kol. Rundsch. XII, 91.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des

V.D.E.V. (Col.). 183