

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

Mattuglie 18. VI. (Rbl. M. M. I); Mitteldalmatien bei Stobrec, südlich Spalato (Mn.); Prenj 1050 m; Lakat, Vucijabara (Rbl. Stud. II); Vucijabara Anfang Juli; Bišina 7. VI. und 25. VII., Plana 3. VII.; diese Stücke gehören zur dalm.-bosn.-herzeg. Lokalrasse *dinarica* Schaw. Vucijabara f. *injuscata* Wgn. stark verdunkelt (Wgn. I. E. Z. 1919, p. 156). *)

Auch in Slavonien, Bosnien; orientalisches.

Lithostege Hb.

876. *farinata* Hfn. Von mir im Gebiete nirgends gesichtet (Str.); Ende Mai verfliegen bei Haidenschaft in Getreidefeldern (Mn. Kstld.); Fiume (*niveata* Tr.) Mai auf Waldwiesen (Mn.); Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.). Weitere Funde im Gebiete nicht bekannt. Orientalisch.

877. *griseata* Schiff. Nur von Mann in seinen Ausbeuten angeführt: Fiume Mai auf Berglehnen und Mitteldalmatien.

Orientalisch.

Anaitis Dup. **)

878. *praeformata* Hb. Črna Prst 19. VI., 27. VII.; bei 1500 m noch 30. VIII. frisch — zweiter Triglavsee, Voßhütte Lichtfang (Hafn. F. Kr.); Črna Prst, Südseite 1400 m ein Stück 16. VII., Trentagebiet und Triglav August mehrfach — Trnowanerwald, Tschaunhöhen 1400 m 15. VII. je ein Stück (Str.); Nanos Ende

*) Wohl identisch mit *dinarica* (cfr. Soc. entom. 35. Jahrg., pp. 17/18).

**) *A. lithoxylata* Hfn. aus den Hochgebirgen Bosniens und der Herzegowina in 1400—1700 m, August, September (Rbl. Stud. II).

Juni Buchengebüsch (Mn. Kstld.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); von mir bei Triest nicht beobachtet (Stdr.); auf dem M. Maggiore Juni (Mn. Fiume); M. Maggiore - Haus Licht 2. VII. (Schaw. M. M.); Mitteldalmatien (Mn.); Vucijabara, Jablanica, Vranica planina 14. VII., Nevesinje (Rbl. Stud. II); f. *aphrodyte* Schaw. mit stark rosa überflogenen Vorderflügel (V. z. b. G. 1913, p. 160), aus der Herzegowina (Schaw. B. H. VIII).

Auch Kroatien, Bosnien, Serbien; alpin.

879. *plagiata* L. Wohl in zwei Gen., da noch Ende September angetroffen (Hafn. F. Kr.); Nanoshänge, Kouk, Tschaun Mai nicht selten (Mn. Kstld.); Črna Prst, Südhang bei 1100 m mehrfach; Podbrdo, Grahovo, St. Lucia, Plateau von Ronzina, Umgeb. Görz, Nabresina, Monfalcone, Conconello, Planik, M. Maggiore, nirgends häufig und wenig variabel (Stdr.): Prosecco 12. V. ein ♀ Nennform (Stdr.); Abbazia 20. V., 8. VIII., Mattuglie 18. VII. (Rbl. M. M. I); Fiume Mai, Juli häufig (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Mostar Juni *pallidata* Stgr. (Schaw. B. H. VI); unter *effermata* Gen. (= *pallidata* Stgr.) auch ein Stück *tangens* Fritsch (Schaw. B. H. IX); Jablanica, Velež, Domanovic (Rbl. Stud. II). Insel Grado *pallidata* 17. IX., auch Triest (Galv. B. A. I.); Insel Brioni, *pallidata* Stgr. 25. V., IX., 7. X. (Rbl. Brioni I); Lesina *pallidata* (Galv. Dalm. Ins.).

Überall in Osteuropa; sibirisch.

880. *simpliciata* Tr. Krainer Schneeberg, bis 1500 m, 15. VI., 8 Stück (Hafn. F. Kr.); Mitteldalmatien (Mn.); Stolac, Vranica planina, Gr. Prenj (1700—1900 m), Volujak (Rbl. Stud. II); Maglič, Zelengora in der Herzegowina (Schaw. B. H. VII); Orjensattel und Orjengipfel (Schaw. B. H. IX).

Sonst in den Gebirgen Bosniens, bei Mehadia, Bulgariens und Griechenlands; Balkanform.

Chesias Tr.

881. *rufata* F. Im Gebiete seltene Art! Görz 21. IV. an Laternen (Stdr.); Triest, Verz. F. A. Vogel (Carr.); von mir bei Triest nicht angetroffen (Stdr.); auf den Wiesen bei Basovizza 11. IV. (Galv.); bei Martinischza (*obliquata* S. V.) April (Mn. Fiume); Mitteldalmatien **I** (Mn.). Nach Skala? mediterran.

882. *angeri* Schaw. gefangen in San Quirino bei Vittorio 18. IV. (Buchtik) und bei Muscola bei Cervignano 5. V. (Prof. Anger). Um diese Zeit auch bei Magredis (Udine) von Wagner erbeutet (siehe E. Z. Wien 1919).

Lobophora Curt.

883. *sertata* Hb. Črna Prst von 1500 m aufwärts an Felsen 14. VII. bis 30. VIII., helle und braune Stücke (Hafn. F. Kr.); Črna Prst, Südseite, nahe dem Gipfel, 1. VIII. mehrere Stücke (Stdr.).

Auch aus Slavonien, Bosnien, Oberungarn, Siebenbürgen; europäisch.

884. *carpinata* Bkh. Nabresina ein ♂ am Licht 30. III. (Kitschelt). Sonst im Gebiete nicht beobachtet worden.

Einschleppung durch Eisenbahn möglich (Lbl.). Norditalien usw. Sibirisch.

885. *halterata* Hufn. Bei Volosca (*hexaperata* S. V.) im Mai (Mn. Fiume). Sonst im nördlichen Gebiete nicht beobachtet.

Mostar 5. VI. (Schaw. B. H. VIII). Jablanica (Rbl. Stud. II).

Auch aus Slavonien, Ungarn, Siebenbürgen. sibirisch.

886. *sexalata* Retz (= *sexalisata* Hb.). Ein mir vom Triglavgebiet (Südseite) überbrachtes, sehr schadhaftes Stück Ende Juli, dürfte jedenfalls hierher gehören. Aus dem Nachbargebiete Mojstrana 23. VII. ist die Art festgestellt (Stdr.).

887. *appensata* Ev. (= *viretata* H.) bei Clana Mai ein Stück (Mn. Fiume).

Sonst aus Tirol, Steiermark, Ungarn, Schweiz; sibirisch.

Cheimatobia Stph.

888. *boreata* Hb. Trnowanerwald Plateau, 1200 m, mehrere ♂♂ an Buchenstämmen 24. XI. (Kitschelt); Mte. Maggiore - Gipfel (Rbl. M. M. II); Mostar 31. X. (Schaw. B. H. VII).

Auch aus Kärnten, Kroatien-Slavonien, Ungarn; sibirisch.

889. *brumata* L. St. Lucia, Canale Anfang November bis Ende Jänner, Flitsch, Woltschach, Grahovo Dezember mehrfach, Görz, Triest (Stdr.); Triest, häufig Dezember, Jänner (Carr.); Herpelje-Kozina 25. XII. in Anzahl (Naufock); Abbazia Jänner (Rbl. M. M. I); Mattuglie Dezember (Rbl. M. M. II). Nennform und *hyemata* Huene 23. X. Mostar (frühe Flugzeit!); Nevesinje 25. XI. (Schaw. B. H. VI, VIII).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, Serbien, Siebenbürgen; sibirisch.

Triphosa Stph.

890. *sabaudiata* Dup. Črna Prst, 1500 m ober dem Mallnerhause 29. VI.; Rp. an Rhamnus carniolica; Falter ebenda und Mangart Ende Juli, August (Hafn. F. Kr.); Mattuglie 18. VII. (Rbl.

M. M. I); Zengg 12. VI. (Dobiasch); Mostar 10. VI., niedrige Lage (Schaw. B. H. XI); Prenj (600 m) 2. VIII., Velež, Gacko (Rbl. Stud. II).

Auch in Kärnten, Bosnien, Siebenbürgen; alpin, vermutlich orientalischer Herkunft.

891. *dubitata* L. Diese, wie die vorige Art, wird häufig in Höhlen angetroffen. Črna Prst 19. VI. in überwinterten Stücken am Licht; Triglavgebiet, Voßhütte, Mitte August, Senosetsch am Karst Juli, August sehr häufig; Wippach, Lichtfang 15. VII. bis 13. VIII. (Hafn. F. Kr.); in ganz Istrien oft in Höhlen (Mn. Kstld.); Görz 12. IV. (Hafn. F. Görz); in Höhlen bei Likčev Podmol (St. Peter in Kr.). August in Anzahl (Prof. Dr. Müller), sehr dunkle und große Stücke; Görz 24. IV. ein Stück (Stdr.); Dutvolje-Skopo, Repentabor, Monfalcone Juli, August (Stdr.); bei Sesana in einer Höhle 5. III. mehrfach (Lbl.); Triest: F. A. Vogel (Carr.); Abbazia 31. III. ein ♂ am Licht (Rbl. M. M. II); Fiume Juli in Felsspalten an der Bursenstraße (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Kotluka velika (Dalm.) 7. IX. (Müller). Gacko, Mostar 16. X. und 14. V. (Schaw. B. H. XI).

Auch mehrfach aus Bosnien und Herzegowina (Velež) häufig an Gebäuden und in Höhlen (Rbl. Stud. II).

Sonst auch in Kroatien-Slavonien, Siebenbürgen; sibirisch.

Eucosmia Stph.

892. *certata* Hb. Wochein-Feistritz, Mojstrana, St. Kanzian Mai, Juni (Hafn. F. Kr.). Dürfte daher im angrenzenden Teile des Küstenlandes auch nicht fehlen (Stdr.). Fiume beim Pulverturm und bei Csaule, Juni, an Mauern (Mn. Fiume); Gacko 25. IV. var. *hawalcae* Schaw.; grauer Grundton, sehr wenig gezeichnet, schmal- und spitzflügeliger als die Nennform. Hellgrau ohne Spur von Braun. Mittelbinde rudimentär (Schaw. B. H. IX) (siehe auch Schaw. Verh. zool. bot. Ges. 1915, p. 87/8).

Auch in den nördlichen Nachbarländern verbreitet; sibirisch.

893. *undulata* L. Črna Prst, Südseite, Mitte Juni einzeln, auch aus der benachbarten Wochein, Stiege von Hafner nachgewiesen (Mitte Mai bis Anfang Juli, Stdr.).

Auch in nördlichen Nachbarländern; sibirisch.

Scotosia Stph.

894. *vetulata* Schiff. Adelsberg 18. VI., Wippach 23. VI. (Hafn. F. Kr.); Građišče Juni aus Brombeerhecken (Mn. Kstld.); Podmelec, Plava, Görz-Grojna, Repentabor, Draga bei Triest, einzelne Stücke

Ende Juni aus Gebüsch. Südlich Fiume kein Fundort bekannt (Stdr.). Grojnatal 20. VI., Kobdil 22. VI. (Hafn. F. Görz). Fiume **J** Juni in Gebüsch (Mn.).

Auch in nördlichen Nachbarländern nachgewiesen; sibirisch.

895. *rhamnata* Schiff. Hinter Oberfeld, Juni, in Eichengebüsch (Mn. Kstld.); Kobdil, ein Stück 12. VI. (Hafn. F. Görz); Kronberg, Wippach, Salcano, Borst, Pinguente Juni, Juli ab und zu, nicht häufig (Stdr.); Triest: F. A. Vogel (Carr.); von mir bei Triest nicht gefunden (Stdr.); Fiume (*transversata* Hfn.) Juni in Gebüsch, selten (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.). Mostar 11. V., subsp. *terror* Schaw. Eine dunkle Form, welche am Balkan als Lokalrasse auftritt. Vorder- und Hinterflügel ganz dunkel rauchschwarz, Zeichnung kaum mehr zu erkennen (Schaw. B. H. VIII). Stolac 25. V. (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; orientalisches.

Lygris Hb.

896. *prunata* L. Von mir nicht angetroffen (Stdr.). Crna Prst 1400—1500 m an Felsen und Steinen 21. VIII. (Hafn. F. Kr.); bei Hraszt Juli einzeln (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Velež (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, Serbien; sibirisch.

897. *populata* L. Wohl nur im alpinen Teile des Gebietes! Crna Prst, 700—900 m, Juli, August häufig, auch bei 13—1500 m zweite Hälfte August in Mehrzahl, darunter trs. ad *musauaria* Frr. (Hafn. F. Kr.); Triglav, Voßhütte 4. VIII. mehrfach; Trentagebiet bei etwa 1400 m 2 Stück Ende Juli (Stdr.); Trnowanerwald (Goljak) 1. IX. (Hafn. F. Görz), lokal; ziemlich selten im Gebirge Bosniens in 11—1600 m (Rbl. Stud. II).

Sonst in Tirol, Kärnten, Steiermark, in den Gebirgen Oberungarns und Siebenbürgens; sibirisch.

Larentia Tr.

898. *dotata* L. Crna Prst, Radmannsdorf, Mojstrana, Kronau, Karawanken (Hafn. F. Kr.); Canale ein Stück, Görz-Grojna Juni, Juli mehrfach, Kronberg 2. VII. (Stdr.); Grojna Juli (Hafn. F. Görz); Ende Juni bei Lokavitz in Hecken (Mn. Kstld.); Umgeb. Abbazia (Rbl. M. M. II); Fiume (*pyraliata* S. V.) Juni in Eichengebüsch (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Orjen (Schaw. B. H. IX); f. *aurantiodelata* Schaw., mit hell rötlichgelber Grundfarbe aus der Vucija

bara, Juli (Schaw. B. H. XI). Prenj, Lakat, Gacko, Vucija bara (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien, Bosnien; sibirisch.

899. *fulvata* Forst. Crna Prst in 800 m, Nordseite, 21.—30. VIII. (Hafn. F. Kr.); Nanosabhänge Ende Juni auf Rosenhecken (Mn. Kstld.); Crna Prst, 1200 m, Südseite, 26. VII. (Stdr.); Gipfel des Mte. Maggiore am Licht 4. VIII. (Rbl. M. M. II); ebenda 2. VII. am Licht (Schaw. M. M.); Fiume Juni auf Rosenhecken (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); lokal vom Trebevic, Nevesinje, Gacko, Vucija bara 17. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch in Slavonien, Siebenbürgen; sibirisch.

900. *ocellata* L. Mojstrana, Senosetsch (Hafn. F. Kr.); Salcano 27. V., 17. VI. (Hafn. F. Görz); Auzza 8. VI. mehrere; sonst noch von Podmelec, Cepovan, Trnowanerwald, Umgebung Görz, Mossa, Cormons, Reifenberg, Salvore, Rovigno bekannt. Opcina 11. V. ein ♂, 8. VI. ein ♀; Leme 4. VI. ein ♂ (Stdr.); Mattuglie, Abbazia 29. V.—16. VII. (Rbl. M. M. I); Fiume Mai bis Juli gemein (Mn.); Umgebung Wippach, Nanos, und Kouk Mai, Juni, in Gebüsch und Hecken (Mn. Kstld.); Mitteldalmatien (Mn.); Mosetschlehne bei Dernis, Castelvechio, Salona, Spalato (Stdr.); Jablanica (Rbl. Stud. II); Herzegowina (Schaw. B. H. VII). Insel Brioni 16.—26. V., 5. IX. (Rbl.); Insel Brazza 8. V. ein Stück (Stdr.).

Auch in Kärnten, Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

901. *bicolorata* Hufn. Wochein-Feistritz 14. VII., Crna Prst in 600 m 30. VII. frisch (Hafn. F. Kr.); bei Wippach Juni am Bachufer aus Sträuchern (Mn. Kstld.); bei Clana **I** und Groming (= *rubiginata* S. V.) Juni (Mn. Fiume).

Auch in Kärnten, Steiermark, Kroatien, Bosnien (hier nur von Sarajevo) bekannt; sibirisch.

902. *variata* S. V. Wochein-Feistritz, Crna Prst Juni und später; Mojstrana 1500 m 8. VII.; Baba (Karawanken) 18. VII.; Stol 29. VII., Wippach 30. VI. Lichtfang; sehr variabel; f. *stragulata* Hb. Crna Prst und Vratatal; f. *obeliscata* Hb. Wippach 1. VII. (Hafn. F. Kr.); auf dem Nanos einige Anfang Juni (Mn. Kstld.); Görz 3. XI. Licht; Tschau bei 1200 m 22. VI. (Hafn. F. Görz); Miramar 3. XI. Lichtfang (Galv.); *stragulata* aus Zengg 8. VI., 14. X. (Dobiasch); *stragulata* 1. VIII. Herzegowina (Schaw. B. H. VII); Bjelasnica, Prenj (1350 m, 12. VII.) (Rbl. Stud. II).

Sonst in Kroatien, Bosnien; sibirisch.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 213-218](#)