

## Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

### *Trechus (Duvalius) semecensis* Winkl.

Fühler und Beine ziemlich lang; Vorl. Flgd. mehr als doppelt so lang wie breit, 4. wenig länger als 2. und etwas kürzer als 5. Kopf schmaler als Hsch. Schläfen gleichmäßig gewölbt. Hsch. kaum breiter als lang, im vorderen Drittel mäßig gerundet erweitert, nach rückwärts mäßig stark und fast geradlinig verengt, mit spitzwinklig nach außen vorspringenden Htecken, schmal aufgebogenem Strand, stark vertiefte Mittellinie und querrissiger Mikroskulptur auf der Scheibe. Fld. zwei Drittel länger als breit, mäßig gewölbt, hinter der Mitte wenig erweitert, mit gleichmäßig verrundeten Schultern; die inneren Streifen sehr kräftig und stark vertieft, die äußeren noch wahrnehmbar, die inneren Zwischenräume schmal und stark gewölbt; die beiden vorderen Porenpunkte im 4. Zwischenraum, der 1. etwa im vorderen Fünftel, der 2. hinter der Mitte der Deckenlänge. Der 3. und 4. zeigen die Tendenz sich bei diesen Porenpunkten zu vereinigen. Das 1. Glied der männlichen Vordertarsen etwas länger als breit. Oberseite dunkel rostrot. Lg. 4·5 mm. Ost-Bosnien. Kol. Rundsch. XII, 261.

### *Trechus (Duvalius) golesensis* Winkl.

Kopf deutlich schmaler als der Hsch., mit ziemlich gewölbten Schläfen und deutlichen Augenrudimenten. Fld. vollzählig gestreift, die inneren zwei ziemlich vertieft, der 3. bis 6. noch deutlich, die äußeren durch Punktreihen angedeutet. Fühler schlank und mäßig lang, bis zum basalen Drittel der Decken reichend, 4. Glied wenig länger als das 2. und kaum kürzer als das 5., die vorletzten doppelt so lang als breit. Hsch. wenig breiter als lang, im vord. Viertel am breitesten, zu den Htwinkeln mäßig stark und gerundet verengt; Htwinkel ziemlich groß, fast rechtwinkelig, mit äußerst scharfer Spitze; Strand ziemlich breit aufgebogen, mit der Marginalseta im vorderen Fünftel. Fld. zwei Drittel länger als breit, hinter der Mitte wenig gerundet erweitert, mäßig gewölbt; Schulterrund wenig abgeschrägt, Schultern in stark konvexer Kurve verrundet. Die vorderen drei Dorsalpunkte befinden sich im vierten Zwischenraum, der 1. im basalen Siebentel, der 3. wenig vor dem analen Drittel. Beine mäßig lang, mit wenig verdickten Schenkeln. Oberseite hell rötlichgelb. Lg. 4·4 mm. Ost-Bosnien. Kol. R. XII, 261.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 223](#)