Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

920. multistrigaria Hw. Monfalcone, Nennform (Kitschelt); Insel Lussin (Cigale) Ende November, Anfang Dezember subsp. olbiaria Mill. (Galv. Ausb. Lussin, Verh. 2001. bot. Ges. 1916); olbiaria auch aus Mostar 31. X. (Schaw. B. H. XI).

Sonst Südtirol, Westeuropa; mediterran.

921. didymata Bkh. Črna Prst, 1200—1500 m, aus Büschen gescheucht, ganzen August, nicht häufig (Hafn. F. Kr.); Črna Prst, Südseite, 28. VII. ein frisches ♂ (Stdr.); Trnowanerwald (Goljak) 1. IX. (Hafn. F. Görz). Im mittleren Teile fehlend, tritt dann erst wieder in den Hochgebirgen der Herzegowina und Bosniens auf. Prenj, 1300 m. 29. VII., Vucija bara bei Gacko (Rbl. Stud. II).

Auch in Bosnien, Oberungarn; alpin.

922. cambrica Curt. Voßhütte 22. VI. (Hafn. F. Kr.); Porto Rè Juni ein Stück 1 (Mn. Fiume).

Mehr im Norden; boreal-alpin.

923. parallelolineata Retz (= vespertaria Bkh.); Črna Prst, 900 m, 21. VIII.; Mojstrana, Razor-Planina, 1300 m, 16. IX.; Sinosetsch am Karst, Wippach (Hafn. F. Kr.); Görz, Anfang September in der Stadt und bei Salcano einige Stücke (Hafn. F. Görz); Triest: F. A. Vogel (Carr.); ebenda Ende August, St. Lucia, Herpelje-Kozina August, September selten (Stdr.). Weiter südlich erst wieder in der Herzegowina, lokal, Velež (Rbl. Stud. II).

In den nördlichen Nachbarländern, auch aus Bosnien bekannt; sibirisch.

924. incursata Hb. Triglavgebiet, in 1700 m, 2. VII. verflogen (Hafn. F. Kr.). Ein Stück ist auch von der Raduša-planina <u>1</u> 15. VI. bekannt (Rbl. Stud. II).

Auch in nördlichen Nachbargebieten nachgewiesen; borealalpin.

925. montanata Schiff. Wochein-Feistritz, Anfang Juni; Črna Prst häufig; Triglav, Weg zur Voßhütte 7. VII.; Golica 18. VII.; Sovič bei Adelsberg 18. VI.; Wippach 1. VII.; Nanos bei 1200 m 11. VII. (Hafn. F. Kr.); Ende Juni auf dem Nanos bei St. Hieronymus im Tannenwalde (Mn. Kstld.); Mte. Maggiore Juni (Mn. Fiume). Velež, Cemerno (Rbl. Stud. II).

Auch sonst in den nördlichen Nachbargebieten und in Bosnien verbreitet; sibirisch.

926. suffumata Hb. Stiege in der Wochein 9. VI.; Triglavgebiet, bei Kronau 29. V. (Hafn. F. Kr.); Trentagebiet bei 1400 m 18. VI., 2. VII. (Stdr.); Tschaun bei 1200 m 22. VI. abgeflogen (Hafn. F. G.). Triest 21. IX. (Galv.); Utovo blato \(\begin{align*}\begin{align*}\left\ 7. VI. (Rbl. Stud. II). In den nördlichen Nachbargebieten; sibirisch.

927. quadrifasciaria Cl. Crna Prst, 600 m, 21. VIII. abgeflogen (Hafn. F. Kr.); Trentagebiet, 900 m, Mitte Juli (Stdr.); Volosca, auch beim Pulverturm in Fiume (*ligustrata* S. V.) im Juni in Gebüschen einzeln (Mn. Fiume); auch Mitteldalmatien **1** (Mn.).

Ebenfalls in den nördlichen Nachbargebieten verbreitet; sibirisch.

928. ferrugata Cl. Crna Prst 29. VI. (Hafn. F. Kr.); hinter Oberfeld und Maria Au Juni in Dornenhecken (Mn. Kstld.); Grojna Mai an Baumstämmen, Köderfang Ende August (Hafn. F. Görz); Reifenberg Anfang Juni, Rubbia, Monfalcone, II. Gen. Juli, August; darunter mehrfach f. spadicearia Bkh. (Stdr.); Fiume Mai, Juni häufig (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.). Die Form spadicearia ist verbreiteter als Nennform in Bosnien und Herzegowina, Treskavica 1700 m, Jablanica (Rbl. Stud. II).

Aus allen Nachbarländern bekannt; sibirisch.

929. unidentaria Hw. Crna Prst, 6—700 m, 5. VI., 30. VIII.; Mojstrana 28. VII. (Hafn. F. Kr.); Gacko, Herzegowina 30. IV. (Schaw. B. H. IX).

Verbreitet wie ferrugata; sibirisch.

930. pomoeriaria Ev. Crna Prst, 1000 m, 29. VI. (Hafn. F. Kr.); Fiume beim Pulverturm (= quadrifasciaria Hb.) Juni, einzeln (Mn. Fiume).

Auch aus Slavonien, Bosnien, Banat; sibirisch.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festlandund Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 251-252