

## Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

### 4. Abschnitt.

*Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.*

(Fortsetzung)

944. *incultraria* H. S. Crna Prst, 1500 m, an Felsen Ende Juni, Juli; Mojstrovka, Nordseite, 1800 m, 10. VII.; Mangart, 2000 bis 2100 m (Hafn. F. Kr.); Predil (Sicher, W. E. V. 1897, p. 44). Herzegovina: Maglič, Zelengora, Vodice bei Gacko **↓** Mitte Juli in Anzahl, Vucija bara Anfang Juni (Schaw. B. H. VII, IX). Vlasic und Trebevic nicht selten (Rbl. Stud. II).

Hochgebirge Tirols, Kärntens, bei Mehadia; alpin.

945. *senectaria* H. S. B. Rbl. IX: Lussin, Fiume April und September. Tersatto (*obsoletaria* Kollar i. lit). April an Steinen und Felsen (Mn. Fiume); Fiume, Zengg (Predota); Zengg 3. VII. (I. Gen.), 7. X. (II. Gen.); auch 3. IV., 3. V., 27. VIII., 20. IX. (Dobiasch, zool. bot. Ges. 1916); ebenda 5. V. (Schaw.); f. gen. aest. *metoporina* Schaw. Zengg 3. IX., Stücke der II. Gen. viel kleiner und schärfer gezeichnet, 17—20 mm Expansion gegen 27 mm (Schaw. W. E. Z. 1919, p. 68).

Insselfund: Lussingrande 7. IX. Lichtfang (Galv. B. A. I.).

Nach Skala in Südtirol, Kärnten, Küstenland, Kroatien, Dalmatien; alpin.

946. *frustata* Tr. (= *muscosaria* Led.). Crna Prst, 15—1600 m, Ende Juni, Juli an Felsen; Mojstrovka, Südseite, 1600 m, 9. VII.; Kouk Mitte August; f. *fulvocinctata* Rbr. Crna Prst und Mojstrovka (Hafn. F. Kr.): Anfang Mai an Felsen des Nanos schon ganz abgeflogen (Mn. Kstld.); Trentagebiet, 6—1500 m, mehrfach Ende Juli (Std.); Umgebung Spalato (V. Geiger); Zelengora Mitte Juli mit f. *fulvocinctata* Rbr. (Schaw. B. H. VII). Cvrstnica und Gacko; diese bilden Übergänge zur dichter gelb bestäubten f. *fulvocinctata* (Rbl. Stud. II).

Auch in Bosnien und Ungarn; orientalisches.

947. *scripturata* Hb. Crna Prst, 1500 m, Juli, August; Mojstrovka; Adelsberg, Senosetsch Juni und August; Gradišče ob Wippach 7. VI. (Hafn. F. Kr.); Trnowanerwald 1 ♂ 15. VII., Matajur Anfang Juli in 1400 m; Zlum bei Pingvente 10. VI. (Str.); M. Maggiore-Haus zahlreich 2. VII. am Licht, bis zum Gipfel (Schaw. M. M.); Südhang des Kremenjak aus Gebüsch 7. VII. (Rbl. M. M. II); Zengg 17. VIII. (Dobiasch); Mte. Prolog Anfang Juli, det. Rebel (Str., Boll. Soc. Adr. Trieste XXVII) subsp. *poliata* Schaw. (zool. bot. Ges. 1913, p. 161/2); Zelengóra Mitte Juli. Nicht schmutzig-, sondern hellgrau, Saumfeld bei frischen Stücken blaugrau. Die Mitte der Vorderflügel aufgehellt, weniger gezeichnet. *Poliata* auch von Orjen und Sattel bei Vrbanje (Schaw. B. H. VII und IX). Prenj, 8—1900 m, Velež und Lakat (Rbl. Stud. II).  
Auch aus Kroatien, Bosnien, Südungarn; alpin.

948. *riguata* Hb. Südabhang des Nanos bei Gradišče und bei der alten Burg um Steingerölle fliegend; Puppen unter Steinen (Mn. Kstld.); Görz, Kalvarienberg, Salcanohänge an Steinen sitzend Mai, Juni und wieder August, nicht selten (Hafn. F. Görz). Neumung in der Wochein (Hafn. F. Kr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Kronberg 5. IX., Görz 23. V.; Mitte August Opcina, daselbst auch 8. VI. 1 ♀; Conconello, Borst Stücke der II. Gen., Triestenico 4. VI., Rakitovic 24. VIII., Pisino 4. V. (Str.); Napoleonstraße Opcina-Prosecco 10. VI. (Bohatsch); Sesana 16. VIII. 2 Stücke am Licht (Lbl.); Abbazia, Mattuglie Mai, Juni, Juli, 1. VIII. (Rbl. M. M. I); Fiume beim Pulverturm Mai auf Berglehnen, selten (Mn. Fiume); Lovrana 22. VII. (Schaw. M. M.); Zengg 3. V., 17. V., 11. VIII. (Dobiasch); Mitteldalmatien (Mn.); Orjen Juli (Schaw. B. H. IX); Tassovic September, Lastva, Bilek (Rbl. Stud. II). Insel Brioni Anfang September ein dunkles scharf gezeichnetes ♀ (Rbl.).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Siebenbürgen; orientalisches.

949. *malvata* Rbr. Insel Lissa September (Skala Stud.).

Sonst Südfrankreich, Sizilien; mediterran.

949 a. *putridaria* H. S. subsp. *bulgariata* Mill. Gravosa Mitte Juli (Wagner); Vucija bara, Bilek (Schaw.).

Auch in Nord- und Mittelitalien, Bulgarien; orientalisches.

950. *unicata* Gn. (= *corollaria* H. S.). Siehe Stdg. Rbl. Kat. III, Nr. 3431. Eine östliche Form, welche von Mann in Mitteldalmatien erbeutet wurde; orientalisches.

951. *cucullata* Hufn. Wochein - Feistritz und Wocheiner - See Ende Juni; Mojstrana 13. VII.; Wippach Ende Juli und Anfang

August (Hafn. F. Kr.); Görz-Strazig' 10. V., Salcano 20. V. aus Hecken (Hafn. F. Görz); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Abbazia April, Mattuglie 20. V. (Rbl. M. M. I); Vepriņaz 5. VIII. aus Gebüsch (Rbl. M. M. II); Mitteldalmatien (Mn.); Vucija bara (Schaw. B. H. VI).  
Auch in allen Nebenländern verbreitet; sibirisch.

952. *galiata* Hb. Wochein-Feistritz, Vratařal, Adelsberg, Seno-setsch, Umgebung Wippach, Nanoshänge Mitte Mai bis Ende Juni und August, September (Hafn. F. Kr.); Kalvarienberg bei Görz 12. V. ein Stück (Hafn. F. Görz); Opcina 10. V., 8. VI. und Triest 29. IX. Lichtfang ein Stück (Stdr.); Triest, Contovello Mai, Opcina-Prosecco 10. VI. (Galv. B. A. I.); Triest, sehr häufig, Juni bis August in Gebüsch (Carr.); Südabhänge des Nanos, Kouk an Felsen, Mauern und Steinen (Mn. Kstld.); M. Maggiore-Haus 2. VII. und Lovrana 22. VII. (Schaw. M. M.); Abbazia 21. V., 12.—21. VI., 16. VII., 1. VIII. (Rbl. M. M. I); Fiume Mai, Juni an Felswänden nicht selten (Mn. Fiume); Zengg, subsp. *emina* Schaw. 24. V. (Dobiasch); Mitteldalmatien (Mn.); Prenj, 1500 m, 31. VII., Lastva, Gacko (Rbl. Stud. II); subsp. *emina* Schaw. von Orjen (Schaw. B. H. IX); *emina*: (Beschr. zool. bot. Ges. 1912, p. 143, reinweiße Grundfarbe ohne Braun. Auch die Mittelbinde hat kein Braun und erscheint dadurch blauschwarz) Bišinā, Gacko (Schaw. B. H. VI). Insel Lussin (Lussingrande) 7. IX. (Galv. B. A. I).

Auch aus allen Nachbarländern bekannt; sibirisch.

953. *oxybiata* Mill. Mostar 30. IX. (Schaw. B. H. VII).

Neu für illyro-adriatisches Gebiet; sonst noch von Südfrankreich, Marca bekannt; orientalisches.

954. *rivata* Hb. Adelsberg, Wippach Juni bis August (Hafn. F. Kr.); Lucinico, Isonzoufer 22. V. ein Stück; Grojna 17. VIII. (Hafn. F. Görz); hinter Oberfeld Juni einige aus Hecken gescheucht (Mn. Kstld.); Mossa Mitte Mai selten; Tschitschenboden Ende Mai ein Stück (Stdr.); Abbazia 25. V. ein Stück mit reduziertem Mittel-feld der Vorderflügel (Rbl. M. M. II); bei Clana (Fiume) einzeln Juni (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Serbien bekannt; sibirisch.

955. *sociata* Bhh. Hudajužna 17. V.; Grahovo, Podbrdo mehrfach Juni und September; Flitsch 20. VII., Karfreit Ende Juli (Stdr.); Görz nicht häufig Mai und Juli an Baumstämmen (Hafn. F. Görz); Wippachtal Juni (Mn. Kstld.); Aquileja 19. IV. (Galv.); Abbazia 29. VII., 9. IX.; Lovrana Ende April (Rbl. M. M.); Fiume Juni

häufig (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Abbazia August (Pfitzner). Herzegowina Juni bis August (Schaw. B. H. III); Jablanica (Rbl. Stud. II). Insel Brioni Mai und Oktober (Rbl.).

Auch aus allen Nebenländern bekannt; sibirisch.

956. *picata* Hb. Vodice bei Gacko, Herz. (Schaw. B. H. VII).

957. *alaudaria* Fr. Nur im nördlichsten Gebietsteile. Podbrdo 14. VI.; Wochein-Feistritz 2. VI. (Str.); Crna Prst, 1200—1400 m, aus Fichten und Gebüsch Ende Juni; Vratatal, Voßhütte Anfang Juli, Nanos ob Präwald, 1200 m, Juni, darunter Übergänge zu *culmaria* H. S. (Hafn. F. Kr.).

In den Alpen; alpin.

958. *albicillata* L. Podbrdo 2. VII. ein Stück (Str.); Mojstrana Ende Juli; Sovic bei Adelsberg 18. VI.; Wippach 28. VI. Lichtfang (Hafn. F. Kr.); bei Clana **1** Juni in Gebüsch (Mn. Fiume). Weiter südlich wohl kaum mehr zu finden.

Ist auch aus allen nördlichen Nachbarländern und Bosnien bekannt; sibirisch.

959. *procellata* F. Neuming, Rotweinklamm, Mojstrana, Senosetsch, Wippach Juni, Juli (Hafn. F. Kr.); Görz Ende Mai, Juni Grojna in Gebüsch häufig; auch im August (Hafn. F. Görz); Umgebung Görz mehrfach in zwei Gen., Mai, Juni und ab August. St. Daniel-Kobdil, Heiligenkreuz, Reifenberg, Pinguente im Mai, Juni. Wochein-Feistritz 2. VI. (Str.); Mattuglie 30. VII. (Rbl. M. M. I). Jablanica (Herzeg.) und von wenigen Orten Bosniens bekannt (Rbl. Stud. II).

Sonst in allen Nachbarländern verbreitet; sibirisch.

960. *lugubrata* Stgr. Istrien und Dalmatien fehlend. Konjščica-Planina, 1500 m, 12. VII.; Mojstrovka 8. VII. (Hafn. F. Kr.); Vucija bara Anfang Juli (Schaw. B. H. VII).

Auch aus allen Nachbarländern (ausnahmslos Bosniens) bekannt; sibirisch.

961. *hastata* L. Crna Prst, 1300 m (*subhastata*), Mojstrovka, 1800 m, 10. VII. (Hafn. F. Kr.); S. Maria di Trenta 4. VII. mehrfach; *subhastata* Nolck. Rombonstock bei etwa 1600 m zwei Stück typisch (Str.). Weiter südlich nicht mehr beobachtet worden; fehlt auch in Bosnien-Herzegowina. Wohl aber in allen nördlicher gelegenen Nachbarländern; sibirisch.

962. *tristata* L. Crna Prst 25. VII.; Wochein-Feistritz 11. VI.; Sovic bei Adelsberg (Hafn. F. Kr.); Wippachtal Juni (Mn. Kstld.); Fiume Mai und Juni in Gebüsch (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.).

Treskavica, Stolac 25. VII., Vucija bara 22. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch in Kärnten, Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

963. *luctuata* Hb. Podbrdo 14. VI. zwei Stücke (Str.); Crna Prst 25. VI. (Hafn. F. Kr.); fehlt weiter südlich.

Ist aus Steiermark, Kärnten, Kroatien und Bosnien bekannt; sibirisch.

964. *corydalaria* Graes. mit den beiden f. *bogumiliaria* Rbl. und *eurytaenia* Rbl. Aus Bosnien (Bocac 10. VIII., Vlasenica 20. VII.), Herzegowina und dem kroatischen Velebit bekannt. Sonst nur von Korb im Amurlande erbeutet.

Nach Rebel Balkanform, nach Skala sibirischer Herkunft!

965. *molluginata* Hb. Crna Prst (Mallnerhaus), 1400 m, 29. VI.; Mojstrovka 16. VII. Trekavica, Velež, 1750 m (Rbl. Stud. II).

Auch aus den Alpen, kroatischen Velebit, Bosnien bekannt; alpin, nach Skala orientalisches.

966. *affinitata* Stph. Mte. Maggiore (*affinitaria* Wood) Juni selten (Mn. Fiume). F<sub>1</sub>.

Wurde auch in Kroatien (Agram), Bosnien (Sarajevo), Mehadia erbeutet; nordisch.

967. *alchemillata* L. Crna Prst 17. VII.; Wochein - Feistritz 31. VII., Krmatal, Adelsberg 7. VIII., Senosetsch (Hafn. F. Kr.); Grojna 15. VIII. (Hafn. F. Görz); auf dem Kouk Mitte Juni an einer Wand aus Gebüsch (Mn. Kstld.); Canale Ende Mai selten (Str.); Fiume Mai bis Juli häufig (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Sinj, Dernis, Stobrec (Str.); Jablanica, Vucija bara (Rbl. Stud. II). Jo.

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien (verbreitet, nicht selten), Tirol, Kärnten, Steiermark bekannt; sibirisch.

968. *hydrata* Tr. Maria Au bei Wippach 14.—21. V. (Hafn. F. Kr.); Ende Mai, Anfang Juni bei Gradisce aus Gebüsch von Kornellkirschen; in der Färbung sehr blaß und größer als Istrianertiere (Mn. Kstld.). Mte. Sabotino 12. V. 1 ♀ aus Gebüsch gescheucht (Kitschelt); Mattuglie 20. V., 8. VI. (Rbl. M. M. I); bei Hraszt Mai selten (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Lastva 4. VII. (Schaw. B. H. VII).

Auch aus Kärnten, Bosnien (Dervent) bekannt; orientalisches.\*)

969. *bifasciata* Hw. (= *unifasciata* Hw.). Insel Brioni Anfang September ein ♀ (Rbl. Br.). Mostar Ende August, Anfang Sep-

\*) Skala, Studien: *L. lugdunaria* H. S. Kärnten, Kroatien, Bosnien, Herzegowina. Nähere Fundorte nicht bekannt.

tember (Schaw. B. H. X, vergl. V. zool. bot. Ges. 1916, p. 486!)  
Umgebung Spalato (V. Geiger, V. zool. bot. Ges. 1873).

Auch in Tirol, Steiermark, Kroatien, Ungarn; europäisch.

970. *minorata* Tr. Crna Prst und Triglav, 12—1400 m, 7. VIII. und 17. VII.; Mojstrovka 10. VII.; Mangart, 2—2100 m, Mitte Juli; Nanos ob Präwald, 1200 m, 19. VII.; Wippach Licht 15. VIII.; Kouk 9. VIII. (Hafn. F. Kr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Draga di Lovrana 31. VII. (Schaw. Verh. zool. bot. Ges. 1916, p. 108 und Schaw. M. M.). Prenj (Rbl. Stud. II).

Auch in Bosnien, Ungarn; alpin.

971. *adaequata* Bkh. Stiege in der Wochein 9. VI., Crna Prst, untere Alm, 19. VI., 7. VIII., Vratatal 23. VII.; Mojstrovka, Mangart (Hafn. F. Kr.). Ende Juni auf Almwiesen des Kouk (*blandiata* S. V.) (Mn. Kstld.).

Auch aus dem kroatischen Velebit und Gebirgen Bosniens bekannt; sibirisch.

972. *albulata* Schiff. Stiege in der Wochein Ende Mai, Anfang Juni; Crna Prst, 1400 m, 30. VI.; Mojstrana 18. VI.; Adelsberg (Hafn. F. Kr.); bei Wippach Mai, Juni des Abends häufig auf Wiesen (Mn. Kstld.); Tschau, 1200 m, 22. VI. (Hafn. F. Görz); Wochein-Feistritz 2. VI., häufig; Podbrdo 14. VI. häufig (Str.); Mte. Maggiore (Rbl. M. M.); bei Clana Mai (Mn. Fiume); Vucija bara (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, sowie in den nördlicher gelegenen Alpenländern bekannt; Herkunft nicht einwandfrei, ich möchte sie mit Skala als sibirisch bezeichnen.

973. *obliterata* Hfn. Crna Prst 25. VI., Mojstrovka Juli, Wochein-Feistritz 11. VI. (Hafn. F. Kr.); Kalvarienberg und Grojna Ende Mai, Juni (Hafn. F. Görz); Reifenberg **1** ein Stück Anfang Juni am Licht; Grojna im Vorsommer ziemlich häufig (Str.).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien (nur Sarajevo) bekannt; sibirisch.

974. *luteata* Schiff. Wippach Licht 27. VI.; Wochein-Feistritz 11. VI.; Krmatal 28. VI. (Hafn. F. Kr.); Vucija bara (Schaw. B. H. VIII).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Ungarn; sibirisch.

975. *flavofasciata* Thnbg. Tarvis (May, W. E. M. 1897, p. 44); Mattuglie Juli (Rbl. M. M. II); bei Buccari (*decolorata* H.) Mai selten (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Zengg 21. V., ein sehr schwach gezeichnetes ♀ (Dobiasch); Insel Brioni 15. V. ein ♀ (Rbl.).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien bekannt; ?? mediterran.

976. *bilineata* L. Im ganzen Gebiete verbreitet und häufig. Ganze Gegend von Wippach bis Görz Mai, Juni (Mn. Kstld.); Görz Mai bis September überall häufig, auch am Köder (Hafn. F. Görz); Triest (Graeffe); 10. IX. (Strd.); gemein Juni und September in Gebüsch und auf Wiesen (Carr.); Napoleonstraße Opcina-Prosecco 10.—12. VI. (Bohatsch). Dasselbst häufig Ende Mai, normale Stücke allenthalben aus Gebüsch gescheucht (Strd.); Sesana Juni an Dolinenrändern häufig (Lbl.); Zlum (Inneristrien) 10. VII. ein winzig kleines ♂ (Strd.); Abbazia 10.—12. VI., 26. V., 9. VI., 6. VII., 4. VIII. (Rbl. M. M. II); Lovrana in Anzahl ohne Verdunklung auf den Vorderflügeln (Schaw. M. M.); Fiume Mai bis Juli häufig in Gebüsch und Hecken (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Sebenico Mai schon ein Übergang zu f. *testaceolata* Stgr. (Rückert); Kuciste vereinzelt (Werner); Orjen (Schaw. B. H. IX); Prenj, 800—1300 m, Radobolje bei Mostar, Stolac, Gacko (Rbl. Stud. II).

Insel Grado: f. *testaceolata* 23. V., f. *infuscata* Gmpp. 23. V. (Galv.); Insel Lussin (Mte. Giovanni) 12. VI. (Galv.); Lissa Mai, Juni in sehr großen Stücken (Galv. Dalm. Ins.).

In allen Nebenländern; sibirisch.

977. *sordidata* F. Crna Prst, 1500 m, Ende August; Zadnjica-tal, Krnata Julii mit *fusco-undata* Don. (Hafn. F. Kr.). Dann überall fehlend, erst wieder in den Gebirgen der Herzegowina.

Neben der Nennform auch f. *leucotaenia* Schaw. (Jahrb. Wr. Ent. Ver. 1913); ferner f. *roseoolivacea* Schaw. (V. zool. bot. Ges. 1914, p. 369), das Wurzelfeld, ein präapikaler Fleck am Vorder- und die breite quere Mittelbinde rosigrot. — Ferner *fusco-undata*, Vucija bara Licht (Schaw. B. H. VIII); Gacko, Nennform, Vucija bara (*infuscata*) 24. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch aus Bosnien und den nördlichen Nachbarländern bekannt; sibirisch.

978. *autumnalis* Ström. (= *coerulata* F.), Crna Prst, untere Abhänge, sehr häufig Ende Mai, Juni mit f. *obsoletaria* Schille. — Radmannsdorf, Wochein-Feistritz (Hafn. F. Kr.); Fiume (= *impluviata* S. V.) 1 April, Mai häufig an Eichenstämmen (Mn.).

Sonst in den Alpenländern; sibirisch.

979. *silacea* Hb. Crna Prst, 1200 m, 7. VIII.; Konjsciza Planina, 1500 m, 15. VII.; *deflorata* Stgr. Crna Prst (Hafn. F. Kr.); Trentagebiet bei 1400 m 6. VII. ein Stück; Caninstock 8. VII. ein Stück (Strd.); dann fehlend, erst wieder in der Herzegowina im Gebirge. Vodice und Vucija bara Anfang Juli (Schaw. B. H. VII).

Sonst auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

980. *corylata* Thnbg. Crna Prst 20. VI. (Hafn. F. Kr.). F<sub>1</sub>.

Sonst in den Alpenländern, in Slavonien, Bosnien; sibirisch.

981. *badlata* Hb. Senosetsch April (Hafn. F. Kr.); Görz 9. IV. (Std.); Görz Anfang März bis Ende Mai am Licht, nicht häufig; darunter zwei große braune Stücke ohne weiße Binden (Hafn. F. Görz); Fiume April einzeln an Mauern (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Zengg 24. IV. (Dobiasch).

Auch aus den angrenzenden Alpenländern und Bosnien bekannt; sibirisch.

982. *berberata* Schiff. Crna Prst bis 800 m 17. V. bis 31. VII.; Mojstrana, Adelsberg (Hafn. F. Kr.); Gradisce und Sturie Juni aus Hecken (Mn. Kstld.); Mattuglie August (Rbl. M. M. I); Volosca, Lovrana Mai einzeln (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Gacko, ein mehr graues als braunes ♀ (Schaw. B. H. VII).

Auch in Kärnten, Steiermark, Kroatien, Ungarn; sibirisch.

983. *nigrofasciaria* Goeze. Crna Prst, 700—1500 m, Mai, Juni (Hafn. F. Kr.); im Mai bei Oberfeld aus Rosenhecken, geflogen (Mn. Kstld.); Triest, häufig März, April; Rp. auf Rosen im Mai (Carr.); Bologna Anfang April; Muratti häufig (Std.); Fiume April einzeln aus Dornhecken gescheucht (*derivata* S. V.) (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Mostar 15. VI., verfliegen (Schaw. B. H. VI).

Sonst auch in Bosnien, Serbien, Siebenbürgen bekannt; sibirisch.

984. *rubidata* F. Wippach Mai bis August, wahrscheinlich in zwei Generationen (Hafn. F. Kr.); Kalvarienberg, Salcano Mai nicht häufig; auch am Licht 22. VIII. und 1. IX. (Hafn. F. Görz); Abbazia Juli (f. *fumata*) (Rbl. M. M. II); Buccari Mai aus Dornhecken, selten (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (*rubidata*!) (Mn.).

Aus der Herzegowina bis dato noch nicht nachgewiesen, aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Siebenbürgen bekannt; sibirisch.

985. *comitata* L. Bei Clana (= *chenopodiata* S. V.) Mai, Juni nicht selten; Mitteldalmatien (Mn.).

Auch aus Slavonien und Bosnien bekannt; sibirisch.

986. *sagittata* F. Wöchein-Feistritz 20. VI. (Hafn. F. Kr.); Podbrdo ein Stück (Std.).

Weitere Funde im Gebiete nicht bekannt.

Auch in Steiermark, Kärnten, Ungarn; sibirisch.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 299-306](#)