

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Lep.)

Melitaea phoebe Knoch.

ab. *geyeri* Aign. Seitz I, S. 216. Die Zeichnung des Vdfls. ist stark reduziert mit verdunkeltem Wurzelfeld. Die Htfl. sind bis auf die Submarginalbinde, welche mit den Randmonden verschmilzt, fast ganz schwarz. (v. Aigner-Abafi, Ent. Zeitsch., XIX., 1906, S. 208.)

var. *lokris* Fruhst. Ausgezeichnet durch ausgedehnte Schwarzfärbung aller Flügel und besonders stark verbreiterte schwarze Submarginalbinden auf der Unterseite. Saratow, Südrubland. (Fruhstorfer, Int. Ent. Zeitsch., II., 1908, S. 194.)

var. *koios* Fruhst. „Südtiroler *phoebe* differieren von Exemplaren aus anderen Fundorten durch ihre auffallende Größe, den dunkelrotbraunen Ton der Oberseite und vor allem durch die auffallend breite und etwas aufgehellte Submarginalregion der Vdfl., die viel weniger und wesentlich verschmälerte schwarze Makeln trägt als alle Schwesterrassen.“ Klausen, Südtirol. (Wie vor.)

Melitaea didyma O.

ab. *pudica* Stichel. Seitz I, S. 218. Eine albinistische Form von weißer bis gelber Grundfarbe. (Stichel, Berl. Ent. Zeitsch., 46., 1901, S. 23.)

ab. *nigra* Balestre. Seitz I, S. 218. Die Grundfarbe ist schwarz übergossen; die Vdfl. zeigen nur noch zwei gelbe Flecke und die Htfl. eine schmutziggelbe Submarginalbinde. Auf der Unterseite dehnt sich das Schwarz von der Basis bis zum Discus aller Flügel aus. (Balestre, Bull. Soc. ent. d. France. 1903, S. 306.)

ab. *nigerrima* Schultz. Seitz I, S. 218. Die Vd.- und Htfl. sind vollständig schwarz, ohne jede Zeichnung. (Schultz, Soc. ent., XXII., 1908, S. 177.)

ab. *radiata* Aign. Die schwarzen Flecke sind zu Streifen verbunden, welche parallel zu den Adern laufen. Der Außenrand und der Vorder- und Hinterrand der Vdfl. sind breit schwarz. (v. Aigner-Abafi, Ann. Hist. Nat. Hung. Budapest, IV., 1906, S. 494.)

ab. *bockletii* Heuer. Die Vdfl. sind im Discus ohne Zeichnung; von der Basis dehnt sich auf den Adern eine graugrüne Bestäubung aus. Die Saummonde der Htfl. sind zu einem breiten schwarzen Band zusammengefloßen. Auf der Unterseite sind die Vdfl. am Vorder- und Außenrand und Apex stark weiß angelegt; ebenso zeigt die Htfl.-Unterseite viel Weiß. (Heuer, Int. Ent. Zeitsch., XVII., 1924, S. 168.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Lep.\). 310](#)