

Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina.

Vortrag, gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener Coleopterologen-Verein.

Von Adolf Hoffmann, Wien.

(Fortsetzung)

- Lixus paraplecticus* L. Mostarsko Blato sehr häufig.
 myagri Ol. Hum bei Mostar, Mostarsko Blato vereinzelt.
 punctirostris Boh. Salona, Mostar, Mostarsko Blato vereinzelt.
 junci Boh. Salona, Dugopolje je ein Exemplar.
 Ascanii L. Labin, Gacko, Mostarsko Blato vereinzelt.
 elongatus Goeze. Mostarsko Blato sehr häufig.
 cardui Oliv. in Gesellschaft der vorigen ebenso häufig.
- Larinus latus* Herbst. Salona, Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
 sturnus Schall. Trebevic sehr häufig.
 jaceae F. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
 obtusius Gyll. Labin ein Exemplar.
- Rhinocyllus conicus* Froel. Salona, Bilek, Gacko vereinzelt.
- Tropiphorus alophoides* Dan. Bjelasnica 2 Exemplare.
 flavescens Germ. Salona ein Exemplar.
- Alophus Hilfi* Reitt. Cvrstnica ein Exemplar.
 triguttatus F. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
- Hylobius piceus* Degeer. Trebevic, Bjelasnica häufig.
- Anisorrhynchus monachus* Germ. Salona ein Exemplar.
- Liparus dirus* Herbst. Trebevic, Bjelasnica vereinzelt.
 coronatus Goeze. Nevesinje, Mostarsko Blato vereinzelt.
- Plinthus Gerli* Boh. Salona, Nevesinje je ein Exemplar.
- Liosoma deflexum* Panz. Bilek, Gacko vereinzelt.
- Hypera cyrta* Germ. Salona, Dugopolje, Nevesinje vereinzelt.
- Phytonomus plantaginis*. Mostarsko Blato sehr häufig.
- Coniatus tamarisci* F. Salona, Mostar, Nevesinje sehr häufig.
- Pissodes harcyniae* Herbst. Trebevic, Bjelasnica vereinzelt.
- Pachytychius sparsutus* Oliv. Nevesinje, Gacko vereinzelt.
- Erirrhinus festucae* Herbst. Salona, Nevesinje vereinzelt.
 Nereis Payk. Mostarsko Blato sehr häufig.

- Notaris bimaculatus* F. Mostarsko Blato sehr häufig.
- Tanysphyrus lemnae* Payk. Trebevic sehr häufig.
- Bagous diglyptus* Boh. Nevesinje, Mostarsko Blato vereinzelt.
 glabrirostris Herbst. Mostarsko Blato häufig.
 argillaceus Gyll. Mostarsko Blato sehr häufig.
- Rhyncolus cylindricus* Boh. Salona, Nevesinje vereinzelt.
- Acalles roboris* Curtis. Trebevic, Bjelasnica vereinzelt.
 hypocrita Boh. Trebevic, Visocica vereinzelt.
- Mononychus punctum-album* Hbst. Salona, Nevesinje häufig.
- Coeliastes lamii* F. Salona, Mostarsko Blato häufig.
- Allodactylus exiguus* Ol. Mostarsko Blato häufig.
- Rhinoncus bosnicus* Schultze. Mostarsko Blato 2 Exemplare.
 pericarpus L. Salona, Nevesinje, Kojnica häufig.
 albicinctus Gyll. Mosor, Nevesinje, Mostarsko Blato vereinzelt.
- Phytobius Waltoni* Boh. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
 comari Herbst. Mostarsko Blato, Sarajevo häufig.
- Ceutorrhynchus viduatus* Gyll. Jablanica, Trebevic vereinzelt.
 geographicus Goeze. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
 larvatus Schultze. Salona, Labin vereinzelt.
 trimaculatus F. Salona, Trebevic, Mostarsko Blato vereinzelt.
 urticae Boh. Salona, Dugopolje, Nevesinje häufig.
 angulosus Boh. Bilek, Gacko, Mostarsko Blato vereinzelt.
 arquatus Herbst. Gacko, Trebevic ziemlich häufig.
 rugulosus Herbst. Mostarsko Blato 3 Exemplare.
 macula-alba Herbst. Salona, Dugopolje vereinzelt.
 albovittatus Germ. Salona, Nevesinje, Bilek, Gacko häufig.
 pleurostigma Marsh. Trebevic, Kalinovik häufig.
 rapae Gyll. Salona, Mosor vereinzelt.
 quadridens Panz. Trebevic häufig.
 erysimi F. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.
 contractus Marsh. Salona, Nevesinje häufig.
- Poophagus sisymbrii* F. Mostarsko Blato sehr häufig.
- Tapinotus sellatus* F. Nevesinje, Mostar vereinzelt.
- Baris analis* Ol. Nevesinje 2 Exemplare.
 timida Rossi. Nevesinje, Mostarsko Blato vereinzelt.

lepidii Germ. Jablanica, Trebevic häufig.

pivicornis Marsh. Salona, Mostarsko Blato, Nevesinje häufig.

chlorizans Germ. Bilek, Gacko, Nevesinje häufig.

Limnobaris T-album L. Mostarsko Blato sehr häufig.

Sphenophorus abbreviatus F. Salona, Mostarsko Blato vereinzelt.

Tychius polylineatus Germ. Nevesinje, Mostar häufig.

meliloti Steph. Nevesinje, Trebevic häufig.

Sibinia sodalis Germ. Salona, Dugopolje, Kotlenice häufig.

Gymnetron pascuorum Gyll. Salona, Nevesinje ziemlich häufig.

asellus Grav. Nevesinje, Mostarsko Blato häufig.

tetrum F. Salona, Nevesinje vereinzelt.

bipustulatum Rossi. Salona, Nevesinje häufig.

Magdalis memnonia Gyll. Trebevic, Bjelasnica häufig.

Apion rugicollis Germ. Nevesinje häufig.

brunipes Boh. Nevesinje, Gacko ziemlich häufig.

onopordi Kirby. Trebevic häufig.

genistae Kirby. Nevesinje, Bilek, Gacko häufig.

elongatulum Desbr. Mostarsko Blato, Sarajevo vereinzelt.

difficile Herbst. Salona, Nevesinje, Bilek, Jablanica, Trebevic häufig.

craccae L. Trebevic, Kalinovik, Mostarsko Blato häufig.

radiolus Kirby. Trebevic, Nevesinje sehr häufig.

validum Germ. Salona, Dugopolje, Mostarsko Blato häufig.

curvirostre Gyll. Salona, Nevesinje sehr häufig.

semivittatum Gyll. Dugopolje, Mostarsko Blato vereinzelt.

longirostre Ol. Trebevic, Jablanica, Kojnica häufig.

difforme Germ. Mostarsko Blato vereinzelt.

apricans Herbst. Trebevic ziemlich häufig.

malvae F. Salona, Labin, Mostarsko Blato häufig.

curtirostre Germ. Bilek, Gacko, Nevesinje häufig.

Gyllenhali Kirby. Trebevic sehr häufig.

viciae Payk. in Gesellschaft des vorigen ebenso häufig.

gracilicollis Gyll. Mostarsko Blato, Jablanica vereinzelt.

alcyoneum Germ. Salona, Dugopolje, Mostarsko Blato.

pavidum Germ. Bilek, Gacko, Mostarsko Blato häufig.

Curtisi Steph. Salona, Jablanica, Mostarsko Blato häufig.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Adolf

Artikel/Article: [Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina. Vortrag gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener Coleopterologen-Verein. 315-317](#)