

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Lep.)

Melitaea didyma O.

var. *majellensis* Dannehl. ♂ und ♀ von hell gelbroter Grundfarbe mit stark reduzierten schwarzen Zeichnungen ähnlich der var. *persea* Koll. Majella, Süd-Abuzzen. (Dannehl, Mitt. Münch. Ent. Ges., 17., 1927, S. 2.)

Melitaea trivialis Schiff.

ab. *interrupta* Skala. Analog der *didyma* ab. *interrupta* Skala ist die rotbraune Subbasalbinde in mehrere Teile aufgelöst. (Skala, Ent. Zeitsch., XX., 1907, S. 311.)

ab. *latemarginata* Grund. „Der schwarze Außenrand tritt derartig breit auf, daß er (wenigstens auf den Htfln.) sämtliche braunen Saummonde vollständig verdeckt.“ (Grund, Int. Ent. Zeitsch., VII., 1913, S. 128.)

ab. *ornata* Grund. „Die Saummonde sämtlicher Flügel sind hell ockergelb bis weißlich, wodurch sie sich von der braunen Grundfarbe schön und stark abheben.“ (Wie vor.)

ab. *variegata* Grund. ♀ „Die Vdfl. sind nach dem Außenrande zu schwach bräunlichrot, sonst ist ihre Färbung ockergelb, woraus die braunroten, schwarzumzogenen Flecke der Zelle und Basis bunt hervorstechen. Die Htfl. sind bräunlichrot, im Mittelfelde heller, gelblicher. Die Randmonde sämtlicher Flügel hell ockergelb.“ (Wie vor.)

ab. *melanina* Grund. „Die Vdfl. sind so stark geschwärzt, daß nur noch Reste von der Grundfarbe im oberen Teile des Außenflügels übrig bleiben, und in der Mittelzelle zwei kleine braune Flecke stehen. Die Htfl. sind am Vorderrande geschwärzt, sonst normal.“ (Wie vor.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Lep.\). 326](#)